

Logic • Geometry • Combinatorics • Probability • Graph Theory • Calculus

Autumn
2022-23



Mathematics for Architects

Neil Course • Sezgin Sezer • Asuman Özer



MATH117 Mathematics for Architects

Dr Neil Course

office: C333

neil.course@okan.edu.tr

www.neilcourse.co.uk/math117.html

MAT117 Mimarlar İçin Matematik

Dr. Asuman Özer

ofis: C326

asuman.ozero@okan.edu.tr

www.amospace.net

Mathematics Department

Prof. Dr. Hasan Özkes
C327

Prof. Dr. Vasfi Eldem
C328


Doç. Dr. Sezgin Sezer
C333

Dr. Meseret Tuba Gülpınar
C333

Dr. Asuman Özer
C326


Dr Neil Course
C333

Suggested further reading:



Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler and Karl E. Byleen,
College Mathematics for Business, Economics, Life Sciences, and Social Sciences,
Pearson. ISBN: 978-1-292-05766-8

George B. Thomas Jr., Maurice D. Weir and Joel Hass,
Thomas' Calculus,
Pearson. ISBN: 978-1-292-25322-0



Tuesday 16th August, 2022

Contents

	Page
I Introduction	1
1 Sets	Küme 3
2 Symbolic Logic	Sembolik Mantık 5
3 Numbers	Sayılar 9
4 Intervals	Aralık 12
5 Cartesian Coordinates	Kartezyen Koordinatlar 14
6 Functions	Fonksiyonlar 18
7 Sigma Notation	Sigma Notasyonu 29
II The Geometry of Space	31
8 Polar Coordinates	Kutupsal Koordinatlar 33
9 Conic Sections	Konik Kesitler 37
10 Three Dimensional Cartesian Coordinates	Üç Boyutlu Kartezyen Koordinatlar 48
11 Vectors	Vektörler 51
12 The Dot Product	Nokta Çarpım 56
13 The Cross Product	Vektörel Çarpım 60
14 Lines	Doğrular 67
15 Planes	Düzlemler 73
16 Projections	İzdüşümler 78
III Finite Mathematics	87
17 Combinatorics : Basic Counting Principles	Kombinatorik : Temel Sayma Prensipleri 89
18 Combinatorics : Permutations and Combinations	Kombinatorik : Permütasyon ve Kombinasyonlar 92
19 Introduction to Probability	Olasılığa Giriş 102
20 Concepts of Probability	Olasılık Kavramları 107
21 Conditional Probability	Koşullu Olasılık 111
22 Probability Trees	Olasılık Ağaçları 117
23 Graph Theory	Çizge Kuramı 121

IV	Calculus	137
24	Limits	Limit 139
25	Continuity	Süreklilik 146
26	Limits Involving Infinity	Sonsuz Limitler 151
27	Differentiation	Türev 155
28	Differentiation Rules	Türev Kuralları 161
29	Derivatives of Trigonometric Functions	Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri 166
30	The Chain Rule	Zincir Kuralı 169
31	Antiderivatives	Ters Türevler 173
32	Integration	İntegral 178
33	The Definite Integral	Belirli İntegral 182
34	The Fundamental Theorem of Calculus	Kalkülüsün Temel Teoremi 187
35	The Substitution Method	Yerine Koyma Yöntemi 193
36	Area Between Curves	Eğriler Arasındaki Alanlar 198
	Solutions to Selected Problems	201
	Index	207

Part I

Introduction

1

Sets

Küme

Definition. A set is a collection of objects, specified in such a way that we can tell whether any given object is or is not in the collection.

Example 1.1. For example

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\},$$
$$B = \{\text{apple}, \text{banana}, \text{cherry}\}$$

and

$$C = \{n, e, i, l\}$$

are sets.

Definition. The symbol $\in$ means “is in the set”.

Example 1.2.

$$\text{banana} \in B$$

and

$$\text{date} \notin B$$

Definition. Each object in a set is called an *element* of the set.

Definition. A set without any elements is called the *empty set* and is denoted by $\emptyset$.

Definition. The symbol $|$ means “such that”.

Example 1.3.

$$\{x \mid x \text{ is a weekend day}\} = \{\text{Saturday}, \text{Sunday}\}$$

$$\{x \mid x^2 = 4\} = \{-2, 2\}$$

$$\{\text{all the people who are } > 5\text{m tall}\} = \emptyset.$$

Definition. If every element of a set A is also in a set B , then we say that A is a *subset* of B , and we write $A \subseteq B$.

Example 1.4.

$$\{1, 2, 3\} \subseteq \{1, 2, 3, 4\},$$
$$\{\text{banana}\} \subseteq \{\text{apple}, \text{banana}, \text{cherry}\},$$
$$\{\text{Neil}, \text{Sezgin}\} \subseteq \{\text{Neil}, \text{Sezgin}\}.$$

Tanım. Küme bir nesneler koleksiyonudur öyle ki herhangi bir nesnenin bu içinde olup olmadığını anlayabildiğimiz şekilde belirlenmiş bir koleksiyondur.

Örnek 1.1. Örneğin

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\},$$
$$B = \{\text{elma}, \text{muz}, \text{kiraz}\}$$

ve

$$C = \{s, e, z, g, i, n\}$$

koleksiyonları birer kümedir.

Tanım. $\in$ sembolü “kümenin elemanıdır” anlamına gelir.

Örnek 1.2.

$$\text{muz} \in B$$

ve

$$\text{hurma} \notin B$$

Tanım. Bir kümedeki her nesneye o kümenin bir *elemanı* denir.

Tanım. Hiç elemanı olmayan kümeye *boş küme* denir ve $\emptyset$ ile gösterilir.

Tanım. $|$ sembolü “öyle ki” anlamındadır.

Örnek 1.3.

$$\{x \mid x \text{ hafta sonu günü}\} = \{\text{Cumartesi}, \text{Pazar}\}$$


$$\{x \mid x^2 = 4\} = \{-2, 2\}$$

$$\{\text{boyu } > 5\text{m olan insanlar}\} = \emptyset.$$


Tanım. Bir A kümesinin her elemanı bir B kümesine de ait ise, bu durumda A kümesi B ’nin bir *altkümesidir* denir ve $A \subseteq B$ olarak gösterilir.

Örnek 1.4.


$$\{1, 2, 3\} \subseteq \{1, 2, 3, 4\},$$
$$\{\text{muz}\} \subseteq \{\text{elma}, \text{muz}, \text{kiraz}\},$$
$$\{\text{Neil}, \text{Sezgin}\} \subseteq \{\text{Neil}, \text{Sezgin}\}.$$



$$A \cup B$$



$$A \cap B$$



$$A^c$$

Union and Intersection

Definition. The *universal set* is the set of all elements under consideration. We call this set U .

Definition. Suppose that A and B are subsets of U .

(i). The *union* of A and B is

$$A \cup B = \{e \in U \mid e \in A \text{ or } e \in B\}.$$

(ii). The *intersection* of A and B is

$$A \cap B = \{e \in U \mid e \in A \text{ and } e \in B\}.$$

Example 1.5.

$$\{a, b, c\} \cup \{b, c, d\} = \{a, b, c, d\}$$

$$\{a, b, c\} \cap \{b, c, d\} = \{b, c\}$$

Complements

Definition. The *complement* of a subset A of U is

$$A^c = \{e \in U \mid e \notin A\}.$$

Example 1.6. If U is the set $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ and $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, then

$$A^c = \{2, 4, 6, 8, 10\}.$$

Birleşim Kümesi ve Kesişim Kümesi

Tanım. *Evrensel küme* dikkate alınan tüm elemanların kümesidir. Bunu U ile göstereceğiz.

Tanım. Suppose that A and B are subsets of U .

(i). The *union* of A and B is

$$A \cup B = \{e \in U \mid e \in A \text{ or } e \in B\}.$$

(ii). The *intersection* of A and B is

$$A \cap B = \{e \in U \mid e \in A \text{ and } e \in B\}.$$

Örnek 1.5.

$$\{a, b, c\} \cup \{b, c, d\} = \{a, b, c, d\}$$

$$\{a, b, c\} \cap \{b, c, d\} = \{b, c\}$$

Complements

Tanım. U 'nun bir A altkümesinin *tümleyeni*

$$A^c = \{e \in U \mid e \notin A\}$$

olarak tanımlıdır.

Örnek 1.6. U kümesi $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ve $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ olduğunda

$$A^c = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

olur.

Symbolic Logic

Sembolik Mantık

Definition. A *proposition* is a statement which is either *true* or *false* (but not both).

Example 2.1.

- “Grass is green” (true)
- “ $2+5=5$ ” (false)
- “My name is Neil” (true)

are propositions, but

- “Close the door”
- “Is it cold today?”
- “1”

are not propositions.

Notation. The symbol for *or* (veya) is $\vee$.

Example 2.2. If P is the proposition “It is snowing today” and Q is the proposition “It is raining today”, then $P \vee Q$ is the proposition “It is snowing or raining today”.

Example 2.3. If $M = (x \in A)$ and $N = (x \in B)$, then $M \vee N = (x \in A \cup B)$

Truth Table 2.1. (T = true, F = false)

P	Q	$P \vee Q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Notation. The symbol for *and* (ve) is $\wedge$.

Example 2.4. If $P =$ “I am hungry” and $Q =$ “I am sleepy”, then $P \wedge Q =$ “I am hungry and sleepy”.

Example 2.5. If $M = (x \in A)$ and $N = (x \in B)$, then $M \wedge N = (x \in A \cap B)$

Truth Table 2.2.

P	Q	$P \wedge Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

Tanım. *Doğru* yada *yanlış* bir hüküm bildiren ifadeye *önerme* denir.

Örnek 2.1.

- “Çim yeşildir” (doğru)
- “ $2+5=5$ ” (yanlış)
- “Benim adım Asuman” (doğru)

hükümleri birer önermedir. Fakat

- “Kapıyı kapat”
- “Bugün soğuk mu?”
- “1”

cümleleri bir hüküm belirtmediğinden önerme olarak kabul edilmazler.

Tanım. Doğruluğu ispat edilemeyen veya doğruluğu ispatına gerek duyulmayan ancak doğruluğu kabul edilen önermelere *aksiyom* denir.

Tanım. Doğruluğu ispatlanabilen önermelere *teorem* denir.

Tanım. İki yada daha fazla önermeyi *ve*, *veya(yada)*, *ise*, *ancak ve ancak* gibi bağlaçlarla birleştirilerek veya bir önermenin sonuna *değil* ekleneren elde edilen önermelere *bileşik önerme* denir.

Notasyon. *veya* bağlacı $\vee$ ile sembolize edilir.

Örnek 2.2. Eğer “Bu gün hava karlı” önermesini P ile “Bu gün hava yağmurlu” önermesini Q ile gösterecek olursak, $P \vee Q$ bileşik önermesi “Bu gün hava karlı yada(veya) yağmurlu” olarak ifade edilir.

Örnek 2.3. Eğer $M = (x \in A)$ ve $N = (x \in B)$ ise $M \vee N = (x \in A \cup B)$ dir.

Doğruluk Tablosu 2.1. (D = doğru, Y = yanlış)

P	Q	$P \vee Q$
D	D	D
D	Y	D
Y	D	D
Y	Y	Y

Notation. The symbol for *not* (değil) is $\neg$.

Example 2.6. If $P =$ “Sizin hocanız kahve seviyor”, then $\neg P =$ “Sizin hocanız kahve sevmiyor”.

Example 2.7. If $M = (x \geq 7)$, then $\neg M = (x < 7)$

Truth Table 2.3.

P	$\neg P$
T	F
F	T

Notation. The symbol for *if and only if* (iff/ancak ve ancak) is $\iff$.

Truth Table 2.4.

P	Q	$P \iff Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

Notation. The symbol for *implies* (ise) is $\implies$.

Example 2.8. Let $P =$ “I am in London” and $Q =$ “I am in the UK.” Then $P \implies Q$.

Truth Table 2.5.

P	Q	$P \implies Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Remark. We must only write “ $P \implies Q$ ” if both P and Q are propositions. I don’t want to see nonsense like

$$\int_0^1 3x^2 dx = [x^3]_0^1 \implies 1$$

in your work. Yes, “ $\int_0^1 3x^2 dx = [x^3]_0^1$ ” is a proposition. In fact, it is a *true* proposition. But “1” is not a proposition.

If you mean “=”, then write “=”.

Remark. If P and Q are propositions, then $(P \vee Q)$, $(P \wedge Q)$, $(\neg P)$, $(P \implies Q)$ and $(P \iff Q)$ are also propositions.

Definition. The *converse* (zıt) of $(P \implies Q)$ is $(Q \implies P)$.

Definition. The *contrapositive* (devrik) of $(P \implies Q)$ is $(\neg Q \implies \neg P)$.

Example 2.9.

$P =$ “It is raining”

$Q =$ “I get wet”

$(P \implies Q) =$ “If it is raining, then I get wet”

converse: $(Q \implies P) =$ “If I get wet, then it is raining”

contrapositive: $(\neg Q \implies \neg P) =$ “If I do not get wet, then it is not raining”

Notasyon. *ve* bağlacı $\wedge$ ile sembolize edilir.

Örnek 2.4. Eğer “Ben açım” önermesini P ile “Uykum var” önermesini Q ile gösterecek olursak, $P \wedge Q$ bileşik önermesi “Ben açım ve uykum var” olarak ifade edilir.

Örnek 2.5. Eğer $M = (x \in A)$ ve $N = (x \in B)$ ise $M \wedge N = (x \in A \cap B)$ dir.

Doğruluk Tablosu 2.2.

P	Q	$P \wedge Q$
D	D	D
D	Y	Y
Y	D	Y
Y	Y	Y

Notasyon. *Değil* bağlacı $\sim$ veya $\neg$ ile sembolize edilir.

Örnek 2.6. If $P =$ “Sizin hocanız kahve seviyor”, then $\sim P =$ “Sizin hocanız kahve sevmiyor”.

Örnek 2.7. If $M = (x \geq 7)$, then $\sim M = (x < 7)$

Doğruluk Tablosu 2.3.

P	$\sim P$
D	Y
Y	D

Notasyon. Ancak ve ancak bağlacı $\iff$ ile sembolize edilir.

Doğruluk Tablosu 2.4.

P	Q	$P \iff Q$
D	D	D
D	Y	Y
Y	D	Y
Y	Y	D

Notasyon. *İse* bağlacı $\implies$ ile sembolize edilir.

Örnek 2.8. $P =$ “Londradayım.” $Q =$ “Birleşik Krallıktayım.” $P \implies Q$.

Doğruluk Tablosu 2.5.

P	Q	$P \implies Q$
D	D	D
D	Y	Y
Y	D	D
Y	Y	D

Not. Eğer P ve Q birer önerme ise “ $P \implies Q$ ” de bir önermedir.

$$\int_0^1 3x^2 dx = [x^3]_0^1 \implies 1$$

gösterimi mantıksal olarak yanlıştır. “ $\int_0^1 3x^2 dx = [x^3]_0^1$ ” ifadesi bir önermedir. Fakat “1” bir önerme değildir.

İse bağlacının sol tarafında “=” ile inşa edilen bir önerme var ise, sağ tarafında da bir önerme olmalıdır.

Not. Eğer P ve Q birer önerme ise, $(P \vee Q)$, $(P \wedge Q)$, $(\neg P)$, $(P \implies Q)$ ve $(P \iff Q)$ ifadeleri de birer önermedir.

The 22 Identities.

1. $(P \vee P) = P$
2. $(P \wedge P) = P$
3. $(P \vee Q) = (Q \vee P)$
4. $(P \wedge Q) = (Q \wedge P)$
5. $((P \vee Q) \vee R) = (P \vee (Q \vee R))$
6. $((P \wedge Q) \wedge R) = (P \wedge (Q \wedge R))$
7. $\neg(P \vee Q) = (\neg P \wedge \neg Q)$
8. $\neg(P \wedge Q) = (\neg P \vee \neg Q)$
9. $(P \wedge (Q \vee R)) = ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R))$
10. $(P \vee (Q \wedge R)) = ((P \vee Q) \wedge (P \vee R))$
11. $(P \vee \text{true}) = \text{true}$
12. $(P \wedge \text{false}) = \text{false}$
13. $(P \vee \text{false}) = P$
14. $(P \wedge \text{true}) = P$
15. $(P \vee \neg P) = \text{true}$
16. $(P \wedge \neg P) = \text{false}$
17. $\neg(\neg P) = P$
18. $(P \implies Q) = (\neg P \vee Q)$
19. $(P \iff Q) = ((P \implies Q) \wedge (Q \implies P))$
20. $((P \wedge Q) \implies R) = (P \implies (Q \implies R))$
21. $((P \implies Q) \wedge (P \implies \neg Q)) = \neg P$
22. $(P \implies Q) = (\neg Q \implies \neg P)$

Proof of Identity 18.

P	Q	$P \implies Q$	$\neg P$	Q	$\neg P \vee Q$
T	T	T	F	T	T
T	F	F	F	F	F
F	T	T	T	T	T
F	F	T	T	F	T

Note that the 3rd and 6th columns are the same:

$$T, F, T, T.$$

Therefore $(P \implies Q) = (\neg P \vee Q)$.

Proof of Identity 22.

P	Q	$P \implies Q$	$\neg Q$	$\neg P$	$\neg Q \implies \neg P$
T	T	T	F	F	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T

Therefore $(P \implies Q) = (\neg Q \implies \neg P)$.

Tanım. $(P \implies Q)$ önermesinin **zıttı** $(Q \implies P)$ dir.

Tanım. $(P \implies Q)$ önermesinin **devriği** $(\sim Q \implies \sim P)$ dir.

Örnek 2.9.

P = “Hava yağmurlu”

Q = “ben ıslandım.”

$(P \implies Q)$ = “Eğer hava yağmurlu **ise** ben ıslandım.”

zıttı: $(Q \implies P)$ = “Eğer ben ıslanmış **isem** hava yağmurludur. ”

devriği: $(\sim Q \implies \sim P)$ = “Eğer ben ıslanmamış **isem** hava yağmurlu değildir.”

The 22 Identities.

1. $(P \vee P) = P$
2. $(P \wedge P) = P$
3. $(P \vee Q) = (Q \vee P)$
4. $(P \wedge Q) = (Q \wedge P)$
5. $((P \vee Q) \vee R) = (P \vee (Q \vee R))$
6. $((P \wedge Q) \wedge R) = (P \wedge (Q \wedge R))$
7. $\neg(P \vee Q) = (\neg P \wedge \neg Q)$
8. $\neg(P \wedge Q) = (\neg P \vee \neg Q)$
9. $(P \wedge (Q \vee R)) = ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R))$
10. $(P \vee (Q \wedge R)) = ((P \vee Q) \wedge (P \vee R))$
11. $(P \vee \text{true}) = \text{true}$
12. $(P \wedge \text{false}) = \text{false}$
13. $(P \vee \text{false}) = P$
14. $(P \wedge \text{true}) = P$
15. $(P \vee \neg P) = \text{true}$
16. $(P \wedge \neg P) = \text{false}$
17. $\neg(\neg P) = P$
18. $(P \implies Q) = (\neg P \vee Q)$
19. $(P \iff Q) = ((P \implies Q) \wedge (Q \implies P))$
20. $((P \wedge Q) \implies R) = (P \implies (Q \implies R))$
21. $((P \implies Q) \wedge (P \implies \neg Q)) = \neg P$
22. $(P \implies Q) = (\neg Q \implies \neg P)$

Proof of Identity 18.

□

P	Q	$P \implies Q$	$\neg P$	Q	$\neg P \vee Q$
D	D	D	Y	D	D
D	Y	Y	Y	Y	Y
Y	D	D	D	D	D
Y	Y	D	D	Y	D

Note that the 3rd and 6th columns are the same:

$$T, F, T, T.$$


□

Therefore $(P \implies Q) = (\neg P \vee Q)$.

□

Notation. The symbol for *for all* (her) is $\forall$.

Notation. The symbol for *there exists* (vardır) is $\exists$.



Proof of Identity 22.

P	Q	$P \implies Q$	$\neg Q$	$\neg P$	$\neg Q \implies \neg P$
D	D	D	Y	Y	D
D	Y	Y	T	Y	Y
Y	D	D	Y	D	D
Y	Y	D	D	D	D

Therefore $(P \implies Q) = (\neg Q \implies \neg P)$. □

Notasyon. The symbol for *for all* (her) is $\forall$.

Notasyon. The symbol for *there exists* (vardır) is $\exists$.

Problems

Problem 2.1 (Truth Tables). Use truth tables to prove the following

- Identity 5 : $((P \vee Q) \vee R) = (P \vee (Q \vee R))$
- Identity 6 : $((P \wedge Q) \wedge R) = (P \wedge (Q \wedge R))$
- Identity 7 : $\neg(P \vee Q) = (\neg P \wedge \neg Q)$
- Identity 8 : $\neg(P \wedge Q) = (\neg P \vee \neg Q)$
- Identity 9 : $(P \wedge (Q \vee R)) = ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R))$
- Identity 10 : $(P \vee (Q \wedge R)) = ((P \vee Q) \wedge (P \vee R))$
- Identity 15 : $(P \vee \neg P) = \text{true}$
- Identity 16 : $(P \wedge \neg P) = \text{false}$
- Identity 21 : $((P \implies Q) \wedge (P \implies \neg Q)) = \neg P$

Sorular

Soru 2.1 (Truth Tables). Use truth tables to prove the following

- Identity 5 : $((P \vee Q) \vee R) = (P \vee (Q \vee R))$
- Identity 6 : $((P \wedge Q) \wedge R) = (P \wedge (Q \wedge R))$
- Identity 7 : $\neg(P \vee Q) = (\neg P \wedge \neg Q)$
- Identity 8 : $\neg(P \wedge Q) = (\neg P \vee \neg Q)$
- Identity 9 : $(P \wedge (Q \vee R)) = ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R))$
- Identity 10 : $(P \vee (Q \wedge R)) = ((P \vee Q) \wedge (P \vee R))$
- Identity 15 : $(P \vee \neg P) = \text{true}$
- Identity 16 : $(P \wedge \neg P) = \text{false}$
- Identity 21 : $((P \implies Q) \wedge (P \implies \neg Q)) = \neg P$

3

Numbers

Sayılar

The Natural Numbers

The set

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$$

is called the set of **natural numbers**. These are the first numbers that children learn. For example

$2 \in \mathbb{N}$ means “2 is a natural number”

$7 \in \mathbb{N}$ means “7 is a natural number”

$\frac{1}{2} \notin \mathbb{N}$ means “ $\frac{1}{2}$ is **not** a natural number”

$0 \notin \mathbb{N}$ means “0 is **not** a natural number”

$-5 \notin \mathbb{N}$ means “-5 is **not** a natural number”

In the natural numbers, we can do “+” and “×”

$$2 + 7 = 9 \in \mathbb{N}, \quad 2 \times 7 = 14 \in \mathbb{N}.$$

However we can not do “-” because

$$2 - 7 \notin \mathbb{N}.$$

So we invent new numbers!

The Integers

The set

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

is called the set of **integers**. We use a $\mathbb{Z}$ for the German word ‘zahlen’ (numbers). In $\mathbb{Z}$, we can do “+”, “-” and “×” but we can not do “÷”. For example $3 \in \mathbb{Z}$, $4 \in \mathbb{Z}$, $-5 \in \mathbb{Z}$ and

$$3 + 4 \in \mathbb{Z}, \quad 3 - 4 \in \mathbb{Z}, \quad 3 \times 4 \in \mathbb{Z}, \quad 3 \div 4 \notin \mathbb{Z},$$

$$3 + (-5) \in \mathbb{Z}, \quad 3 - (-5) \in \mathbb{Z}, \quad 3 \times (-5) \in \mathbb{Z}, \quad 3 \div (-5) \notin \mathbb{Z}.$$

So we invent new numbers!

Doğal sayılar

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$$

kümesi **doğal sayılar** kümesi olarak adlandırılır. Bunlar çocukluğumuzda ilk öğrenilen sayılardır. Örneğin,

$2 \in \mathbb{N}$ demek “2 bir doğal sayıdır”

$7 \in \mathbb{N}$ anlamı “7 bir doğal sayıdır”

$\frac{1}{2} \notin \mathbb{N}$ anlamı “ $\frac{1}{2}$ bir doğal sayı **değildir**”

$0 \notin \mathbb{N}$ anlamı “0 bir doğal sayı **değildir**”

$-5 \notin \mathbb{N}$ anlamı “-5 bir doğal sayı **değildir**”

Doğal sayılarla “+” ve “×” işlemlerini yaparız.

$$2 + 7 = 9 \in \mathbb{N}, \quad 2 \times 7 = 14 \in \mathbb{N}.$$

Ne yazık ki “-” işlemini yapamayız, çünkü, örneğin

$$2 - 7 \notin \mathbb{N}.$$

dir.

Bu yüzden yeni sayılar keşfederiz.!

Tam sayılar

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

kümesine **tam sayılar** denir. Bunu Almanca ‘zahlen’ (sayılar) kelimesinden $\mathbb{Z}$ ile gösteririz. $\mathbb{Z}$ içerisinde, “+”, “-” ve “×” yapabiliriz ama “÷” yapamayız. Örneğin $3 \in \mathbb{Z}$, $4 \in \mathbb{Z}$, $-5 \in \mathbb{Z}$ ve

$$3 + 4 \in \mathbb{Z}, \quad 3 - 4 \in \mathbb{Z}, \quad 3 \times 4 \in \mathbb{Z}, \quad 3 \div 4 \notin \mathbb{Z},$$

$$3 + (-5) \in \mathbb{Z}, \quad 3 - (-5) \in \mathbb{Z}, \quad 3 \times (-5) \in \mathbb{Z}, \quad 3 \div (-5) \notin \mathbb{Z}.$$

Dolayısıyla yeni sayılar keşfederiz.!




Figure 3.1: The Rational Numbers
Şekil 3.1: Rasyonel Sayılar

The Rational Numbers

The set

$$\mathbb{Q} = \{\text{all fractions}\} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z} \text{ and } b \neq 0 \right\}$$

is called the set of **rational numbers**. We use a $\mathbb{Q}$ for the word ‘quotient’. For example

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{0}{1} \in \mathbb{Q} & \frac{100}{13} &\in \mathbb{Q} \\ 1 &= \frac{1}{1} \in \mathbb{Q} & \sqrt{2} &\notin \mathbb{Q} \\ \frac{3}{4} &\in \mathbb{Q} & -4 &= \frac{8}{-2} \in \mathbb{Q} \\ \pi &\notin \mathbb{Q} & 0.12345 &= \frac{12345}{100000} \in \mathbb{Q}. \end{aligned}$$

In $\mathbb{Q}$ we can do “+”, “−”, “×” and “÷ (by a number $\neq 0$)”.

Are we happy now?

No!

Why?

Because if we draw all the rational numbers in a line, then the line has lots of holes in it – see figure 3.1. In fact, $\mathbb{Q}$ has ∞ many holes in it.

So we invent new numbers!

The Real Numbers

The set

$$\mathbb{R} = \{\text{all numbers which can be written as a decimal}\}$$

is called the set of **real numbers**. For example

$$\begin{aligned} 0 &= 0.0 \in \mathbb{R} & \frac{100}{13} &= 7.692307\dots \in \mathbb{R} \\ \frac{23}{99} &= 0.232323\dots \in \mathbb{R} & \sqrt{2} &= 1.414213\dots \in \mathbb{R} \\ \frac{3}{4} &= 0.75 \in \mathbb{R} & \frac{123}{999} &= 0.123123\dots \in \mathbb{R} \\ \pi &= 3.141592\dots \in \mathbb{R} & \frac{12345}{100000} &= 0.12345 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

The real numbers are complete – this means that if we draw all the real numbers in a line, then there are no holes in the line. See figure 3.2 on page 11.

Rasyonel Sayılar

$$\mathbb{Q} = \{\text{tüm kesirler}\} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z} \text{ ve } b \neq 0 \right\}$$

kümesine **rasyonel sayılar** denir. Bunu $\mathbb{Q}$ ile gösteririz. Örneğin

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{0}{1} \in \mathbb{Q} & \frac{100}{13} &\in \mathbb{Q} \\ 1 &= \frac{1}{1} \in \mathbb{Q} & \sqrt{2} &\notin \mathbb{Q} \\ \frac{3}{4} &\in \mathbb{Q} & -4 &= \frac{8}{-2} \in \mathbb{Q} \\ \pi &\notin \mathbb{Q} & 0.12345 &= \frac{12345}{100000} \in \mathbb{Q}. \end{aligned}$$

$\mathbb{Q}$ daki sayılarla “+”, “−”, “×” ve “÷ ($\neq 0$ sayılarla)” yapabiliriz.”

Şimdi oldu mu?

Hayır!

Neden?

Çünkü rasyonel sayıları bir sayı doğrusu üzerinde gösterirsek, o zaman – şekil 3.1 deki gibi bir sürü rasyonel olmayan sayının karşılık geldiği nokta buluruz. Aslında, $\mathbb{Q}$ da ∞ sayıda delik bulmak mümkündür.

Hala yeni sayılara ihtiyacımız var!

Reel Sayılar

$$\mathbb{R} = \{\text{ondalık olarak yazılabilen sayılar}\}$$

kümesine **reel sayılar** kümesi denir. Örneğin

$$\begin{aligned} 0 &= 0.0 \in \mathbb{R} & \frac{100}{13} &= 7.692307\dots \in \mathbb{R} \\ \frac{23}{99} &= 0.232323\dots \in \mathbb{R} & \sqrt{2} &= 1.414213\dots \in \mathbb{R} \\ \frac{3}{4} &= 0.75 \in \mathbb{R} & \frac{123}{999} &= 0.123123\dots \in \mathbb{R} \\ \pi &= 3.141592\dots \in \mathbb{R} & \frac{12345}{100000} &= 0.12345 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Reel sayılar tamdır – yani bütün reel sayıları sayı ekseninde gösterecek olursak, eksen üzerinde reel sayı karşılık gelmeyen nokta kalmadığını görürüz. Sayfa 11 şekil 3.2i inceleyiniz.

Şimdi tamam mı?

Evet!



Figure 3.2: The Real Numbers

Şekil 3.2: Reel Sayılar

Are we happy now?

Yes!

4

Aralık

Intervals

Definition. A subset of $\mathbb{R}$ is called an *interval* if

- (i). it contains atleast 2 numbers; and
- (ii). it doesn't have any holes in it.

Example 4.1. The set $\{x \mid x \text{ is a real number and } x > 6\}$ is an interval.




Because 6 is not in this set, we use $\circ$ at 6.

Example 4.2. The set of all real numbers x such that $-2 \leq x \leq 5$ is an interval.



Because -2 and 5 are in this set, we use $\bullet$ at -2 and 5 .

Example 4.3. The set $\{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ and } x \neq 0\}$ is not an interval.



A finite interval is

- *closed* if it contains both its endpoints;
- *half-open* if it contains one of its endpoints;
- *open* if it does not contain its endpoints;

as shown in table 4.1 on page 13.


An infinite interval is

- *closed* if it contains a finite endpoint;
- *open* if it is not closed.

There is one exception to this rule: The whole real line is called both open and closed.

See table 4.2 on page 13.

We can combine two (or more) intervals with the notation $\cup$. For example, $[-8, -2] \cup [2, 8]$ is called the *union* of $[-8, -2]$ and $[2, 8]$ and is shown below.



$\mathbb{R}$ nin şu iki özelliğini sağlayan bir altkümese *aralık* denir


- (i). en az 2 sayı içeriyorsa; ve
- (ii). içerisinde hiç boşluk yoksa.

Örnek 4.1. The set $\{x \mid x \text{ reel sayı ve } x > 6\}$ kümesi bir aralıktır.




6 bu kümede olmadığından, 6 noktasında $\circ$ olarak gösteririz.

Örnek 4.2. $-2 \leq x \leq 5$ olacak şekildeki tüm x reel sayılarının kümesi bir aralıktır.



-2 ve 5 bu kümede yer aldıklarından, -2 ve 5 noktalarında $\bullet$ kullanırız.

Örnek 4.3. $\{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ ve } x \neq 0\}$ kümesi bir aralık değildir.



Bir sonlu aralık


- uç noktalarının her ikisini de içeriyorsa *kapalı*;
- uç noktalarının birisini içeriyorsa *yarı-açık*;
- uç noktalarının hiçbirini içermiyorsa, *açık* olarak adlandırılır.

13 daki tablo 4.1 gösterilmektedir. Bir sonsuz aralık

- bir sonlu uç noktasını içeriyorsa *kapalı*;
- kapalı değilse de *açık* adını alır.

Bu kuralın bir istisnası vardır: Tüm reel sayı doğrusu hem açık hem kapalıdır. Bakınız sayfa 13 tablo 4.2.

İki (veya daha fazla) aralığı, $\cup$ notasyonu ile birleştirebiliriz. Örneğin $[-8, -2] \cup [2, 8]$ 'a $[-8, -2]$ ve $[2, 8]$ in *birleşimi* denir ve aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Notation Notasyon	Set Açıklama	Type Tip	Picture Resim
(a, b)	$\{x a < x < b\}$	open / açık	
$[a, b]$	$\{x a \leq x \leq b\}$	closed / kapalı	
$[a, b)$	$\{x a \leq x < b\}$	half open / yarı-açık	
$(a, b]$	$\{x a < x \leq b\}$	half open / yarı-açık	

Table 4.1: Types of Finite Interval
Tablo 4.1: Sonlu Aralık Çeşitleri



Notation Notasyon	Set Açıklama	Type Tip	Picture Resim
(a, ∞)	$\{x a < x\}$	open / açık	
$[a, \infty)$	$\{x a \leq x\}$	closed / kapalı	
$(-\infty, b)$	$\{x x < b\}$	open / açık	
$(-\infty, b]$	$\{x x \leq b\}$	closed / kapalı	
$(-\infty, \infty)$	$\mathbb{R}$	both open and closed hem açık hem kapalı	

Table 4.2: Types of Infinite Interval
Tablo 4.2: Sonsuz Aralık Çeşitleri

5

Cartesian Coordinates Kartezyen Koordinatlar



Definition. The set


$$\{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}\}$$

is denoted by $\mathbb{R}^2$.

Definition. The point $O(0, 0)$ is called the *origin*.

Example 5.1. Let $A(2, -1)$ and $B(3, 1)$ be points in $\mathbb{R}^2$. Draw the triangle OAB .

solution:



Tanım.


$$\{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}\}$$

kümesini $\mathbb{R}^2$ ile gösteririz.

Tanım. $O(0, 0)$ noktası *orijin* olarak adlandırılır.


Örnek 5.2. $A(1, 2)$ ve $B(4, -2)$, $\mathbb{R}^2$ de noktalar olsun. OAB üçgenini çiziniz.

çözüm:




Example 5.3. Draw the region of points which satisfy $1 \leq x \leq 3$.

solution:




Example 5.5. Draw the region of points which satisfy $1 \leq x \leq 2$ and $1 \leq y \leq 3$.

solution:




Örnek 5.4. $-1 \leq y \leq 1$ koşulunu sağlayan bölgeyi çiziniz.

çözüm:



Örnek 5.6. $1 \leq x \leq 3$ ve $1 \leq y \leq 2$ eşitsizliklerinin sağladığı bölgeyi çiziniz.

çözüm:



Distance in $\mathbb{R}^2$.

Definition. The *distance* between $P_1(x_1, y_1)$ and $P_2(x_2, y_2)$ is

$$\|P_1 P_2\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Example 5.7. The distance between $A(1, 3)$ and $B(4, -1)$ is

$$\|AB\| = \sqrt{(4 - 1)^2 + (-1 - 3)^2} = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5.$$

$\mathbb{R}^2$ 'de Uzaklık

Tanım. $P_1(x_1, y_1)$ ve $P_2(x_2, y_2)$ arasındaki *uzaklık*

$$\|P_1 P_2\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Örnek 5.7. $A(1, 3)$ ve $B(4, -1)$ arasındaki uzaklık

$$\|AB\| = \sqrt{(4 - 1)^2 + (-1 - 3)^2} = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5.$$




Figure 5.1: The distance between P_1 and P_2 is easy to calculate using Pythagoras.

Şekil 5.1: P_1 ve P_2 arasındaki uzaklık Pisagor bağıntısı kullanılarak kolayca elde edilebilir.

Problems

Problem 5.1. Draw the regions of points in $\mathbb{R}^2$ which satisfy each of the following rules:

- (a). $-1 \leq x \leq 2$,
- (b). $-2 \leq x \leq 0$ and $0 \leq y \leq 2$,
- (c). $-1 \leq y \leq 1$ and $-1 \leq x \leq 1$,
- (d). $3 \leq y \leq 3$,

Problem 5.2. Let $A(1,1)$, $B(4,2)$ and $C(3,3)$ be points in $\mathbb{R}^2$. Which of the following three numbers is largest?

- (i). $\|AB\|$,
- (ii). $\|BC\|$,
- (iii). $\|CA\|$.

Sorular

Soru 5.1. Draw the regions of points in $\mathbb{R}^2$ which satisfy each of the following rules:

- (e). $1 \leq x \leq 3$ and $y = 1$,
- (f). $x = 4$ and $y \geq 0$,
- (g). $-2 \leq x \leq 1$ and $y \leq 0$,
- (h). $0 \leq x \leq 1$ and $0 \leq y \leq 1$.

Soru 5.2. Let $A(1,1)$, $B(4,2)$ and $C(3,3)$ be points in $\mathbb{R}^2$. Which of the following three numbers is largest?

- (i). $\|AB\|$,
- (ii). $\|BC\|$,
- (iii). $\|CA\|$.





Figure 5.2: A web comic from <https://xkcd.com/435/>.

Şekil 5.2: <https://xkcd.com/435/> adresinden alınan bir web çizgi romanı.

6

Functions

Fonksiyonlar



Definition. A *function* from a set D to a set Y is a rule that assigns a unique element of Y to each element of D .

Definition. The set D of all possible values of x is called the *domain* of f .

Definition. The set Y is called the *target* of f .

Definition. The set of all possible values of $f(x)$ is called the *range* of f .

If f is a function with domain D and target Y , we can write

$$f : D \rightarrow Y$$

domain

target

Example 6.1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$.

Example 6.2. $f : (-\infty, \infty) \rightarrow [0, \infty), f(x) = x^2$.

Tanım. D ve Y boş olmayan iki küme olmak üzere D nin her bir elemanını Y nin sadece bir elemanına eşleyen kurala *fonksiyon* denir.

Tanım. D kümesine f nin *tanım kümesi* denir.

Tanım. Y kümesine f nin *değer kümesi* denir.

Tanım. Bütün mümkün $f(x)$ değerlerinin kümesine f nin *görüntü kümesi* denir.

Eğer f tanım kümesi D ve değer kümesi Y olan bir fonksiyon ise, bunu şöyle gösteririz



$$f : D \rightarrow Y$$

tanım kümesi

değer kümesi

Örnek 6.1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$.

Örnek 6.2. $f : (-\infty, \infty) \rightarrow [0, \infty), f(x) = x^2$.

Figure 6.1: A function $f : D \rightarrow Y$.Şekil 6.1: $f : D \rightarrow Y$ Bir Fonksiyon.Figure 6.2: A function $f : D \rightarrow Y$.Şekil 6.2: $f : D \rightarrow Y$ Bir Fonksiyon.

function fonksiyon	domain (x) tanım kümesi (x)	range (y) görüntü kümesi (y)
$y = x^2$	$(-\infty, \infty)$	$[0, \infty)$
$y = \frac{1}{x}$	$\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \neq 0\}$	$\{y \mid y \in \mathbb{R}, y \neq 0\}$
$y = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$	$[0, \infty)$
$y = \sqrt{4-x}$	$(-\infty, 4]$	$[0, \infty)$
$y = \sqrt{1-x^2}$	$[-1, 1]$	$[0, 1]$
$y = x^2$	$[1, 2]$	$[1, 4]$
$y = x^2$	$[2, \infty)$	$[4, \infty)$
$y = x^2$	$(-\infty, -2]$	$[4, \infty)$
$y = 1 + x^2$	$[1, 3)$	$[2, 10)$
$y = 1 - \sqrt{x}$	$[0, \infty)$	$(-\infty, 1]$

Table 6.1: Domains and ranges of some fuctions.

Tablo 6.1: Bazı fonksiyonların tanım ve görüntü kümeleri.

Graphs of Functions

Definition. The *graph* of f is the set containing all the points (x, y) which satisfy $y = f(x)$.


Example 6.3. Graph the function $y = 1 + x^2$ over the interval $[-2, 2]$.

solution:


STEP 1. Make a table of (x, y) points which satisfy $y = 1 + x^2$.

x	y
-2	5
-1	2
0	1
1	2
$\frac{3}{2}$	$\frac{13}{4} = 3\frac{1}{4}$
2	5

STEP 2. Plot these points.



STEP 3. Draw a smooth curve through these points.



Fonksiyonların Grafikleri

Tanım. $y = f(x)$ eşitliğini sağlayan (x, y) noktalarının kümesine f nin *grafığı* denir.


Örnek 6.4. $y = \sqrt{1+x}$ fonksiyonunun $[-1, 8]$ aralığındaki grafiğini çiziniz.

çözüm:


ADIM 1. $y = \sqrt{1+x}$ eşitliğini sağlayan (x, y) noktalarının bir tablosunu yapın.

x	y
-1	0
$-\frac{1}{2}$	≈ 0.707
0	1
1	≈ 1.414
3	2
8	3

ADIM 2. Bu noktaları koordinat sisteminde gösterin.



ADIM 3. Bu noktalardan geçen pürüzsüz bir eğri çiziniz.







Figure 6.3: The Vertical Line Test.
Şekil 6.3: Dikey Doğru Testi

The Vertical Line Test

Not every curve that you draw is a graph of a function.

A function can have only one value $f(x)$ for each $x \in D$. This means that a vertical line can intersect the graph of a function at most once.

See figure 6.3. A circle can not be the graph of a function because some vertical lines intersect the circle at two points.

If $a \in D$, then the vertical line $x = a$ will intersect the graph of $f : D \rightarrow Y$ only at the point $(a, f(a))$.

Düşey Doğru Testi

Çizdiğiniz her eğri bir fonksiyonun grafiği değildir. Bir fonksiyon her $x \in D$ için yalnızca bir tane $f(x)$ değerine sahip olabilir. Bu, düşey her doğrunun, bir fonksiyonun grafiğini en fazla bir kez kesebileceği anlamına gelir.


Bakınız şekil 6.3. Bir çember, bir fonksiyonun grafiği olamaz; çünkü bazı düşey doğrular çemberi iki noktada keser.

$a \in D$ ise, $x = a$ düşey doğrusu $f : D \rightarrow Y$ 'nin grafiğini $(a, f(a))$ noktasında kesecektir.

Piecewise-Defined Functions


Example 6.5.

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$



Example 6.6.


$$f(x) = \begin{cases} -x & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$



Parçalı Tanımlı Fonksiyonlar

Örnek 6.7.

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & x \leq -1 \\ x^3 & -1 < x < 1 \\ 3 - x & x \geq 1 \end{cases}$$



Increasing and Decreasing Functions

Definition. Let I be an interval. Let $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ be a function.

- (i). f is called **increasing on I** if

$$f(x_1) < f(x_2)$$

for all $x_1, x_2 \in I$ which satisfy $x_1 < x_2$;

- (ii). f is called **decreasing on I** if

$$f(x_1) > f(x_2)$$

for all $x_1, x_2 \in I$ which satisfy $x_1 < x_2$.

Artan ve Azalan Fonksiyonlar

Tanım. I bir aralık ve $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ bir fonksiyon olsun.

- (i). her $x_1, x_2 \in I$ için $x_1 < x_2$ iken

$$f(x_1) < f(x_2)$$

oluyorsa f ye **I da artan** denir;

- (ii). her $x_1, x_2 \in I$ için $x_1 < x_2$ iken

$$f(x_1) > f(x_2)$$

oluyorsa f ye **I da azalan** denir.




Figure 6.4: A increasing function, a decreasing function and a function which is neither increasing nor decreasing.

Şekil 6.4:

Even Functions and Odd Functions

Recall that

- 2, 4, 6, 8, 10, ... are even numbers; and
- 1, 3, 5, 7, 9, ... are odd numbers.

Definition.

- (i). $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ is an **even function** if $f(-x) = f(x)$ for all $x \in D$;
- (ii). $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ is an **odd function** if $f(-x) = -f(x)$ for all $x \in D$.

Example 6.8. $f(x) = x^2$ is an even function because

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x).$$

See figure 6.5.

Example 6.9. $f(x) = x^3$ is an odd function because

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x).$$

See figure 6.6.

Çift Fonksiyonlar ve Tek Fonksiyonlar

Hatırlayalım ki

- 2, 4, 6, 8, 10, ... sayıları çift; ve
- 1, 3, 5, 7, 9, ... sayıları da tek sayılardır.

Tanım.

- (i). Bir $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyona her $x \in D$ için $f(-x) = f(x)$ oluyorsa **çift fonksiyon** denir ;
- (ii). $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu her $x \in D$ için $f(-x) = -f(x)$ oluyorsa **tek fonksiyon** adını alır.

Örnek 6.8. $f(x) = x^2$ bir çift fonksiyondur çünkü

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x).$$

Bakınız şekil 6.5.

Örnek 6.9. $f(x) = x^3$ bir tek fonksiyondur çünkü

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x).$$

Bakınız şekil 6.6.




Figure 6.5: 2 is an even number and $f(x) = x^2$ is an even function.

Şekil 6.5: 2 bir çift sayıdır ve $f(x) = x^2$ bir çift fonksiyondur.

Example 6.10. Is $f(x) = x^2 + 1$ even, odd or neither?

solution: Since

$$f(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1 = f(x),$$

f is an even function.

Example 6.11. Is $g(x) = x + 1$ even, odd or neither?

solution: Since $g(-2) = -2 + 1 = -1$ and $g(2) = 3$, we have $g(-2) \neq g(2)$ and $g(-2) \neq -g(2)$. Hence g is neither even nor odd.




Figure 6.6: 3 is an odd number and $f(x) = x^3$ is an odd function.

Şekil 6.6: 3 bir tek sayıdır ve $f(x) = x^3$ bir tek fonksiyon.

Örnek 6.10. $f(x) = x^2 + 1$ fonksiyonu çift, tek yoksa hiçbirini mi?

çözüm:

$$f(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1 = f(x),$$

f olduğundan bir çift fonksiyondur.

Örnek 6.11. $g(x) = x + 1$ fonksiyonu çift, tek veya hiçbirisi mi?


çözüm: $g(-2) = -2 + 1 = -1$ ve $g(2) = 3$ olduğundan, $g(-2) \neq g(2)$ ve $g(-2) \neq -g(2)$ olur. Böylece g fonksiyonu ne çift fonksiyondur ne de tek.

Linear Functions

$$f(x) = mx + b$$

$$(m, b \in \mathbb{R})$$

Lineer Fonksiyonlar




Power Functions

Kuvvet Fonksiyonları

"x to the power of a"

$$f(x) = x^a \quad (a \in \mathbb{R})$$



Polynomials

Polinomlar

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$(n \in \mathbb{N} \cup \{0\}, a_j \in \mathbb{R}).$$

The domain of a polynomial is always $(-\infty, \infty)$. If $n > 0$ and $a_n \neq 0$, then n is called the **degree** of $p(x)$.

Bir polinomun tanım kümesi $(-\infty, \infty)$ dur. $n > 0$ ve $a_n \neq 0$ ise, n tamsayısına $p(x)$ in **derecesi** denir.

Rational Functions

Rasyonel Fonsiyonlar

$$\begin{array}{c} \text{rational function} \\ \text{rasyonel fonksiyon} \end{array} \quad f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} \quad \begin{array}{c} \text{polynomial} \\ \text{polinom fonksiyon} \end{array}$$

Example 6.12.

$$f(x) = \frac{2x^3 - 3}{7x + 4}$$

Örnek 6.13.

$$g(x) = \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2}$$

Exponential Functions

$$f(x) = a^x$$

$$(a \in \mathbb{R}, a > 0, a \neq 1)$$

The domain of an exponential function is $(-\infty, \infty)$.


Logarithmic Functions

$$y = \log_a x \iff x = a^y$$

$$(a \in \mathbb{R}, a > 0, a \neq 1)$$


“log base a of x ”

Üstel Fonksiyonlar




Üstel fonksiyonun tanım kümesi $(-\infty, \infty)$ dur.

Logaritmik Fonksiyonlar



Angles

There are two ways to measure angles. Using degrees or using radians.




We have that

$$\begin{aligned}\pi \text{ radians} &= 180 \text{ degrees} \\ 1 \text{ radian} &= \frac{180}{\pi} \text{ degrees} \\ 1 \text{ degree} &= \frac{\pi}{180} \text{ radians.}\end{aligned}$$

Remark. In Calculus, we use radians!!!! If you see an angle in Part IV of this course, it will be in radians. Calculus doesn't work with degrees!!


Açılar

Açı ölçmede iki yol vardır. Derece kullanarak veya radyan kullanarak.



Şu bağıntılar mevcuttur.

$$\begin{aligned}\pi \text{ radyan} &= 180 \text{ derece} \\ 1 \text{ radyan} &= \frac{180}{\pi} \text{ derece} \\ 1 \text{ derece} &= \frac{\pi}{180} \text{ radyan.}\end{aligned}$$




Not. Kalkülüste radyan kullanınız!!!! Bu dersin IV kısmında bir açı görürseniz, o radyan cinsinden olacaktır. Kalkülüste derece kullanmayacağız!!

Trigonometric Functions



sine	$\sin \theta = \frac{y}{r}$	sinüs
cosine	$\cos \theta = \frac{x}{r}$	kosinüs
tangent	$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$	tanjant
secant	$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$	sekant
cosecant	$\operatorname{cosec} \theta = \csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$	kosekant
cotangent	$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$	kotanjan

Remark. Note that $\tan \theta$ and $\sec \theta$ are only defined if $\cos \theta \neq 0$; and $\operatorname{cosec} \theta$ and $\cot \theta$ are only defined if $\sin \theta \neq 0$.

Trigonometrik Fonsiyonlar




Not. $\tan \theta$ ve $\sec \theta$ nın sadece $\cos \theta \neq 0$ olduğunda; ve $\operatorname{cosec} \theta$ ve $\cot \theta$ nın da tam olarak $\sin \theta \neq 0$ ise tanımlı olduklarına dikkat edin.



$$\begin{aligned}\sin 45^\circ &= \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \cos 45^\circ &= \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \tan 45^\circ &= \tan \frac{\pi}{4} = 1 \\ \sec 45^\circ &= \sec \frac{\pi}{4} = \sqrt{2} \\ \operatorname{cosec} 45^\circ &= \operatorname{cosec} \frac{\pi}{4} = \sqrt{2} \\ \cot 45^\circ &= \cot \frac{\pi}{4} = 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin 60^\circ &= \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos 60^\circ &= \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \\ \tan 60^\circ &= \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} \\ \sec 60^\circ &= \sec \frac{\pi}{3} = 2 \\ \operatorname{cosec} 60^\circ &= \operatorname{cosec} \frac{\pi}{3} = \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \cot 60^\circ &= \cot \frac{\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$



Please see
Lütfen bkz. <https://tinyurl.com/ocd35mf>

Problems

Problem 6.1 (Even and Odd Functions). State whether the following functions are even, odd or neither.

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| (a) $f(x) = 3$ | (g) $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ |
| (b) $f(x) = x^{77}$ | (h) $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ |
| (c) $f(x) = x^2 + 1$ | (i) $f(x) = \frac{1}{x-1}$ |
| (d) $f(x) = x^3 + x$ | (j) $f(x) = \sin x$ |
| (e) $f(x) = x^3 + x^2$ | (k) $f(x) = 2x + 1$ |
| (f) $f(x) = x^3 + 1$ | (l) $f(x) = \cos x$ |

Problem 6.2 (Pointwise-Defined Functions). Graph the function $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ defined by

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ x & x \geq 0. \end{cases}$$

Problem 6.3 (Rational Functions). Graph the following three functions on the same axes:

- (a). $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x;$
 (b). $g : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \frac{1}{x};$
 (c). $h : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = x + \frac{1}{x}.$

Problem 6.4 (Angles). Convert the following angles into radians:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (a). $-90^\circ,$ | (d). $180^\circ,$ |
| (b). $135^\circ,$ | (e). $36^\circ,$ |
| (c). $120^\circ,$ | (f). $20^\circ.$ |

Convert the following angles into degrees:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (g). $\frac{3\pi}{2}$ radians, | (j). $\frac{5\pi}{6}$ radians, |
| (h). $\frac{\pi}{10}$ radians, | (k). $\frac{-\pi}{5}$ radians, |
| (i). $\frac{\pi}{6}$ radians, | (l). 3π radians. |

Problem 6.5 (Domains). Give the largest possible set of real numbers on which each of the following functions is defined:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| (a). $a(x) = 1 + x^2,$ | (d). $d(x) = \sqrt{x^2 - 3x},$ |
| (b). $b(x) = 1 - \sqrt{x},$ | (e). $e(x) = \frac{4}{3-x},$ |
| (c). $c(x) = \sqrt{5x + 10},$ | (f). $f(x) = \frac{2}{x^2-16}.$ |

Sorular

Soru 6.1 (Tek ve Çift Fonksiyonlar). Aşağıdaki fonksiyonların çift, tek veya hiçbirisi olup olmadığını bulunuz.

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| (a). $f(x) = 3$ | (g). $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ |
| (b). $f(x) = x^{77}$ | (h). $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ |
| (c). $f(x) = x^2 + 1$ | (i). $f(x) = \frac{1}{x-1}$ |
| (d). $f(x) = x^3 + x$ | (j). $f(x) = \sin x$ |
| (e). $f(x) = x^3 + x^2$ | (k). $f(x) = 2x + 1$ |
| (f). $f(x) = x^3 + 1$ | (l). $f(x) = \cos x$ |

Soru 6.2 (Parçalı-Tanımlı Fonksiyonlar).

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ x & x \geq 0. \end{cases}$$

ile tanımlı $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

Soru 6.3 (Rayonel Fonksiyonlar). Aşağıdaki üç fonksiyonun grafiğini aynı koordinat düzleminde çiziniz:

- (a). $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x;$
 (b). $g : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \frac{1}{x};$
 (c). $h : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = x + \frac{1}{x}.$

Soru 6.4 (Açılar). Convert the following angles into radians:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (a). $-90^\circ,$ | (d). $180^\circ,$ |
| (b). $135^\circ,$ | (e). $36^\circ,$ |
| (c). $120^\circ,$ | (f). $20^\circ.$ |

Convert the following angles into degrees:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (g). $\frac{3\pi}{2}$ radians, | (j). $\frac{5\pi}{6}$ radians, |
| (h). $\frac{\pi}{10}$ radians, | (k). $\frac{-\pi}{5}$ radians, |
| (i). $\frac{\pi}{6}$ radians, | (l). 3π radians. |

Soru 6.5 (Tanım Kümeleri). Give the largest possible set of real numbers on which each of the following functions is defined:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| (a). $a(x) = 1 + x^2,$ | (d). $d(x) = \sqrt{x^2 - 3x},$ |
| (b). $b(x) = 1 - \sqrt{x},$ | (e). $e(x) = \frac{4}{3-x},$ |
| (c). $c(x) = \sqrt{5x + 10},$ | (f). $f(x) = \frac{2}{x^2-16}.$ |

Sigma Notation

Sigma Notasyonu

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + \dots + a_{n-1} + a_n$$

the Greek letter Sigma

$$\sum_{k=1}^n a_k$$

the sum finishes at $k = n$
indis k , $k = n$ 'de son bulur

the sum starts at $k = 1$
indis k , $k = 1$ 'de başlar

Example 7.1.

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 + 7^2 + 8^2 + 9^2 + 10^2 + 11^2 = \sum_{k=1}^{11} k^2$$

$$f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(99) + f(100) = \sum_{k=1}^{100} f(k)$$

$$\sum_{k=1}^5 k = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

Example 7.2. Please see Örnek 7.2.

Example 7.3. I want to find a formula for $1 + 2 + 3 + \dots + n$. Note that

$$2(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + (n-1) + n)$$

$$\begin{aligned} &= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + (n-1) + n \\ &\quad + n + (n-1) + (n-2) + (n-3) + (n-4) + \dots + 2 + 1 \\ &= (n+1) + (n+1) + (n+1) + (n+1) + (n+1) + \dots + (1+n) + (1+n) \\ &= n(n+1). \end{aligned}$$

Örnek 7.1. Bkz. Example 7.1.

Örnek 7.2.

$$\sum_{k=1}^3 (-1)^k k = (-1)(1) + (-1)^2(2) + (-1)^3(3) = -1 + 2 - 3 = -2$$

$$\sum_{k=1}^2 \frac{k}{k+1} = \frac{1}{1+1} + \frac{2}{2+1} = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$$

$$\sum_{k=4}^5 \frac{k^2}{k-1} = \frac{4^2}{4-1} + \frac{5^2}{5-1} = \frac{16}{3} + \frac{25}{4} = \frac{139}{12}$$

Örnek 7.3. $1 + 2 + 3 + \dots + n$ için bir formül bulmak istiyoruz. Dikkat edilirse

Therefore

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Similarly (but more difficult) we can find that

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

and

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

Dolayısıyla

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Benzer olarak (ama daha zor) şunu buluruz

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

ve

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$


Part II

The Geometry of Space

8

Polar Coordinates



Kutupsal Koordinatlar




anticlockwise = positive angle
saat yönünün tersi = pozitif açı



clockwise = negative angle
saat yönünde = negatif açı



Example 8.1.**Example 8.3.** Find all the polar coordinates of $P(2, 30^\circ)$.

solution: We can have either $r = 2$ or $r = -2$. For $r = 2$, we can have

$$\theta = 30^\circ, 30^\circ \pm 360^\circ, 30^\circ \pm 720^\circ, 30^\circ \pm 1080^\circ, \dots$$


For $r = -2$, we can have

$$\theta = 210^\circ, 210^\circ \pm 360^\circ, 210^\circ \pm 720^\circ, 210^\circ \pm 1080^\circ, \dots$$


Therefore

$$P(2, 30^\circ) = P(2, (30 + 360n)^\circ) = P(-2, (210 + 360m)^\circ)$$

for all $m, n \in \mathbb{Z}$.

Example 8.4.**Example 8.6.**

- (a). $r = 1$ and $r = -1$ are both equations for a circle of radius 1 centred at the origin.
- (b). $\theta = 30^\circ$, $\theta = 210^\circ$ and $\theta = -150^\circ$ are all equations for the same line.

Örnek 8.2.**Örnek 8.3.** $P(2, 30^\circ)$ noktasının tüm kutupsal koordinatlarını bulunuz.

çözüm: Ya $r = 2$ ya da $r = -2$ olmalıdır. $r = 2$ ise,


$$\theta = 30^\circ, 30^\circ \pm 360^\circ, 30^\circ \pm 720^\circ, 30^\circ \pm 1080^\circ, \dots$$

olmalıdır. $r = -2$ olduğunda ise,

$$\theta = 210^\circ, 210^\circ \pm 360^\circ, 210^\circ \pm 720^\circ, 210^\circ \pm 1080^\circ, \dots$$

olmalıdır. Böylece her $m, n \in \mathbb{Z}$ için,

$$P(2, 30^\circ) = P(2, (30 + 360n)^\circ) = P(-2, (210 + 360m)^\circ).$$





Örnek 8.5.**Örnek 8.6.**

- (a). $r = 1$ ve $r = -1$ her ikisi merkezi orijin yarıçapı 1 olan çemberin denklemleridir.
- (b). $\theta = 30^\circ$, $\theta = 210^\circ$ ve $\theta = -150^\circ$ herbiri aynı doğruya ait denklemlerdir.

Example 8.7. Draw the sets of points whose polar coordinates satisfy the following:

- (a). $1 \leq r \leq 2$ and $0 \leq \theta \leq 90^\circ$.
 (b). $-3 \leq r \leq 2$ and $\theta = 45^\circ$.
 (c). $r \leq 0$ and $\theta = 60^\circ$.
 (d). $120^\circ \leq \theta \leq 150^\circ$.

solution:



Relating Polar and Cartesian Coordinates

$x = r \cos \theta$ $y = r \sin \theta$	$x^2 + y^2 = r^2$ $\tan \theta = \frac{y}{x}$
---	---

Example 8.8. Convert the polar coordinates $(r, \theta) = (-3, 90^\circ)$ into Cartesian coordinates.

solution:


$$(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta) = (-3 \cos 90^\circ, -3 \sin 90^\circ) = (0, -3).$$

Örnek 8.7. Polar koordinatları aşağıdakileri sağlayan noktaları çiziniz:

- (a). $1 \leq r \leq 2$ ve $0 \leq \theta \leq 90^\circ$.
 (b). $-3 \leq r \leq 2$ ve $\theta = 45^\circ$.
 (c). $r \leq 0$ ve $\theta = 60^\circ$.
 (d). $120^\circ \leq \theta \leq 150^\circ$.

çözüm:

Kutupsal ve Kartezyen Koordinatlar Arasındaki İlişki



Örnek 8.8. $(r, \theta) = (-3, 90^\circ)$ kutupsal koordinatlarını kartezyen koordinatlarına dönüştürünüz.

çözüm:

$$(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta) = (-3 \cos 90^\circ, -3 \sin 90^\circ) = (0, -3).$$

Example 8.9. Find polar coordinates for the Cartesian coordinates $(x, y) = (5, -12)$.

solution: Choosing $r > 0$, we calculate that

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13.$$

To find θ we use the equation $y = r \sin \theta$ to calculate that

$$\theta = \sin^{-1} \frac{y}{r} = \sin^{-1} \frac{-12}{13} \approx -67.38^\circ.$$

Therefore

$$(r, \theta) = (13, -67.38^\circ).$$




Figure 8.1: The point P has Cartesian coordinates $(x, y) = (5, -12)$ and polar coordinates $(r, \theta) = (13, -67.38^\circ)$

Şekil 8.1:

Örnek 8.9. $(x, y) = (5, -12)$ noktasının kutupsal koordinatlarını bulunuz.

çözüm: $r > 0$ alarak,

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$$

buluruz. Şimdi θ 'yı bulmak için $y = r \sin \theta$ denklemi kullanılır ve

$$\theta = \sin^{-1} \frac{y}{r} = \sin^{-1} \frac{-12}{13} \approx -67.38^\circ$$

elde edilir. Dolayısıyla

$$(r, \theta) = (13, -67.38^\circ).$$




Figure 8.2: The graph of $z = \tan \theta$. Note that $\tan -67.38^\circ = -\frac{12}{5} = \tan 112.62^\circ$.

Şekil 8.2: $z = \tan \theta$ grafiği gösterilmektedir. Dikkat edilirse, $\tan -67.38^\circ = -\frac{12}{5} = \tan 112.62^\circ$.

Problems

Problem 8.1. Convert the following polar coordinates to Cartesian coordinates.

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| (a). $(3, 0)$ | (d). $(2, 420^\circ)$ |
| (b). $(-3, 0)$ | (e). $(2, 60^\circ)$ |
| (c). $(2, 120^\circ)$ | (f). $(-3, 360^\circ)$ |

Problem 8.2. Find polar coordinates for each of the following sets of Cartesian coordinates.

- | | |
|----------------|-----------------------|
| (a). $(1, 1)$ | (c). $(\sqrt{3}, -1)$ |
| (b). $(-3, 0)$ | (d). $(-3, 4)$ |

Problem 8.3. Draw the sets of points whose polar coordinates satisfy the following:

- | | |
|------------------------|--|
| (a). $r = 2$ | (d). $0 \leq \theta \leq 30^\circ$ & $r \geq 0$ |
| (b). $0 \leq r \leq 2$ | (e). $\theta = 120^\circ$ & $r \leq -2$ |
| (c). $r \geq 2$ | (f). $0 \leq \theta \leq 90^\circ$ & $1 \leq r \leq 2$ |

Sorular

Soru 8.1. Aşağıdaki kutupsal koordinatları Kartezyen koordinatlara dönüştürünüz.

- | |
|------------------------------|
| (g). $(-2, -60^\circ)$ |
| (h). $(1, 180^\circ)$ |
| (i). $(2\sqrt{2}, 45^\circ)$ |

Soru 8.2. Aşağıdaki Kartezyen koordinatların herbiri için bir kutupsal koordinat bulunuz.



- | |
|-----------------------|
| (e). $(-2, -2)$ |
| (f). $(-\sqrt{3}, 1)$ |

Soru 8.3. Kutupsal koordinatları aşağıdakileri sağlayan noktaların kümesini çizin:

- | |
|---|
| (g). $45^\circ \leq \theta \leq 315^\circ$ & $1 \leq r \leq 2$ |
| (h). $-45^\circ \leq \theta \leq 45^\circ$ & $1 \leq r \leq 2$ |
| (i). $-45^\circ \leq \theta \leq 45^\circ$ & $-2 \leq r \leq 1$ |



Conic Sections

Konik Kesitler





a circle
çember



$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$$



an ellipse
elips



a parabola
parabol



a hyperbola
hiperbol

Parabolas



Figure 9.1: Clifton suspension bridge, Bristol, UK. The cables of a suspension bridges hang in a shape which is almost (but not exactly) a parabola.

Şekil 9.1: Clifton süspansiyon köprüsü, Bristol, Birleşik Krallık. Asma köprülerin halatları, neredeyse (ama tam olarak değil) bir parabol biçiminde asılı durmakta.

To describe a parabola, we need a point called a *focus* and a line called a *directrix*. See figure 9.2.

Definition. A point $P(x, y)$ lies on the *parabola* if and only if

$$\|PF\| = \|PQ\|.$$

Now

$$\begin{aligned}\|PF\| &= \text{distance between } P(x, y) \text{ and } F(0, p) \\ &= \sqrt{(x - 0)^2 + (y - p)^2} = \sqrt{x^2 + (y - p)^2}\end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned}\|PQ\| &= \text{distance between } P(x, y) \text{ and } Q(x, -p) \\ &= \sqrt{(x - x)^2 + (y + p)^2} = \sqrt{(y + p)^2} = y + p.\end{aligned}$$

Therefore

$$\begin{aligned}\|PF\| &= \|PQ\| \\ \sqrt{x^2 + (y - p)^2} &= y + p \\ x^2 + (y - p)^2 &= (y + p)^2 \\ x^2 + y^2 - 2py + p^2 &= y^2 + 2py + p^2 \\ x^2 - 2py &= 2py \\ \boxed{x^2} &= 4py\end{aligned}$$

Paraboller




Figure 9.3: The motion of a tennis ball.

Şekil 9.3: Bir tenis topunun hareketi.



Figure 9.4: Satellite dishes.

Şekil 9.4: Uydu antenleri.

Bir parabolü tanımlamak için, *odak* adı verilen bir noktaya ve *doğrultman* adı verilen bir doğruya ihtiyaç var. Bkz şekil 9.2.

Tanım. Bir $P(x, y)$ noktası bir *parabol* üzerindedir ancak ve ancak


$$\|PF\| = \|PQ\|.$$

Şimdi

$$\begin{aligned}\|PF\| &= P(x, y) \text{ ile } F(0, p) \text{ arasındaki uzaklık} \\ &= \sqrt{(x - 0)^2 + (y - p)^2} = \sqrt{x^2 + (y - p)^2}\end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned}\|PQ\| &= P(x, y) \text{ ile } Q(x, -p) \text{ arasındaki uzaklık} \\ &= \sqrt{(x - x)^2 + (y + p)^2} = \sqrt{(y + p)^2} = y + p.\end{aligned}$$



Bu nedenle

$$\begin{aligned}
 \|PF\| &= \|PQ\| \\
 \sqrt{x^2 + (y - p)^2} &= y + p \\
 x^2 + (y - p)^2 &= (y + p)^2 \\
 x^2 + y^2 - 2py + p^2 &= y^2 + 2py + p^2 \\
 x^2 - 2py &= 2py \\
 x^2 &= 4py
 \end{aligned}$$

Figure 9.2: A parabola with focus at $F(0, p)$ and directrix $y = -p$.

Şekil 9.2: Odak noktası $F(0, p)$ ve doğrultmanı $y = -p$ olan parabol.

graph graf				
equation denklem	$x^2 = 4py$	$x^2 = -4py$	$y^2 = 4px$	$y^2 = -4px$
focus odak	$F(0, p)$	$F(0, -p)$	$F(p, 0)$	$F(-p, 0)$
directrix doğrultman	$y = -p$	$y = p$	$x = -p$	$x = p$

Example 9.1. Find the focus and directrix of the parabola $y^2 = 10x$.

solution: Our equation $y^2 = 10x$ looks like $y^2 = 4px$ with $p = \frac{10}{4} = 2.5$.

Therefore the focus is at the point $F(2.5, 0)$ and the directrix is the line $x = -2.5$.

Example 9.2. Find the equation for the parabola which has focus $F(0, -10)$ and directrix $y = 10$.

solution: Clearly $p = 10$ and $x^2 = -4py$. Therefore the answer is $x^2 = -40y$.

Örnek 9.1. $y^2 = 10x$ parabolünün odak noktasını ve doğrultmanını bulunuz.

çözüm: $y^2 = 10x$ denklemimiz olmak üzere $y^2 = 4px$ biçimindedir. Yani odak noktası $F(2.5, 0)$ ve doğrultmanı da $x = -2.5$ olur.

Örnek 9.2. Odağı $F(0, -10)$ noktası ve doğrultmanı $y = 10$ doğrusu olan parabolün denklemini yazınız.

çözüm: Şurası açık ki $p = 10$ ve $x^2 = -4py$ dir. Bu nedenle yanıt $x^2 = -40y$ olur.

Ellipses




Figure 9.5: Our solar system.
Şekil 9.5: Güneş sistemimiz.

Elipsler



Figure 9.6: Tycho Brahe Planetarium, Copenhagen, Denmark.
Şekil 9.6: Tycho Brahe Planetariumu, Kopenhag, Danimarka.




Figure 9.7: An ellipse with foci at $F_1(-c, 0)$ and $F_2(c, 0)$.
Şekil 9.7: Odakları $F_1(-c, 0)$ ve $F_2(c, 0)$ olan elips.

To describe an ellipse, we need two **foci**. See figure 9.7.

Definition. A point $P(x, y)$ is on the **ellipse** if and only if

$$\|PF_1\| + \|PF_2\| = 2a.$$

So

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a.$$

This rearranges to

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1.$$




Figure 9.8: Drawing an ellipse with a pencil, two pins and a piece of string.
Şekil 9.8: İki toplu iğne, bir kalem ve biraz ip kullanarak elips çizmek.

Elipsi tanımlamak için, we need two foci. Bkz. şekil 9.7.

Tanım. Bir $P(x, y)$ noktası **elips** üzerindedir ancak ve ancak

$$\|PF_1\| + \|PF_2\| = 2a.$$

Buradan hareketle

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a.$$

Bunu da düzenlersek

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

If we set $b = \sqrt{a^2 - c^2}$, then we have

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1} \quad (0 < b < a).$$

buluruz. $b = \sqrt{a^2 - c^2}$ dersek, o zaman

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1} \quad (0 < b < a).$$

graph		graf
equation	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (0 < b < a)$	
centre-to-focus distance	$c = \sqrt{a^2 - b^2}$	
foci	$F_1(-c, 0) \ \& \ F_2(c, 0)$	
vertices	$(-a, 0) \ \& \ (a, 0)$	
	$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (0 < b < a)$	denklem
	$c = \sqrt{a^2 - b^2}$	merkez- odak uzaklığı
	$F_1(0, -c) \ \& \ F_2(0, c)$	odaklar
	$(0, -a) \ \& \ (0, a)$	tepe noktaları

Example 9.3. The ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ has

- $a = 4$ and $b = 3$;
- centre-to-focus distance $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$;
- centre at $(0, 0)$;
- foci at $(-\sqrt{7}, 0)$ and $(\sqrt{7}, 0)$; and
- vertices at $(-4, 0)$ and $(4, 0)$.

Example 9.4. The ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ has

- $a = 5$ and $b = 4$;
- centre-to-focus distance $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - 16} = \sqrt{9} = 3$;
- centre at $(0, 0)$;
- foci at $(0, -3)$ and $(0, 3)$; and
- vertices at $(0, -5)$ and $(0, 5)$.

Örnek 9.3. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ elipsinin

- $a = 4$ ve $b = 3$;
- merkez-odak uzaklığı $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$;
- merkezi $(0, 0)$;
- odakları $(-\sqrt{7}, 0)$ ve $(\sqrt{7}, 0)$; and
- tepe noktaları $(-4, 0)$ ve $(4, 0)$.

Örnek 9.4. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ elipsi

- $a = 5$ ve $b = 4$;
- merkez-odak uzaklığı $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - 16} = \sqrt{9} = 3$;
- merkezi $(0, 0)$;
- odakları $(0, -3)$ ve $(0, 3)$; ve
- tepe noktaları da $(0, -5)$ ve $(0, 5)$.

Hyperbolas



Figure 9.9: Cooling towers.
Şekil 9.9:




Figure 9.11: A hyperbola with foci at $F_1(-c, 0)$ and $F_2(c, 0)$.
Şekil 9.11:

To describe a hyperbola, we again need two foci. See figure 9.11.

Definition. A point $P(x, y)$ is on the *hyperbola* if and only if

$$\left| \|PF_1\| - \|PF_2\| \right| = 2a.$$

So

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a.$$

This rearranges to

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

where $c > a > 0$. If we set $b = \sqrt{c^2 - a^2}$, then

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Hiperboller



Figure 9.10: Twin Arch 138, Ichinomiya City, Japan.
Şekil 9.10:

Hiperbolü tanımlamak için, yine iki odak noktasına ihtiyaç var. Bkz. şekil 9.11.

Tanım. Bir $P(x, y)$ noktası bir *hiperbol* üzerindedir ancak ve ancak

$$\left| \|PF_1\| - \|PF_2\| \right| = 2a.$$

Bundan hareketle,



$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a.$$

Düzenlersek,

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

buluruz ki burada $c > a > 0$. Şimdi $b = \sqrt{c^2 - a^2}$ dersek, o zaman

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

graph			graf
equation	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$	denklem
centre-to-focus distance	$c = \sqrt{a^2 + b^2}$	$c = \sqrt{a^2 + b^2}$	merkez-odak uzaklığı
foci	$F_1(-c, 0) \text{ \& } F_2(c, 0)$	$F_1(0, -c) \text{ \& } F_2(0, c)$	odaklar
vertices	$(-a, 0) \text{ \& } (a, 0)$	$(0, -a) \text{ \& } (0, a)$	tepe noktaları

Example 9.5. The hyperbola $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ has

- $a = 2$ and $b = \sqrt{5}$;
- centre at $(0, 0)$;
- centre-to-focus distance $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$;
- foci at $(-3, 0)$ and $(3, 0)$; and
- vertices at $(-2, 0)$ and $(2, 0)$.

Example 9.6. The hyperbola $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1$ has

- $a = 3$ and $b = 4$;
- centre at $(0, 0)$;
- centre-to-focus distance $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$;
- foci at $(0, -5)$ and $(0, 5)$; and
- vertices at $(0, -3)$ and $(0, 3)$.

Örnek 9.5. Hiperbol olarak $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ alırsak,

- $a = 2$ ve $b = \sqrt{5}$;
- merkezi $(0, 0)$;
- merkez-odak uzaklığı $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$;
- odakları $(-3, 0)$ ve $(3, 0)$; ve
- tepe noktaları da $(-2, 0)$ ve $(2, 0)$.

Örnek 9.6. $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1$ hiperbolü için

- $a = 3$ ve $b = 4$;
- merkez $(0, 0)$;
- merkez-odak uzaklığı $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$;
- odaklar $(0, -5)$ ve $(0, 5)$; ve
- tepe noktaları $(0, -3)$ ve $(0, 3)$.

Reflective Properties

Parabolas, ellipses and hyperbolas are useful in architecture and engineering because of their reflective properties.




Figure 9.12: Rays originating at the focus of a parabola are reflected out of the parabola as parallel lines.

Şekil 9.12: Parabolün odağından çıkan ışınlar parabolün dışında paralel doğrular olarak yoluna devam ederler



Figure 9.14: A car headlight
Şekil 9.14: Bir araba farı.

Yansıma Özellikleri

Paraboller, elipsler ve hiperboller, yansıma özellikleri nedeniyle mimaride ve mühendislikte kullanılırlar.



Figure 9.13: One of a pair of whispering dishes in San Francisco, USA.

Şekil 9.13: A.B.D. San Fransisko'daki bir çift akustik çanak.




Figure 9.15: A car headlight
Şekil 9.15: Bir araba farı.




Figure 9.16: A satellite dish.
Şekil 9.16: Bir çanak anten



Figure 9.17: A satellite dish.
Şekil 9.17: Bir çanak anten




Figure 9.18: Rays originating from one focus of an ellipse are reflected toward the other focus.
Şekil 9.18: Elipsin bir odağından çıkan ışınlar diğer odağa yansıyorlar.




Figure 9.19: A whispering gallery.
Şekil 9.19:




Figure 9.20: A whispering gallery.
Şekil 9.20:




Figure 9.21: A whispering gallery.
Şekil 9.21:




Figure 9.22: One half of a hyperbola. Rays aimed at one focus are reflected to the second focus.
 Şekil 9.22: Hiperbolün bir yarısı. Odaklardan birine gelen ışınlar ikinci odağa yansıyorlar.




Figure 9.23: A telescope using a parabola and a hyperbola.
 Şekil 9.23: Bir parabol ve bir hiperbol kullanılan teleskop

Problems

Problem 9.1 (Identifying Graphs). Match the the following equations with the conic sections shown in figure 9.24.

(a). $y^2 = -4x$

(c). $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$

(e). $\frac{y^2}{4} - x^2 = 1$

(b). $x^2 = 2y$

(d). $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$

(f). $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$

Problem 9.2 (Parabolas).

(a). Find the focus of the parabola $y^2 = 12x$.

(b). Find the focus of the parabola $x^2 = -8y$.

(c). Find the focus of the parabola $y = 4x^2$.

Problem 9.3 (Ellipses).

(a). Find the foci of the ellipse $7x^2 + 16y^2 = 112$.

(b). Find the foci of the ellipse $16x^2 + 25y^2 = 400$.

(c). Find the foci of the ellipse $2x^2 + y^2 = 2$.

(d). An ellipse has foci $(\pm\sqrt{2}, 0)$ and vertices $(\pm 2, 0)$. Find an equation for the ellipse.

Problem 9.4 (Hyperbolas).

(a). Find the foci of the hyperbola $x^2 - y^2 = 1$.

(b). Find the foci of the hyperbola $y^2 - x^2 = 8$.

(c). Find the foci of the hyperbola $8x^2 - 2y^2 = 16$.

(d). A hyperbola has foci $(\pm 10, 0)$ and vertices $(\pm 6, 0)$. Find an equation for the hyperbola.

Sorular

Soru 9.1 (Grafikleri Belirlemek). Match the the following equations with the conic sections shown in figure 9.24.

Soru 9.2 (Paraboller).

(a). $y^2 = 12x$ parabolünün odağını bulunuz.

(b). $x^2 = -8y$ parabolünün odağını bulunuz.

(c). $y = 4x^2$ parabolünün odağını bulunuz.

Soru 9.3 (Elipsler).

(a). $7x^2 + 16y^2 = 112$ elipsinin odaklarını bulunuz.

(b). $16x^2 + 25y^2 = 400$ elipsinin odaklarını bulunuz.

(c). $2x^2 + y^2 = 2$ elipsinin odaklarını bulunuz.

(d). An ellipse has foci $(\pm\sqrt{2}, 0)$ and vertices $(\pm 2, 0)$. Find an equation for the ellipse.

Soru 9.4 (Hiperboller).

(a). $x^2 - y^2 = 1$ hiperbolünün odaklarını bulunuz.

(b). $y^2 - x^2 = 8$ hiperbolünün odaklarını bulunuz.

(c). $8x^2 - 2y^2 = 16$ hiperbolünün odaklarını bulunuz.

(d). A hyperbola has foci $(\pm 10, 0)$ and vertices $(\pm 6, 0)$. Find an equation for the hyperbola.




Figure 9.24: Eight conic sections.

Şekil 9.24:

10

Three Dimensional Cartesian Coordinates

Üç Boyutlu Kartezyen Koordinatlar





Figure 10.1: The Left-Handed Coordinate System

Şekil 10.1:




Figure 10.2: The planes $x = 0$, $y = 0$ and $z = 0$.

Şekil 10.2: $x = 0$, $y = 0$ ve $z = 0$ düzlemleri.




Figure 10.3: The planes $y = 3$ and $z = 5$, and the line $y = 3$, $z = 5$.

Şekil 10.3:

Example 10.1. Which points $P(x, y, z)$ satisfy $x^2 + y^2 = 4$ and $z = 3$?

solution: We know that $z = 3$ is a horizontal plane and we recognise that $x^2 + y^2 = 4$ is the equation of a circle of radius 2. Putting these together, we obtain figure 10.4.




Figure 10.4: The circle $x^2 + y^2 = 4$ in the plane $z = 3$.
Şekil 10.4: $z = 3$ düzlemindeki $x^2 + y^2 = 4$ çemberi.

Örnek 10.1. Hangi $P(x, y, z)$ noktaları $x^2 + y^2 = 4$ ve $z = 3$ 'ü sağlar?

çözüm: Biliyoruz ki $z = 3$ yatay bir düzlem ve $x^2 + y^2 = 4$ denklemi 2 yarıçaplı bir çemberdir. Bunları bir araya getirirsek, şekil 10.4'yi elde ederiz.




Figure 10.5: The sphere of radius a centred at $P_0(x_0, y_0, z_0)$.
Şekil 10.5: Yarıçapı a ve merkezi $P_0(x_0, y_0, z_0)$ noktası olan küre.

Distance in $\mathbb{R}^3$

Definition. The set

$$\{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

is denoted by $\mathbb{R}^3$.

Definition. The **distance** between $P_1(x_1, y_1, z_1)$ and $P_2(x_2, y_2, z_2)$ is

$$\|P_1P_2\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Example 10.2. The distance between $A(2, 1, 5)$ and $B(-2, 3, 0)$ is

$$\begin{aligned} \|AB\| &= \sqrt{((-2) - 2)^2 + (3 - 1)^2 + (0 - 5)^2} \\ &= \sqrt{16 + 4 + 25} = \sqrt{45} \\ &= 3\sqrt{5} \approx 6.7. \end{aligned}$$

$\mathbb{R}^3$ de Uzaklık

Tanım.

$$\{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

kümesini $\mathbb{R}^3$ ile gösteririz.

Tanım. $P_1(x_1, y_1, z_1)$ ve $P_2(x_2, y_2, z_2)$ noktaları arasındaki **uzaklık**

$$\|P_1P_2\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Örnek 10.3. $C(1, 2, 3)$ ve $D(3, 2, 1)$ noktaları arasındaki uzaklık aşağıdaki gibidir;

$$\begin{aligned} \|AB\| &= \sqrt{(3 - 1)^2 + (2 - 2)^2 + (1 - 3)^2} \\ &= \sqrt{4 + 0 + 4} = \sqrt{8} \\ &= 2\sqrt{2} \approx 2.8. \end{aligned}$$

Spheres

See figure 10.5.

Definition. The *standard equation for a sphere* of radius a centred at $P_0(x_0, y_0, z_0)$ is

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2.$$

Example 10.4. Find the centre and radius of the sphere

$$x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 = 0.$$

solution: We need to put this equation into the standard form. Since $(x - b)^2 = x^2 - 2b + b^2$ we have that

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 &= 0 \\ (x^2 + 3x) + y^2 + (z^2 - 4z) &= -1 \\ \left(x^2 + 3x + \frac{9}{4}\right) - \frac{9}{4} + y^2 + (z^2 - 4z + 4) - 4 &= -1 \\ \left(x^2 + 3x + \frac{9}{4}\right) + y^2 + (z^2 - 4z + 4) &= -1 + \frac{9}{4} + 4 \\ \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 + (z - 2)^2 &= \frac{21}{4}. \end{aligned}$$

The centre is at $P_0(x_0, y_0, z_0) = P_0(-\frac{3}{2}, 0, 2)$ and the radius is $a = \sqrt{\frac{21}{4}} = \frac{\sqrt{3}\sqrt{7}}{2}$.

Problems

Problem 10.1. Find the distance between the following pairs of points.

- (a). $P_1(-1, 1, 5)$ and $P_2(2, 5, 0)$.
- (b). $A(1, 0, 0)$ and $B(0, 0, 1)$.
- (c). $C(10, 5, -8)$ and $D(10, -25, 32)$.
- (d). $E(8, 9, 7)$ and $F(2, 2, 3)$.
- (e). $G(-4, 2, -4)$ and $O(0, 0, 0)$.

Problem 10.2. Find the centre and the radius of the sphere

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 8z = 0.$$

Problem 10.3. Find the centre and the radius of the sphere

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2\sqrt{2}x - 2\sqrt{2}y + 2\sqrt{2}z + 4 = 0.$$

Spheres

Bkz. şekil 10.5.

Tanım. Yarıçapı a ve merkezi $P_0(x_0, y_0, z_0)$ olan *Bir kürenin standart denklemi*

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2.$$

Örnek 10.5. Verilen kürenin merkez ve yarıçapını bulunuz:

$$x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 6y + 6z = 22.$$

çözüm: Bu denklemi standart forma getirmemiz gerek. Şimdi $(x - b)^2 = x^2 - 2b + b^2$ olduğundan

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 6y + 6z &= 22 \\ (x^2 + 6x) + (y^2 - 6y) + (z^2 + 6z) &= 22 \\ (x^2 + 6x + 9) - 9 + (y^2 - 6y + 9) - 9 + (z^2 + 6z + 9) - 9 &= 22 \\ (x^2 + 6x + 9) + (y^2 - 6y + 9) + (z^2 + 6z + 9) &= 49 \\ (x + 3)^2 + (y - 3)^2 + (z + 3)^2 &= 49 \end{aligned}$$

Merkezi $P_0(x_0, y_0, z_0) = P_0(-3, 3, -3)$ olup yarıçapı $a = \sqrt{49} = 7$.

Sorular

Soru 10.1. Aşağıdaki nokta çiftleri arasındaki uzaklığı bulunuz.

- (a). $P_1(-1, 1, 5)$ ve $P_2(2, 5, 0)$.
- (b). $A(1, 0, 0)$ ve $B(0, 0, 1)$.
- (c). $C(10, 5, -8)$ ve $D(10, -25, 32)$.
- (d). $E(8, 9, 7)$ ve $F(2, 2, 3)$.
- (e). $G(-4, 2, -4)$ ve $O(0, 0, 0)$.

Soru 10.2. Verilen denklemdeki kürenin merkezini ve yarıçapını bulunuz

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 8z = 0.$$

Soru 10.3. Verilen denklemdeki kürenin merkezini ve yarıçapını bulunuz



$$x^2 + y^2 + z^2 - 2\sqrt{2}x - 2\sqrt{2}y + 2\sqrt{2}z + 4 = 0.$$

Vectors

Vektörler


For some quantities (mass, time, distance, ...) we only need a number. For some quantities (velocity, force, ...) we need a number and a direction.

Bazı büyüklükler (kütle, zaman, mesafe, ...) sadece bir sayı yeterli oluyor. Ancak bazı büyüklükler için (hız, kuvvet, ...) bir sayıyla bir de yöne ihtiyacımız var.



A **vector** is an object which has a size (length) and a direction.

Vektör bir büyüklüğü (uzunluğu) ve bir yönü olan nesnedir.



Tanım. $\vec{AB}$ vektörünün **başlangıç noktası** A ve **bitiş noktası** B dir.

$\vec{AB}$ 'nin **uzunluğu** $\|\vec{AB}\|$ ile gösterilir.

İki vektörün eşit olmaları için gerek ve yeter şart uzunlukları ve boylarının aynı olmasıdır. Şekil 11.2 de, şunu söylemek mümkün

$$\vec{AB} = \vec{CD} = \vec{EF} = \vec{OP}.$$

Figure 11.1: The initial point and terminal point of a vector.
Şekil 11.1:

Unutmayınız ki $\vec{AB} \neq \vec{GH}$ çünkü uzunluklar farklı ve $\vec{AB} \neq \vec{IJ}$ çünkü yönleri farklı.

Definition. The vector $\vec{AB}$ has **initial point** A and **terminal point** B.

The **length** of $\vec{AB}$ is written $\|\vec{AB}\|$.

Two vectors are equal if they have the same length and the same direction. In figure 11.2, we can say that

$$\vec{AB} = \vec{CD} = \vec{EF} = \vec{OP}.$$

Note that $\vec{AB} \neq \vec{GH}$ because the lengths are different, and $\vec{AB} \neq \vec{IJ}$ because the directions are different.




Figure 11.2: Six vectors.
Şekil 11.2: Altı vektör.

Notation

When we use a computer, we use bold letters for vectors: $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$, When we use a pen, we use underlined letters for vectors: $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$,

If we type $a\mathbf{u} + b\mathbf{v}$ or write $a\underline{u} + b\underline{v}$, then

- a and b are numbers; and
- $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\underline{u}$ and $\underline{v}$ are vectors.

Definition. In $\mathbb{R}^2$: If $\mathbf{v}$ has initial point $(0,0)$ and terminal point (v_1, v_2) , then the **component form** of $\mathbf{v}$ is $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$.

In $\mathbb{R}^3$: If $\mathbf{v}$ has initial point $(0,0,0)$ and terminal point (v_1, v_2, v_3) , then the **component form** of $\mathbf{v}$ is $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$.

Notasyon

Bilgisayar kullanırken, vektör için kalın harfler kullanırız: $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$, Kalemle yazarken, vektör için altı çizili harfler kullanırız: $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$,

$a\mathbf{u} + b\mathbf{v}$ olarak yazarsak veya $a\underline{u} + b\underline{v}$ yazarsak,

- a ve b sayılar; ve
- $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\underline{u}$ ve $\underline{v}$ vektörler.

Tanım. $\mathbb{R}^2$ de: $\mathbf{v}$ 'nin başlangıç noktası $(0,0)$ ve son noktası (v_1, v_2) ise bu durumda $\mathbf{v}$ için **bileşen formu** $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ olur.

$\mathbb{R}^3$ de: $\mathbf{v}$ 'nin başlangıç noktası $(0,0,0)$ ve bitiş noktası (v_1, v_2, v_3) ise, o zaman $\mathbf{v}$ için **bileşen formu** $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ olur.




Figure 11.3: The vector $(v_1, v_2, v_3) = \mathbf{v} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$.

Şekil 11.3:

Definition. In $\mathbb{R}^2$: The **norm** (or **length**) of $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ is

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

In $\mathbb{R}^3$: The **norm** of $\mathbf{v} = \overrightarrow{PQ}$ is

$$\begin{aligned} \|\mathbf{v}\| &= \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} \\ &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}. \end{aligned}$$

The vectors $\mathbf{0} = (0,0)$ and $\mathbf{0} = (0,0,0)$ have norm $\|\mathbf{0}\| = 0$. If $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, then $\|\mathbf{v}\| > 0$.

Example 11.1. Find (a) the component form; and (b) the norm of the vector with initial point $P(-3, 4, 1)$ and terminal point $Q(-5, 2, 2)$.

solution:

$$(a). \mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) = Q - P = (-5, 2, 2) - (-3, 4, 1) = (-2, -2, 1).$$

$$(b). \|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{9} = 3.$$

Tanım. $\mathbb{R}^2$: The **norm** (ya da **uzunluk**) $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ ise

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

olarak verilir.

$\mathbb{R}^3$: **norm** tamamı $\mathbf{v} = \overrightarrow{PQ}$ için

$$\begin{aligned} \|\mathbf{v}\| &= \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} \\ &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}. \end{aligned}$$

olaur.

$\mathbf{0} = (0,0)$ ve $\mathbf{0} = (0,0,0)$ vektörlerinin normu $\|\mathbf{0}\| = 0$ dır. $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ ise, bu durumda $\|\mathbf{v}\| > 0$ olur.

Örnek 11.1. (a) bileşen formu ve (b) normu başlangıç noktası $P(-3, 4, 1)$ ve bitiş noktası $Q(-5, 2, 2)$ olan vektör için bulunuz.

çözüm:

$$(a). \mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) = Q - P = (-5, 2, 2) - (-3, 4, 1) = (-2, -2, 1).$$

$$(b). \|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{9} = 3.$$

Vector Algebra




Figure 11.4: $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ considered in two ways.
Şekil 11.4:

Figure 11.5: Constant multiples of $\mathbf{u}$.
Şekil 11.5:





Figure 11.6: $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ considered in two ways.
Şekil 11.6:

Let $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ and $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ be vectors. Let k be a number. Then

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$$

and

$$k\mathbf{u} = (ku_1, ku_2, ku_3).$$

Note that

$$\begin{aligned} \|k\mathbf{u}\| &= \|(ku_1, ku_2, ku_3)\| = \sqrt{(ku_1)^2 + (ku_2)^2 + (ku_3)^2} \\ &= \sqrt{k^2u_1^2 + k^2u_2^2 + k^2u_3^2} = \sqrt{k^2(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)} \\ &= \sqrt{k^2} \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} = |k| \|\mathbf{u}\|. \end{aligned}$$

The vector $-\mathbf{u} = (-1)\mathbf{u}$ has the same length as $\mathbf{u}$, but points in the opposite direction.

Example 11.2. Let $\mathbf{u} = (-1, 3, 1)$ and $\mathbf{v} = (4, 7, 0)$. Find (a) $2\mathbf{u} + 3\mathbf{v}$, (b) $\mathbf{u} - \mathbf{v}$, and (c) $\|\frac{1}{2}\mathbf{u}\|$.

solution:

$$(a) \quad 2\mathbf{u} + 3\mathbf{v} = 2(-1, 3, 1) + 3(4, 7, 0) = (-2, 6, 2) + (12, 21, 0) = (10, 27, 2);$$

$$(b) \quad \mathbf{u} - \mathbf{v} = (-1, 3, 1) - (4, 7, 0) = (-5, -4, 1);$$

$$(c) \quad \|\frac{1}{2}\mathbf{u}\| = \frac{1}{2} \|\mathbf{u}\| = \frac{1}{2} \sqrt{(-1)^2 + 3^2 + 1^2} = \frac{1}{2} \sqrt{11}.$$

Properties of Vector Operations

Let $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ and $\mathbf{w}$ be vectors. Let a and b be numbers. Then

- (i). $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$;
- (ii). $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$;
- (iii). $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$;
- (iv). $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$;
- (v). $0\mathbf{u} = \mathbf{0}$;

Vektör Cebri

Varsayalım ki $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ ve $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ vektörler olsun. Varsayalım ki k bir sayı olsun. O zaman

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$$

ve

$$k\mathbf{u} = (ku_1, ku_2, ku_3).$$

Şunu not ediniz

$$\begin{aligned} \|k\mathbf{u}\| &= \|(ku_1, ku_2, ku_3)\| = \sqrt{(ku_1)^2 + (ku_2)^2 + (ku_3)^2} \\ &= \sqrt{k^2u_1^2 + k^2u_2^2 + k^2u_3^2} = \sqrt{k^2(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)} \\ &= \sqrt{k^2} \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} = |k| \|\mathbf{u}\|. \end{aligned}$$

$-\mathbf{u} = (-1)\mathbf{u}$ vektörünün $\mathbf{u}$ ile uzunluğu aynı ama zıt yönündür.

Örnek 11.2. $\mathbf{u} = (-1, 3, 1)$ ve $\mathbf{v} = (4, 7, 0)$ olsun. Hesaplayınız ki (a) $2\mathbf{u} + 3\mathbf{v}$, (b) $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ ve (c) $\|\frac{1}{2}\mathbf{u}\|$.

çözüm:

$$(a) \quad 2\mathbf{u} + 3\mathbf{v} = 2(-1, 3, 1) + 3(4, 7, 0) = (-2, 6, 2) + (12, 21, 0) = (10, 27, 2);$$

$$(b) \quad \mathbf{u} - \mathbf{v} = (-1, 3, 1) - (4, 7, 0) = (-5, -4, 1);$$

$$(c) \quad \|\frac{1}{2}\mathbf{u}\| = \frac{1}{2} \|\mathbf{u}\| = \frac{1}{2} \sqrt{(-1)^2 + 3^2 + 1^2} = \frac{1}{2} \sqrt{11}.$$

Vektörlerle İşlem Özellikleri

$\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ ve $\mathbf{w}$ vektörler olsun. a ve b sayılar olsun. O zaman

- (i). $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$;
- (ii). $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$;
- (iii). $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$;
- (iv). $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$;
- (v). $0\mathbf{u} = \mathbf{0}$;

$$(vi). \quad 1\mathbf{u} = \mathbf{u};$$

$$(vii). \quad a(b\mathbf{u}) = (ab)\mathbf{u};$$

$$(viii). \quad a(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a\mathbf{u} + a\mathbf{v};$$

$$(ix). \quad (a + b)\mathbf{u} = a\mathbf{u} + b\mathbf{u}.$$

Remark. We can not multiply vectors. Never never never write “ $\mathbf{uv}$ ”.

$$(vi). \quad 1\mathbf{u} = \mathbf{u};$$

$$(vii). \quad a(b\mathbf{u}) = (ab)\mathbf{u};$$

$$(viii). \quad a(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a\mathbf{u} + a\mathbf{v};$$

$$(ix). \quad (a + b)\mathbf{u} = a\mathbf{u} + b\mathbf{u}.$$

Not. Vektörlerle çarpma yapamayız. Asla asla ve asla “ $\mathbf{uv}$ ” yazmayız.

Unit Vectors

Definition. $\mathbf{u}$ is called a *unit vector* $\iff \|\mathbf{u}\| = 1$.

Example 11.3. $\mathbf{u} = (2^{-\frac{1}{2}}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ is a unit vector because

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = 1.$$

In $\mathbb{R}^2$: The *standard unit vectors* are $\mathbf{i} = (1, 0)$ and $\mathbf{j} = (0, 1)$.

In $\mathbb{R}^3$: The *standard unit vectors* are $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$ and $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$. Any vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ can be written

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= (v_1, v_2, v_3) = (v_1, 0, 0) + (0, v_2, 0) + (0, 0, v_3) \\ &= v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}. \end{aligned}$$

If $\|\mathbf{v}\| \neq 0$, then $\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$ is a unit vector because

$$\left\| \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \right\| = \left\| \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v} \right\| = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \|\mathbf{v}\| = 1.$$

Clearly $\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$ and $\mathbf{v}$ point in the same direction.

Example 11.4. Find a unit vector $\mathbf{u}$ which points in the same direction as $\overrightarrow{P_1P_2}$, where $P_1(1, 0, 1)$ and $P_2(3, 2, 0)$.

solution:

We calculate that $\overrightarrow{P_1P_2} = P_2 - P_1 = (3, 2, 0) - (1, 0, 1) = (2, 2, -1) = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$ and that $\left\| \overrightarrow{P_1P_2} \right\| = \sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2} = 3$. The required unit vector is

$$\mathbf{u} = \frac{\overrightarrow{P_1P_2}}{\left\| \overrightarrow{P_1P_2} \right\|} = \frac{2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}}{3} = \frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{2}{3}\mathbf{j} - \frac{1}{3}\mathbf{k}.$$




Figure 11.7: $\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$ is a unit vector which points in the same direction as $\mathbf{v}$.

Şekil 11.7:

Birim Vektör

Tanım. $\mathbf{u}$ vektörü *birim vektördür* ancak ve ancak $\|\mathbf{u}\| = 1$.

Örnek 11.3. $\mathbf{u} = (2^{-\frac{1}{2}}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ birim vektördür çünkü

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = 1.$$

$\mathbb{R}^2$: The *standart birim vektörler* $\mathbf{i} = (1, 0)$ ve $\mathbf{j} = (0, 1)$ olarak ifade edilir.

$\mathbb{R}^3$ 'te: The *standart birim vektörler* $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$ ve $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$ vektörleridir. Herhangi bir $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ vektörü şöyle yazılabilir

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= (v_1, v_2, v_3) = (v_1, 0, 0) + (0, v_2, 0) + (0, 0, v_3) \\ &= v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}. \end{aligned}$$

$\|\mathbf{v}\| \neq 0$ ise, o zaman $\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$ bir birim vektör olur çünkü

$$\left\| \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \right\| = \left\| \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v} \right\| = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \|\mathbf{v}\| = 1.$$

Aşıkarak $\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$ ve $\mathbf{v}$ aynı yönü gösterirler.

Örnek 11.4. $P_1(1, 0, 1)$ ve $P_2(3, 2, 0)$ olmak üzere $\overrightarrow{P_1P_2}$ ile aynı yönde bir $\mathbf{u}$ birim vektör bulunuz.

çözüm:

İlk olarak $\overrightarrow{P_1P_2} = P_2 - P_1 = (3, 2, 0) - (1, 0, 1) = (2, 2, -1) = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$ ve $\left\| \overrightarrow{P_1P_2} \right\| = \sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2} = 3$. İstenen birim vektör

$$\mathbf{u} = \frac{\overrightarrow{P_1P_2}}{\left\| \overrightarrow{P_1P_2} \right\|} = \frac{2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}}{3} = \frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{2}{3}\mathbf{j} - \frac{1}{3}\mathbf{k}.$$

Problems

Problem 11.1. Let $\mathbf{u} = (3, -2)$ and $\mathbf{v} = (-2, 5)$. Find the following:

- | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|--|--|
| (a). $\ \mathbf{u}\ $ | (d). $3\mathbf{u}$ | (g). $\ -3\mathbf{u}\ $ | (j). $\ \mathbf{u}\ + \ \mathbf{v}\ $ | (m). $\frac{3}{5}\mathbf{u} + \frac{4}{5}\mathbf{v}$ |
| (b). $\ \mathbf{v}\ $ | (e). $\ 3\mathbf{u}\ $ | (h). $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ | (k). $2\mathbf{u} - 3\mathbf{v}$ | (n). $\ \frac{3}{5}\mathbf{u} + \frac{4}{5}\mathbf{v}\ $ |
| (c). $3\ \mathbf{u}\ $ | (f). $-3\mathbf{u}$ | (i). $\ \mathbf{u} + \mathbf{v}\ $ | (l). $\ 2\mathbf{u} - 3\mathbf{v}\ $ | (o). $\ -\frac{5}{13}\mathbf{u} + \frac{12}{13}\mathbf{v}\ $ |

Problem 11.2.

- | | |
|---|---|
| (a). Find $(5\mathbf{a} - 3\mathbf{b})$ if $\mathbf{a} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ and $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + 5\mathbf{k}$. | (a). Find $(5\mathbf{a} - 3\mathbf{b})$ if $\mathbf{a} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ and $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + 5\mathbf{k}$. |
| (b). Find $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$, where $A(1, -1, 1)$, $B(2, 0, 0)$, $C(-1, 3, 0)$ and $D(-2, 2, 1)$. | (b). Find $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$, where $A(1, -1, 1)$, $B(2, 0, 0)$, $C(-1, 3, 0)$ and $D(-2, 2, 1)$. |

Problem 11.3 (Unit Vectors).

- | | |
|--|--|
| (a). Find a unit vector which points in the same direction as $\mathbf{v} = 6\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$. | (a). Find a unit vector which points in the same direction as $\mathbf{v} = 6\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$. |
| (b). Find a unit vector which points in the same direction as $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$. | (b). Find a unit vector which points in the same direction as $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$. |
| (c). Find a vector $\mathbf{w}$ which points in the same direction as $\mathbf{v} = 12\mathbf{i} - 5\mathbf{k}$ and which satisfies $\ \mathbf{w}\ = 7$. | (c). Find a vector $\mathbf{w}$ which points in the same direction as $\mathbf{v} = 12\mathbf{i} - 5\mathbf{k}$ and which satisfies $\ \mathbf{w}\ = 7$. |

Sorular

Soru 11.1. Let $\mathbf{u} = (3, -2)$ and $\mathbf{v} = (-2, 5)$. Find the following:

Soru 11.2.

Soru 11.3 (Unit Vectors).



Figure 11.8: A web comic.
Şekil 11.8: Bir web çizgi romanı.

12

The Dot Product


Nokta Çarpım

Definition. In $\mathbb{R}^2$, the *dot product* of $\mathbf{u} = (u_1, u_2) = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j}$ and $\mathbf{v} = (v_1, v_2) = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j}$ is

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2.$$

Definition. In $\mathbb{R}^3$, the *dot product* of $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3) = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ and $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$ is

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3.$$



Theorem 12.1. The angle between $\mathbf{u}$ and $\mathbf{v}$ is

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \right).$$

Example 12.1.

$$(1, -2, -1) \cdot (-6, 2, -3) = (1 \times -6) + (-2 \times 2) + (-1 \times -3) = -6 - 4 + 3 = -7.$$

Example 12.2.

$$\left(\frac{1}{2}\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}\right) \cdot (4\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}) = \left(\frac{1}{2} \times 4\right) + (3 \times -1) + (1 \times 2) = 2 - 3 + 2 = 1.$$

Example 12.3. Find the angle between $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ and $\mathbf{v} = 6\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.

solution: Since $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (1, -2, -2) \cdot (6, 3, 2) = (1 \times 6) + (-2 \times 3) + (-2 \times 2) = 6 - 6 - 4 = -4$, $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$ and $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{6^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{49} = 7$, we have that

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \right) = \cos^{-1} \left(-\frac{4}{21} \right) \approx 1.76 \text{ radians} \approx 98.5^\circ.$$

Example 12.4. If $A(0, 0)$, $B(3, 5)$ and $C(5, 2)$, find $\theta = \angle ACB$.

Tanım. $\mathbb{R}^2$ 'de, the *nokta çarpım* $\mathbf{u} = (u_1, u_2) = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j}$ ve $\mathbf{v} = (v_1, v_2) = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j}$ is

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2$$

ise olarak tanımlanır.

Tanım. $\mathbb{R}^3$ 'de, the *nokta çarpım* $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3) = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ ve $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$ ise

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

olarak tanımlanır.

Theorem 12.1. $\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$ arasındaki açı

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \right).$$

Örnek 12.1.

$$(1, -2, -1) \cdot (-6, 2, -3) = (1 \times -6) + (-2 \times 2) + (-1 \times -3) = -6 - 4 + 3 = -7.$$

Örnek 12.2.


$$\left(\frac{1}{2}\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}\right) \cdot (4\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}) = \left(\frac{1}{2} \times 4\right) + (3 \times -1) + (1 \times 2) = 2 - 3 + 2 = 1.$$

Örnek 12.3. $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ ve $\mathbf{v} = 6\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ arasındaki açıyı bulunuz.

çözüm: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (1, -2, -2) \cdot (6, 3, 2) = (1 \times 6) + (-2 \times 3) + (-2 \times 2) = 6 - 6 - 4 = -4$, $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$ ve $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{6^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{49} = 7$, buradan

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \right) = \cos^{-1} \left(-\frac{4}{21} \right) \approx 1.76 \text{ radians} \approx 98.5^\circ.$$

Örnek 12.4. $A(0, 0)$, $B(3, 5)$ ve $C(5, 2)$ ise, $\theta = \angle ACB$ nedir?



solution: θ is the angle between $\vec{CA}$ and $\vec{CB}$. We calculate that $\vec{CA} = A - C = (0, 0) - (5, 2) = (-5, -2)$, $\vec{CB} = B - C = (3, 5) - (5, 2) = (-2, 3)$, $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = (-5, -2) \cdot (-2, 3) = 4$, $\|\vec{CA}\| = \sqrt{(-5)^2 + (-2)^2} = \sqrt{29}$ and $\|\vec{CB}\| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2} = \sqrt{13}$. Therefore

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{CA} \cdot \vec{CB}}{\|\vec{CA}\| \|\vec{CB}\|} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{4}{\sqrt{29}\sqrt{13}} \right) \approx 78.1^\circ \approx 1.36 \text{ radians.}$$

Definition. $\mathbf{u}$ and $\mathbf{v}$ are *orthogonal* $\iff \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

Remark. Note that

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$$

by Theorem 12.1. Therefore

$$\mathbf{u} \text{ and } \mathbf{v} \text{ are orthogonal} \iff \begin{pmatrix} \mathbf{u} = \mathbf{0} \\ \text{or} \\ \mathbf{v} = \mathbf{0} \\ \text{or} \\ \theta = 90^\circ. \end{pmatrix}$$

Example 12.5. $\mathbf{u} = (3, -2)$ and $\mathbf{v} = (4, 6)$ are orthogonal because $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (3, -2) \cdot (4, 6) = (3 \times 4) + (-2 \times 6) = 12 - 12 = 0$.

Example 12.6. $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ and $\mathbf{v} = 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$ are orthogonal because $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (3 \times 0) + (-2 \times 2) + (1 \times 4) = 0 - 4 + 4 = 0$.

Example 12.7. $\mathbf{0}$ is orthogonal to every vector $\mathbf{u}$ because $\mathbf{0} \cdot \mathbf{u} = (0, 0, 0) \cdot (u_1, u_2, u_3) = 0u_1 + 0u_2 + 0u_3 = 0$.

Properties of the Dot Product

Let $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ and $\mathbf{w}$ be vectors. Let k be a number. Then

- (i). $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$;
- (ii). $(k\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (k\mathbf{v}) = k(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$;
- (iii). $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})$;
- (iv). $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \|\mathbf{u}\|^2$; and
- (v). $\mathbf{0} \cdot \mathbf{u} = 0$.

çözüm: θ açısı $\vec{CA}$ ve $\vec{CB}$ arasındadır. Buradan $\vec{CA} = A - C = (0, 0) - (5, 2) = (-5, -2)$, $\vec{CB} = B - C = (3, 5) - (5, 2) = (-2, 3)$, $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = (-5, -2) \cdot (-2, 3) = 4$, $\|\vec{CA}\| = \sqrt{(-5)^2 + (-2)^2} = \sqrt{29}$ ve $\|\vec{CB}\| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2} = \sqrt{13}$. Yani

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{CA} \cdot \vec{CB}}{\|\vec{CA}\| \|\vec{CB}\|} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{4}{\sqrt{29}\sqrt{13}} \right) \approx 78.1^\circ \approx 1.36 \text{ radians.}$$

Tanım. $\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$ *ortogonal* ancak ve ancak $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

Not. Not ediniz ki

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$$

Theorem 12.1 gereğince doğrudur. Buradan

$$\mathbf{u} \text{ ve } \mathbf{v} \text{ ortogonal ancak ve ancak} \begin{pmatrix} \mathbf{u} = \mathbf{0} \\ \text{ya da} \\ \mathbf{v} = \mathbf{0} \\ \text{ya da} \\ \theta = 90^\circ. \end{pmatrix}$$

Örnek 12.5. $\mathbf{u} = (3, -2)$ ve $\mathbf{v} = (4, 6)$ ortogonaldir çünkü $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (3, -2) \cdot (4, 6) = (3 \times 4) + (-2 \times 6) = 12 - 12 = 0$.

Örnek 12.6. $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ ve $\mathbf{v} = 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$ ortogonal çünkü $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (3 \times 0) + (-2 \times 2) + (1 \times 4) = 0 - 4 + 4 = 0$.

Örnek 12.7. $\mathbf{0}$ ortogonaldir her $\mathbf{u}$ vektörüne çünkü $\mathbf{0} \cdot \mathbf{u} = (0, 0, 0) \cdot (u_1, u_2, u_3) = 0u_1 + 0u_2 + 0u_3 = 0$.

Nokta Çarpım Özellikleri

$\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ ve $\mathbf{w}$ vektörler olsun. k bir sayı olsun. O zaman

- (i). $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$;
- (ii). $(k\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (k\mathbf{v}) = k(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$;
- (iii). $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})$;
- (iv). $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \|\mathbf{u}\|^2$; ve
- (v). $\mathbf{0} \cdot \mathbf{u} = 0$.




Figure 12.1: Vector Projections
Şekil 12.1: Vektör İzdüşümleri

Vector Projections

See figure 12.1.

Definition. The *vector projection* of $\mathbf{u}$ onto $\mathbf{v}$ is the vector

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \overrightarrow{PR}.$$

Now

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} &= (\text{length of } \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}) \left(\text{a unit vector in the same direction as } \mathbf{v} \right) \\ &= \|\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}\| \left(\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \right) \\ &= \|\mathbf{u}\| (\cos \theta) \left(\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \right) \\ &= \left(\frac{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v} \\ &= \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v}. \end{aligned}$$

Since this is an important formula, we write it as a theorem.

Theorem 12.2. The *vector projection* of $\mathbf{u}$ onto $\mathbf{v}$ is

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v}.$$

Example 12.8. Find the vector projection of $\mathbf{u} = 6\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ onto $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$.

solution:

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} &= \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v} = \left(\frac{6 - 6 - 4}{1 + 4 + 4} \right) (\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}) \\ &= -\frac{4}{9}\mathbf{i} + \frac{8}{9}\mathbf{j} + \frac{8}{9}\mathbf{k}. \end{aligned}$$

Example 12.9. Find the vector projection of $\mathbf{F} = 5\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ onto $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 3\mathbf{j}$.

solution:

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{F} &= \left(\frac{\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v} = \left(\frac{5 - 6}{1 + 9} \right) (\mathbf{i} - 3\mathbf{j}) \\ &= -\frac{1}{10}\mathbf{i} + \frac{3}{10}\mathbf{j}. \end{aligned}$$

Vector Projections

See figure 12.1.

Tanım. $\mathbf{u}$ 'nun $\mathbf{v}$ üzerine *vektör izdüşümü*

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \overrightarrow{PR}.$$

Şimdi

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} &= (\text{uzunluk } \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}) \left(\begin{array}{l} \mathbf{v} \text{ ile aynı yöne} \\ \text{birim vektördür.} \end{array} \right) \\ &= \|\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}\| \left(\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \right) \\ &= \|\mathbf{u}\| (\cos \theta) \left(\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \right) \\ &= \left(\frac{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v} \\ &= \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v}. \end{aligned}$$

Bu önemli bir formül olduğundan, bir teorem olarak yazalım.

Teorem 12.2. $\mathbf{u}$ 'nun $\mathbf{v}$ üzerine *vektör izdüşümü*

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v}.$$

Örnek 12.8. $\mathbf{u} = 6\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ 'nin $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ üzerine olan vektör izdüşümünü bulunuz.

çözüm:

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} &= \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v} = \left(\frac{6 - 6 - 4}{1 + 4 + 4} \right) (\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}) \\ &= -\frac{4}{9}\mathbf{i} + \frac{8}{9}\mathbf{j} + \frac{8}{9}\mathbf{k}. \end{aligned}$$

Örnek 12.9. $\mathbf{F} = 5\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ vektörünün $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 3\mathbf{j}$ vektörü üzerine olan vektör izdüşümünü bulunuz.

çözüm:

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{F} &= \left(\frac{\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v} = \left(\frac{5 - 6}{1 + 9} \right) (\mathbf{i} - 3\mathbf{j}) \\ &= -\frac{1}{10}\mathbf{i} + \frac{3}{10}\mathbf{j}. \end{aligned}$$

Problems

Problem 12.1. For each pair of vectors below, find

- (i). $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$;
 - (ii). $\|\mathbf{u}\|$ and $\|\mathbf{v}\|$;
 - (iii). $\cos \theta$ (where θ is the angle between $\mathbf{u}$ and $\mathbf{v}$); and
 - (iv). $\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$.
- (a). $\mathbf{u} = -2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - \sqrt{5}\mathbf{k}$
 $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + \sqrt{5}\mathbf{k}$
- (b). $\mathbf{u} = 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$
 $\mathbf{v} = 10\mathbf{i} + 11\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$

Problem 12.2. A triangle has vertices at $A(-1, 0)$, $B(2, 1)$ and $C(1, -2)$. Find the internal angles of the triangle.

Problem 12.3. Let $A(1, 1, 1)$, $B(2, 3, 2)$, $C(1, 4, 4)$ and $D(0, 2, 3)$ be four points in $\mathbb{R}^3$. Are the vectors $\overrightarrow{AC}$ and $\overrightarrow{BD}$ orthogonal?

Problem 12.4. Let $\mathbf{u}$ and $\mathbf{v}$ be vectors. Let θ denote the angle between $\mathbf{u}$ and $\mathbf{u} + \mathbf{v}$; and let ϕ denote the angle between $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ and $\mathbf{v}$. See figure 12.2.

- (a). Show that if $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\|$, then $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v}$
- (b). Show that if $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\|$, then $\theta = \phi$.

Problem 12.5. A water pipe runs due north then due east. The northwards part slopes upwards with a slope of 20%. The eastwards part slopes upwards with a slope of 10%. See figure 12.3. Find the angle θ required at the turn from north to east.




Figure 12.2: The vectors considered in Exercise 12.4.
 Şekil 12.2:

Sorular

Soru 12.1. For each pair of vectors below, find

- (i). $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$;
 - (ii). $\|\mathbf{u}\|$ and $\|\mathbf{v}\|$;
 - (iii). $\cos \theta$ (where θ is the angle between $\mathbf{u}$ and $\mathbf{v}$); and
 - (iv). $\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$.
- (c). $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$
 $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 10\mathbf{j} - 11\mathbf{k}$

Soru 12.2. A triangle has vertices at $A(-1, 0)$, $B(2, 1)$ and $C(1, -2)$. Find the internal angles of the triangle.

Soru 12.3. Let $A(1, 1, 1)$, $B(2, 3, 2)$, $C(1, 4, 4)$ and $D(0, 2, 3)$ be four points in $\mathbb{R}^3$. Are the vectors $\overrightarrow{AC}$ and $\overrightarrow{BD}$ orthogonal?

Soru 12.4. Let $\mathbf{u}$ and $\mathbf{v}$ be vectors. Let θ denote the angle between $\mathbf{u}$ and $\mathbf{u} + \mathbf{v}$; and let ϕ denote the angle between $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ and $\mathbf{v}$. See figure 12.2.

- (a). Show that if $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\|$, then $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v}$
- (b). Show that if $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\|$, then $\theta = \phi$.

Soru 12.5. A water pipe runs due north then due east. The northwards part slopes upwards with a slope of 20%. The eastwards part slopes upwards with a slope of 10%. See figure 12.3. Find the angle θ required at the turn from north to east.






Figure 12.3: A water pipe.
 Şekil 12.3:

13

The Cross Product

Vektörel Çarpım



Let $\mathbf{n}$ be a unit vector which satisfies

- (i). $\mathbf{n}$ is orthogonal to $\mathbf{u}$ $\left(\begin{array}{c} \uparrow \mathbf{n} \\ \perp \mathbf{u} \end{array} \right)$;
- (ii). $\mathbf{n}$ is orthogonal to $\mathbf{v}$ $\left(\begin{array}{c} \uparrow \mathbf{n} \\ \perp \mathbf{v} \end{array} \right)$; and
- (iii). the direction of $\mathbf{n}$ is chosen using the left-hand rule.

Definition. The *cross product* of $\mathbf{u}$ and $\mathbf{v}$ is

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| (\sin \theta) \mathbf{n}.$$

Remark.

- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ is a number.
- $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ is a vector.

Remark.

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{c} \mathbf{u} \text{ and } \mathbf{v} \\ \text{are parallel} \end{array} \right) &\iff \theta = 0^\circ \text{ or } 180^\circ \\ &\implies \sin \theta = 0 \implies \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

$\mathbf{n}$ birim vektör öyle ki

- (i). $\mathbf{n}$ dik $\mathbf{u}$ $\left(\begin{array}{c} \uparrow \mathbf{n} \\ \perp \mathbf{u} \end{array} \right)$;
- (ii). $\mathbf{n}$ dik $\mathbf{v}$ $\left(\begin{array}{c} \uparrow \mathbf{n} \\ \perp \mathbf{v} \end{array} \right)$; ve
- (iii). $\mathbf{n}$ 'nin yönü is sol-el kuralı ile belirlenir.

Tanım. $\mathbf{u}$ ile $\mathbf{v}$ 'nin *vektör çarpımı*

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| (\sin \theta) \mathbf{n}.$$

Not.

- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ bir sayıdır.
- $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ bir vektördür.

Not.


$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{c} \mathbf{u} \text{ ve } \mathbf{v} \\ \text{paraleldir} \end{array} \right) &\iff \theta = 0^\circ \text{ ya da } 180^\circ \\ &\implies \sin \theta = 0 \implies \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Properties of the Cross Product


Let $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ and $\mathbf{w}$ be vectors. Let r and s be numbers. Then

- (i). $(r\mathbf{u}) \times (s\mathbf{v}) = (rs)(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$;
- (ii). $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$;
- (iii). $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = -\mathbf{u} \times \mathbf{v}$;
- (iv). $(\mathbf{v} + \mathbf{w}) \times \mathbf{u} = (\mathbf{v} \times \mathbf{u}) + (\mathbf{w} \times \mathbf{u})$;
- (v). $\mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$; and
- (vi). $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$.


Property (iii)



Area of a Parallelogram



Area of a Triangle




Vektör Çarpım Özellikleri

$\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ ve $\mathbf{w}$ vektörler olsun. r ve s sayılar olsun. Bu durumda

- (i). $(r\mathbf{u}) \times (s\mathbf{v}) = (rs)(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$;
- (ii). $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$;
- (iii). $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = -\mathbf{u} \times \mathbf{v}$;
- (iv). $(\mathbf{v} + \mathbf{w}) \times \mathbf{u} = (\mathbf{v} \times \mathbf{u}) + (\mathbf{w} \times \mathbf{u})$;
- (v). $\mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$; ve
- (vi). $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$.

Özellik (iii)



Paralelkenarın Alanı

$$\text{area} = (\text{base})(\text{height}) = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|.$$

$$\text{alan} = (\text{taban})(\text{yükseklik}) = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|.$$

Üçgenin Alanı

$$\begin{aligned} \text{area of triangle} &= \frac{1}{2} (\text{area of parallelogram}) \\ &= \frac{1}{2} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{üçgenin alanı} &= \frac{1}{2} (\text{paralelkenarın alanı}) \\ &= \frac{1}{2} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|. \end{aligned}$$

A Formula for $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$




Figure 13.1: The standard unit vectors in $\mathbb{R}^3$.

Şekil 13.1:

Note first that

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \|\mathbf{i}\| \|\mathbf{i}\| \sin 0^\circ \mathbf{n} = \mathbf{0}.$$

Similarly $\mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{0}$ and $\mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0}$ also.

Next note that $\mathbf{i} \times \mathbf{j}$ must point in the same direction at $\mathbf{k}$ by the left-hand rule. Thus

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \|\mathbf{i}\| \|\mathbf{j}\| \sin 90^\circ \mathbf{k} = \mathbf{k}.$$

We then immediately also have

$$\mathbf{j} \times \mathbf{i} = -(\mathbf{i} \times \mathbf{j}) = -\mathbf{k}.$$

It is left for you to check that

$$\mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}, \quad \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j} \quad \text{and} \quad \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}.$$

Now suppose that $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ and $\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$. Then we can calculate that

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= (u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}) \times (v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}) \\ &= u_1v_1\mathbf{i} \times \mathbf{i} + u_1v_2\mathbf{i} \times \mathbf{j} + u_1v_3\mathbf{i} \times \mathbf{k} + u_2v_1\mathbf{j} \times \mathbf{i} + u_2v_2\mathbf{j} \times \mathbf{j} + u_2v_3\mathbf{j} \times \mathbf{k} \\ &\quad + u_3v_1\mathbf{k} \times \mathbf{i} + u_3v_2\mathbf{k} \times \mathbf{j} + u_3v_3\mathbf{k} \times \mathbf{k} \\ &= \mathbf{0} + u_1v_2\mathbf{k} - u_1v_3\mathbf{j} - u_2v_1\mathbf{k} + \mathbf{0} + u_2v_3\mathbf{i} + u_3v_1\mathbf{j} - u_3v_2\mathbf{i} + \mathbf{0} \\ &= (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)\mathbf{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k}. \end{aligned}$$

Theorem 13.1. If $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ and $\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$, then

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)\mathbf{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k}$$

If you studied matrices and determinants at high school, then you may prefer to use the following symbolic determinant formula instead.

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}.$$

Öncelikle

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \|\mathbf{i}\| \|\mathbf{i}\| \sin 0^\circ \mathbf{n} = \mathbf{0}$$

dır. Benzer şekilde $\mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{0}$ ve $\mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0}$ olduğu elde edilebilir.

Daha sonra, sol el kuralı yardımıyla $\mathbf{i} \times \mathbf{j}$ 'nın $\mathbf{k}$ ile aynı yönde olduğuna dikkat edin. Böylece

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \|\mathbf{i}\| \|\mathbf{j}\| \sin 90^\circ \mathbf{k} = \mathbf{k}.$$

Hemen ardından

$$\mathbf{j} \times \mathbf{i} = -(\mathbf{i} \times \mathbf{j}) = -\mathbf{k}$$

eşitliğini elde ederiz.

$$\mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}, \quad \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j} \quad \text{ve} \quad \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$$

eşitsizliklerini benzer şekilde bizzat elde ediniz.

Şimdi, varsayınız ki $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ ve $\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$. O halde aşağıdaki eşitliği elde ederiz;

Teorem 13.1. If $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ and $\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$, then

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)\mathbf{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k}$$

If you studied matrices and determinants at high school, then you may prefer to use the following symbolic determinant formula instead.

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}.$$

Example 13.1. Find $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ and $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ if $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ and $\mathbf{v} = -4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$.


solution:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (1 - 3)\mathbf{i} - (2 - -4)\mathbf{j} + (6 - -4)\mathbf{k} = -2\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 10\mathbf{k}$$

and

$$\mathbf{v} \times \mathbf{u} = -\mathbf{u} \times \mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 10\mathbf{k}.$$

Example 13.2. Find a vector perpendicular to the plane containing the three points $P(1, -1, 0)$, $Q(2, 1, -1)$ and $R(-1, 1, 2)$.



solution: The vector $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}$ is perpendicular to the plane

because $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} \perp \overrightarrow{PQ}$ and $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} \perp \overrightarrow{PR}$. We calculate that

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (2, 1, -1) - (1, -1, 0) \\ &= (2 - 1, 1 + 1, -1 - 0) = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PR} &= R - P = (-1, 1, 2) - (1, -1, 0) \\ &= (-1 - 1, 1 + 1, 2 - 0) = -2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}\end{aligned}$$

$$\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = (4 + 2)\mathbf{i} - (2 - 2)\mathbf{j} + (2 + 4)\mathbf{k} = 6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}.$$

Example 13.3. Find the area of triangle PQR .

solution: The area of the triangle is

$$\begin{aligned}\text{area} &= \frac{1}{2} \|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}\| = \frac{1}{2} \|6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}\| \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{6^2 + 0^2 + 6^2} = 3\sqrt{2}.\end{aligned}$$

Example 13.4. Find a unit vector perpendicular to the plane containing P , Q and R .

solution: We know that $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}$ is perpendicular to the plane. We just need to normalise this vector to find a unit vector.

$$\mathbf{n} = \frac{\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}}{\|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}\|} = \frac{6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}.$$

Example 13.5. A triangle is inscribed inside a cube of side 2 as shown in figure 13.2. Use the cross product to find the area of the triangle.

solution: First we draw coordinate axes and assign coordinates to the vertices of the triangle. See figure 13.3.

Then we can calculate

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (2, 2, 0) - (2, 0, 0) = (0, 2, 0) = 2\mathbf{j}$$

Örnek 13.1. Find $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ and $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ if $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ and $\mathbf{v} = -4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$.

çözüm:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (1 - 3)\mathbf{i} - (2 - -4)\mathbf{j} + (6 - -4)\mathbf{k} = -2\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 10\mathbf{k}$$

and

$$\mathbf{v} \times \mathbf{u} = -\mathbf{u} \times \mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 10\mathbf{k}.$$

Örnek 13.2. Find a vector perpendicular to the plane containing the three points $P(1, -1, 0)$, $Q(2, 1, -1)$ and $R(-1, 1, 2)$.

çözüm: The vector $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}$ is perpendicular to the plane


because $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} \perp \overrightarrow{PQ}$ and $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} \perp \overrightarrow{PR}$. We calculate that

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (2, 1, -1) - (1, -1, 0) \\ &= (2 - 1, 1 + 1, -1 - 0) = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PR} &= R - P = (-1, 1, 2) - (1, -1, 0) \\ &= (-1 - 1, 1 + 1, 2 - 0) = -2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}\end{aligned}$$

$$\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = (4 + 2)\mathbf{i} - (2 - 2)\mathbf{j} + (2 + 4)\mathbf{k} = 6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}.$$

Örnek 13.3. Find the area of triangle PQR .



çözüm: The area of the triangle is

$$\begin{aligned}\text{area} &= \frac{1}{2} \|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}\| = \frac{1}{2} \|6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}\| \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{6^2 + 0^2 + 6^2} = 3\sqrt{2}.\end{aligned}$$

Örnek 13.4. Find a unit vector perpendicular to the plane containing P , Q and R .

çözüm: We know that $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}$ is perpendicular to the plane. We just need to normalise this vector to find a unit vector.

$$\mathbf{n} = \frac{\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}}{\|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}\|} = \frac{6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}.$$

Örnek 13.5. A triangle is inscribed inside a cube of side 2 as shown in figure 13.2. Use the cross product to find the area of the triangle.

çözüm: First we draw coordinate axes and assign coordinates to the vertices of the triangle. See figure 13.3.

Then we can calculate

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (2, 2, 0) - (2, 0, 0) = (0, 2, 0) = 2\mathbf{j}$$

and

$$\overrightarrow{AC} = C - A = (0, 0, 2) - (2, 0, 0) = (-2, 0, 2) = -2\mathbf{i} + 2\mathbf{k}.$$




Figure 13.2: A triangle inscribed inside a cube of side 2.
Şekil 13.2:




Figure 13.3: A triangle inscribed inside a cube of side 2.
Şekil 13.3:

and

$$\overrightarrow{AC} = C - A = (0, 0, 2) - (2, 0, 0) = (-2, 0, 2) = -2\mathbf{i} + 2\mathbf{k}.$$

It follows that

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} &= (2\mathbf{j}) \times (-2\mathbf{i} + 2\mathbf{k}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{i}(4 - 0) - \mathbf{j}(0 - 0) + \mathbf{k}(0 - -4) = 4\mathbf{i} + 4\mathbf{k}.\end{aligned}$$

Therefore

$$\begin{aligned}\text{area of triangle} &= \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\| = \frac{1}{2} \sqrt{4^2 + 0^2 + 4^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{32} = \frac{1}{2} \sqrt{4} \sqrt{8} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.\end{aligned}$$

It follows that

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} &= (2\mathbf{j}) \times (-2\mathbf{i} + 2\mathbf{k}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{i}(4 - 0) - \mathbf{j}(0 - 0) + \mathbf{k}(0 - -4) = 4\mathbf{i} + 4\mathbf{k}.\end{aligned}$$

Therefore


$$\begin{aligned}\text{area of triangle} &= \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\| = \frac{1}{2} \sqrt{4^2 + 0^2 + 4^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{32} = \frac{1}{2} \sqrt{4} \sqrt{8} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.\end{aligned}$$

The Triple Scalar Product

Definition. The *triple scalar product* of $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ and $\mathbf{w}$ is

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}.$$

The Volume of a Parallelepiped



$$\begin{aligned} \text{volume} &= (\text{area of base})(\text{height}) \\ &= \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \cos \theta \\ &= |(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{hacim} &= (\text{taban alanı})(\text{yükseklik}) \\ &= \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \cos \theta \\ &= |(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}| \end{aligned}$$

One Final Comment

We can do the dot product in both $\mathbb{R}^2$ and $\mathbb{R}^3$. But we can only do the cross product in $\mathbb{R}^3$. There is no cross product in $\mathbb{R}^2$.

The Triple Scalar Product

Tanım. The *triple scalar product* of $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ and $\mathbf{w}$ is

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}.$$

Paralelyüzlünün Hacmi

$$\begin{aligned} \text{volume} &= (\text{area of base})(\text{height}) \\ &= \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \cos \theta \\ &= |(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{hacim} &= (\text{taban alanı})(\text{yükseklik}) \\ &= \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \cos \theta \\ &= |(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}| \end{aligned}$$

One Final Comment

We can do the dot product in both $\mathbb{R}^2$ and $\mathbb{R}^3$. But we can only do the cross product in $\mathbb{R}^3$. There is no cross product in $\mathbb{R}^2$.



Figure 13.4: A web comic taken from <https://www.gocomics.com/foxtrot/2006/02/10>.

Şekil 13.4: <https://www.gocomics.com/foxtrot/2006/02/10> adresinden alınan bir web çizgi romanı.

Problems

Problem 13.1. For each pair of vectors below, find $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

(a). $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$
 $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{k}$

(b). $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$
 $\mathbf{v} = -\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$

(c). $\mathbf{u} = 2\mathbf{i}$
 $\mathbf{v} = -3\mathbf{j}$

(d). $\mathbf{u} = -8\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$
 $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$

(e). $\mathbf{u} = \mathbf{i} - \mathbf{k}$
 $\mathbf{v} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$

(f). $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$
 $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$

(g). $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$
 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$

(h). $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$
 $\mathbf{v} = \mathbf{i}$

(i). $\mathbf{u} = \frac{3}{2}\mathbf{i} - \frac{1}{2}\mathbf{j} + \mathbf{k}$
 $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$

Problem 13.2.

- (a). Find the area of the triangle with vertices at $A(0,0,0)$, $B(-1,1,-1)$ and $C(3,0,3)$.
- (b). Find a unit vector which is perpendicular to the plane containing A , B and C .

Problem 13.3. Let $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ and $\mathbf{w}$ be vectors. Which of the following make sense? Give reasons for your answers. b

(a). $1 \cdot \mathbf{u}$.

(b). $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$

(c). $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$

(d). $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$

(e). $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$

Problem 13.4. Use the cross product to calculate the area of the triangles shown in figures 13.5 and 13.6.




Figure 13.5: Another triangle inscribed inside a cube.
 Şekil 13.5:

Sorular

Soru 13.1. For each pair of vectors below, find $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

Soru 13.2.

- (a). Find the area of the triangle with vertices at $A(0,0,0)$, $B(-1,1,-1)$ and $C(3,0,3)$.
- (b). Find a unit vector which is perpendicular to the plane containing A , B and C .

Soru 13.3. Let $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ and $\mathbf{w}$ be vectors. Which of the following make sense? Give reasons for your answers.

(a). $1 \cdot \mathbf{u}$.

(b). $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$

(c). $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$

(d). $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$

(e). $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$

Soru 13.4. Use the cross product to calculate the area of the triangles shown in figures 13.5 and 13.6.




Figure 13.6: Yet another triangle inscribed inside a cube.
 Şekil 13.6:

Problem 13.5. Calculate the triple scalar product of $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$ and $\mathbf{w} = \mathbf{i} + 2\mathbf{k}$.

Soru 13.5. Calculate the triple scalar product of $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$ and $\mathbf{w} = \mathbf{i} + 2\mathbf{k}$.

Lines




Figure 14.1: A line in $\mathbb{R}^3$ passing through the point P_0 parallel to $\mathbf{v}$.

Şekil 14.1:

Lines

To describe a line in $\mathbb{R}^3$, we need

- a point $P_0(x_0, y_0, z_0)$ which the line passes through; and
- a vector $\mathbf{v}$ which gives the direction of the line.

Let $\mathbf{r}_0 = \overrightarrow{OP_0}$ and $\mathbf{r} = \overrightarrow{OP}$.

Definition. The *line L passing through $P_0(x_0, y_0, z_0)$ parallel to $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$* has the vector equation

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}, \quad -\infty < t < \infty.$$

This equation is equivalent to

$$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t(v_1, v_2, v_3)$$

or to the set of three equations

$$x = x_0 + tv_1, \quad y = y_0 + tv_2, \quad z = z_0 + tv_3.$$

Doğrular

Doğrular

$\mathbb{R}^3$ 'te bir doğruyu tanımlamak için, ihtiyaç duyulan

- doğrunun geçtiği $P_0(x_0, y_0, z_0)$ noktası ve
- doğru yönünde bir $\mathbf{v}$ vektörü.

Let $\mathbf{r}_0 = \overrightarrow{OP_0}$ and $\mathbf{r} = \overrightarrow{OP}$.

Tanım. *L doğrusu $P_0(x_0, y_0, z_0)$ noktasından geçen $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ vektörüne paralel olan ve vektör denklemi*

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}, \quad -\infty < t < \infty.$$

Bu denklem şöyle ifade edilebilir:

$$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t(v_1, v_2, v_3)$$

ya da şu üç denklem elde edilir:

$$x = x_0 + tv_1, \quad y = y_0 + tv_2, \quad z = z_0 + tv_3.$$

Tanım. $P_0(x_0, y_0, z_0)$ noktasından geçen ve $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ vektörüne paralel olan L doğrusunun *parametrik denklemleri*:

$$x = x_0 + tv_1, \quad y = y_0 + tv_2, \quad z = z_0 + tv_3.$$

Örnek 14.1. $P_0(-2, 0, 4)$ noktasından geçen ve $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ vektörüne paralel olan doğrunun parametrik denklemlerini bulunuz.

Çözüm: Şöyle yazabiliriz

$$x = -2 + 2t, \quad y = 4t, \quad z = 4 - 2t.$$

Şekide görebilirsiniz 14.3.

Örnek 14.2. $P(-3, 2, -3)$ ve $Q(1, -1, 4)$ noktalarından geçen doğrunun parametrik denklemlerini bulunuz.

Çözüm: $P_0 = P$ ve $\mathbf{v} = \overrightarrow{PQ} = (4, -3, 7) = 4\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 7\mathbf{k}$ alalım. O zaman şunu buluruz:

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t.$$

Definition. The *parametric equations* for the line L passing through $P_0(x_0, y_0, z_0)$ parallel to $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ are

$$x = x_0 + tv_1, \quad y = y_0 + tv_2, \quad z = z_0 + tv_3.$$

Example 14.1. Find parametric equations for the line passing through $P_0(-2, 0, 4)$ parallel to $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$.

solution: We can write

$$x = -2 + 2t, \quad y = 4t, \quad z = 4 - 2t.$$

See figure 14.3.

Example 14.2. Find parametric equations for the line passing through $P(-3, 2, -3)$ and $Q(1, -1, 4)$.

solution: Choose $P_0 = P$ and $\mathbf{v} = \overrightarrow{PQ} = (4, -3, 7) = 4\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 7\mathbf{k}$. Then we can write

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t.$$

Definition. The vector equation

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}, \quad a \leq t \leq b$$

denotes a *line segment*.

Example 14.3. Parametrise the line segment joining $P(-3, 2, -3)$ and $Q(1, -1, 4)$.

solution: We know that $x = -3 + 4t$, $y = 2 - 3t$ and $z = -3 + 7t$. The line passes through P then $t = 0$ and passed through Q when $t = 1$. Therefore

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t, \quad 0 \leq t \leq 1$$

denotes the line segment from P to Q . See figure 14.2.




Figure 14.3: A line in $\mathbb{R}^3$ passing through the point P_0 parallel to $\mathbf{v}$.

Şekil 14.3: $\mathbb{R}^3$ te P_0 noktasından geçen $\mathbf{v}$ vektörüne paralel olan doğru.

Tanım. Vektör denklemi

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}, \quad a \leq t \leq b$$

bir *doğru parçasıdır*.

Örnek

14.3.

$P(-3, 2, -3)$ ve $Q(1, -1, 4)$ noktaları birleştiren doğru parçasını parametrize ediniz.

çözüm: $x = -3 + 4t$, $y = 2 - 3t$ ve $z = -3 + 7t$ olduğunu biliyoruz. $t = 0$ iken bu doğru P noktasından ve $t = 1$ iken de Q noktasından geçmektedir. Dolayısıyla

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t, \quad 0 \leq t \leq 1$$

denklemleri P den Q ya doğru parçasını belirtir . See figure 14.2.




Figure 14.2: The line segment $\mathbb{R}^3$ joining $P(-3, 2, -3)$ and $Q(1, -1, 4)$.

Şekil 14.2: $\mathbb{R}^3$ te $P(-3, 2, -3)$ ve $Q(1, -1, 4)$ noktalarını birleştiren doğru parçası.

The Distance from a Point to a Line

Let d be the shortest distance from the point S to the line L as shown in figure 14.4. We can see from this figure that

$$d = \|\vec{PS}\| \sin \theta.$$

But remember that $\vec{PS} \times \mathbf{v} = \|\vec{PS}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta \mathbf{n}$. Therefore

$$d = \frac{\|\vec{PS} \times \mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|}.$$

Example 14.4. Find the distance from the point $S(1, 1, 5)$ to the line

$$x = 1 + t, \quad y = 3 - t, \quad z = 2t.$$

solution: The line passes through the point $P(1, 3, 0)$ in the direction $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$. Thus

$$\vec{PS} = S - P = (1, 1, 5) - (1, 3, 0) = (0, -2, 5) = -2\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$$

and

$$\vec{PS} \times \mathbf{v} = (-4 + 5)\mathbf{i} - (0 - 5)\mathbf{j} + (0 + 2)\mathbf{k} = \mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 2\mathbf{k}.$$

Therefore

$$d = \frac{\|\vec{PS} \times \mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{\sqrt{1^2 + 5^2 + 2^2}}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{6}} = \sqrt{5}.$$

Bir Noktadan Bir Doğruya Uzaklık

S noktasından L doğrusuna şekildeki gibi en kısa uzaklık d olsun. 14.4. Görülebilir ki this figure şunu verir

$$d = \|\vec{PS}\| \sin \theta.$$

Fakat $\vec{PS} \times \mathbf{v} = \|\vec{PS}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta \mathbf{n}$. Yani

$$d = \frac{\|\vec{PS} \times \mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|}.$$

Örnek 14.4. $S(1, 1, 5)$ noktası ile

$$x = 1 + t, \quad y = 3 - t, \quad z = 2t.$$

doğrusu arasındaki uzaklığı bulunuz.

çözüm: bu doğru $P(1, 3, 0)$ noktasından geçip $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ vektörü yönündedir. Yani

$$\vec{PS} = S - P = (1, 1, 5) - (1, 3, 0) = (0, -2, 5) = -2\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$$

ve

$$\vec{PS} \times \mathbf{v} = (-4 + 5)\mathbf{i} - (0 - 5)\mathbf{j} + (0 + 2)\mathbf{k} = \mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 2\mathbf{k}.$$

Buradan

$$d = \frac{\|\vec{PS} \times \mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{\sqrt{1^2 + 5^2 + 2^2}}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{6}} = \sqrt{5}.$$




Figure 14.4: The distance from a point S to a line L .
Şekil 14.4: S noktasından L doğrusuna uzaklık.

Points of Intersection

Definition. Two lines intersect at a point P if and only if P lies on both lines.

Example 14.5. Do the following two lines intersect? Is yes, where?

Line 1: $x = 7 - t, y = 3 + 3t, z = 2t$.

Line 2: $x = -1 + 2s, y = 3s, z = 1 + s$.

solution: The two lines intersect if and only if there exist $s, t \in \mathbb{R}$ such that

$$\begin{aligned} 7 - t = x = -1 + 2s & \implies t = 8 - 2s \\ 3 + 3t = y = 3s & \implies s = t + 1 \\ 2t = z = 1 + s & \end{aligned}$$

The first equation tells us that $t = 8 - 2s$. Putting this into the second equation gives $s = t + 1 = (8 - 2s) + 1 = 9 - 2s$ which implies that $s = 3$ and $t = 2$. We must check the third equation: $2t = 2 \times 2 = 4 = 1 + 3 = 1 + s$. Because the third equation is also true, we know that they two lines intersect at $P(5, 9, 4)$.

Example 14.6. Do the following two lines intersect? If yes, where?

Line 1: $x = 1 + t, y = 3t, z = 3 + 3t$.

Line 2: $x = -1 + 2s, y = 3s, z = 1 + s$.

solution: Can we find $s, t \in \mathbb{R}$ such that

$$\begin{aligned} 1 + t = x = -1 + 2s \\ 3t = y = 3s & \implies s = t \\ 3 + 3t = z = 1 + s \end{aligned}$$


are all true?

The second equation gives $s = t$. Thus $1 + t = -1 + 2t \implies 2 + t = 2t \implies t = 2$. However $3 + 3t = 1 + t \implies 2 + 2t = 0 \implies t = -2 \neq 2$. Therefore it is not possible to find an s and a t . Hence the lines do not intersect.

The Distance Between Two Lines

There are three cases to consider:

- the lines intersect;
- the lines do not intersect and are parallel ($\mathbf{v}_1 = k\mathbf{v}_2$ for some $k \in \mathbb{R}$); or
- the lines do not intersect and are skew ($\mathbf{v}_1 \neq k\mathbf{v}_2$ for all $k \in \mathbb{R}$).



Kesişim Noktaları

Tanım. İki doğru bir P noktasında kesişirler ancak ve ancak P her iki doğrunun üzerindedir.

Örnek 14.5. Aşağıdaki doğrular kesişir mi? Öyleyse, nerede kesişirler?

Doğru 1: $x = 7 - t, y = 3 + 3t, z = 2t$.

Doğru 2: $x = -1 + 2s, y = 3s, z = 1 + s$.

çözüm: The two lines intersect if and only if there exist $s, t \in \mathbb{R}$ such that

$$\begin{aligned} 7 - t = x = -1 + 2s & \implies t = 8 - 2s \\ 3 + 3t = y = 3s & \implies s = t + 1 \\ 2t = z = 1 + s & \end{aligned}$$

The first equation tells us that $t = 8 - 2s$. Putting this into the second equation gives $s = t + 1 = (8 - 2s) + 1 = 9 - 2s$ which implies that $s = 3$ and $t = 2$. We must check the third equation: $2t = 2 \times 2 = 4 = 1 + 3 = 1 + s$. Because the third equation is also true, we know that they two lines intersect at $P(5, 9, 4)$.

Örnek 14.6. Do the following two lines intersect? If yes, where?

Doğru 1: $x = 1 + t, y = 3t, z = 3 + 3t$.

Doğru 2: $x = -1 + 2s, y = 3s, z = 1 + s$.

çözüm: Can we find $s, t \in \mathbb{R}$ such that

$$\begin{aligned} 1 + t = x = -1 + 2s \\ 3t = y = 3s & \implies s = t \\ 3 + 3t = z = 1 + s \end{aligned}$$

are all true?

The second equation gives $s = t$. Thus $1 + t = -1 + 2t \implies 2 + t = 2t \implies t = 2$. However $3 + 3t = 1 + t \implies 2 + 2t = 0 \implies t = -2 \neq 2$. Therefore it is not possible to find an s and a t . Hence the lines do not intersect.

The Distance Between Two Lines

There are three cases to consider:

- the lines intersect;
- the lines do not intersect and are parallel ($\mathbf{v}_1 = k\mathbf{v}_2$ for some $k \in \mathbb{R}$); or
- the lines do not intersect and are skew ($\mathbf{v}_1 \neq k\mathbf{v}_2$ for all $k \in \mathbb{R}$).




Figure 14.5: The distance between parallel lines.
Şekil 14.5:




Figure 14.6: The distance between skew lines.
Şekil 14.6:

Intersecting Lines

Clearly the distance between intersecting lines is zero. Hence

$$d = 0.$$

Parallel Lines ($\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$)

Next we consider parallel lines. We can see from figure 14.5 that the distance between the two parallel lines is the same as the distance between P_2 and the line L_1 . Hence

$$d = \frac{\|\overrightarrow{P_1 P_2} \times \mathbf{v}_1\|}{\|\mathbf{v}_1\|}.$$

Skew Lines ($\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 \neq \mathbf{0}$)

Finally we consider skew lines. See figure 14.6. Let $\mathbf{n} = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$. Then $\mathbf{n}$ is orthogonal to both $\mathbf{v}_1$ and $\mathbf{v}_2$. So

$$d = \|\overrightarrow{Q_1 Q_2}\| = \|\text{proj}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{P_1 P_2}\| = \frac{|\overrightarrow{P_1 P_2} \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|}.$$

Thus

$$d = \frac{|\overrightarrow{P_1 P_2} \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)|}{\|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\|}.$$

Intersecting Lines

Clearly the distance between intersecting lines is zero. Hence

$$d = 0.$$

Parallel Lines ($\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$)

Next we consider parallel lines. We can see from figure 14.5 that the distance between the two parallel lines is the same as the distance between P_2 and the line L_1 . Hence

$$d = \frac{\|\overrightarrow{P_1 P_2} \times \mathbf{v}_1\|}{\|\mathbf{v}_1\|}.$$

Skew Lines ($\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 \neq \mathbf{0}$)

Finally we consider skew lines. See figure 14.6. Let $\mathbf{n} = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$. Then $\mathbf{n}$ is orthogonal to both $\mathbf{v}_1$ and $\mathbf{v}_2$. So

$$d = \|\overrightarrow{Q_1 Q_2}\| = \|\text{proj}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{P_1 P_2}\| = \frac{|\overrightarrow{P_1 P_2} \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|}.$$

Thus

$$d = \frac{|\overrightarrow{P_1 P_2} \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)|}{\|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\|}.$$

Example 14.7. Find the distance between the following two lines.

line 1: $x = 0, y = -t, z = t,$

line 2: $x = 1 + 2s, y = s, z = -3s.$

solution: We have that $P_1(0, 0, 0), \mathbf{v}_1 = -\mathbf{j} + \mathbf{k}, P_2(1, 0, 0)$ and $\mathbf{v}_2 = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 3\mathbf{k}.$ Since

$$\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k} \neq \mathbf{0},$$

the lines are skew. (Recall that we have $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$ for parallel vectors.) Moreover note that $\overrightarrow{P_1P_2} = \mathbf{i}.$ Then we calculate that

$$\begin{aligned} d &= \frac{|\overrightarrow{P_1P_2} \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)|}{\|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\|} = \frac{|(\mathbf{i}) \cdot (2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k})|}{\|2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}\|} \\ &= \frac{|2 + 0 + 0|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Örnek 14.7. Find the distance between the following two lines.

doğru 1: $x = 0, y = -t, z = t,$

doğru 2: $x = 1 + 2s, y = s, z = -3s.$

çözüm: We have that $P_1(0, 0, 0), \mathbf{v}_1 = -\mathbf{j} + \mathbf{k}, P_2(1, 0, 0)$ and $\mathbf{v}_2 = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 3\mathbf{k}.$ Since

$$\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k} \neq \mathbf{0},$$

the lines are skew. (Recall that we have $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$ for parallel vectors.) Moreover note that $\overrightarrow{P_1P_2} = \mathbf{i}.$ Then we calculate that

$$\begin{aligned} d &= \frac{|\overrightarrow{P_1P_2} \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)|}{\|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\|} = \frac{|(\mathbf{i}) \cdot (2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k})|}{\|2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}\|} \\ &= \frac{|2 + 0 + 0|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Problems

Problem 14.1. Find parametric equations for the line through $P(3, -4, -1)$ which is parallel to the vector $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}.$

Problem 14.2. Find parametric equations for the line through the points $P(1, 2, -1)$ and $Q(-1, 0, 1).$

Problem 14.3. Find parametric equations for the line through the point $P(2, 3, 0)$ which is perpendicular to the vectors $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ and $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 5\mathbf{k}.$

Problem 14.4. Find the distance from the point $S(-1, 4, 3)$ to the line $x = 10 + 4t, y = -3, z = 4t.$

Problem 14.5. Find the distance from the point $S(2, 1, 3)$ to the line $x = 2 + 2t, y = 1 + 6t, z = 3.$

Problem 14.6. Consider the following two lines:

line 1: $x = 7 + t, y = 8 + t, z = 9 - t,$

line 2: $x = 15 - 3s, y = 16 - 3s, z = 7.$

(a). Do these lines intersect? If yes, where?

(b). Find the distance between these two lines.

Problem 14.7. The following two lines do not intersect. Find the distance between them.

line 1: $x = 10 + 4t, y = -3, z = 4t,$

line 2: $x = 10 - 4s, y = 0, z = 2 - 4s.$

Problem 14.8. The following two lines do not intersect. Find the distance between them.

line 1: $x = 10 + 4t, y = -t, z = 4t,$

line 2: $x = 10 - 4s, y = 1, z = 2 - 4s.$

Sorular

Soru 14.1. Find parametric equations for the line through $P(3, -4, -1)$ which is parallel to the vector $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}.$

Soru 14.2. Find parametric equations for the line through the points $P(1, 2, -1)$ and $Q(-1, 0, 1).$

Soru 14.3. Find parametric equations for the line through the point $P(2, 3, 0)$ which is perpendicular to the vectors $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ and $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 5\mathbf{k}.$

Soru 14.4. Find the distance from the point $S(-1, 4, 3)$ to the line $x = 10 + 4t, y = -3, z = 4t.$

Soru 14.5. Find the distance from the point $S(2, 1, 3)$ to the line $x = 2 + 2t, y = 1 + 6t, z = 3.$

Soru 14.6. Consider the following two lines:

doğru 1: $x = 7 + t, y = 8 + t, z = 9 - t,$

doğru 2: $x = 15 - 3s, y = 16 - 3s, z = 7.$

(a). Do these lines intersect? If yes, where?

(b). Find the distance between these two lines.

Soru 14.7. The following two lines do not intersect. Find the distance between them.

doğru 1: $x = 10 + 4t, y = -3, z = 4t,$

doğru 2: $x = 10 - 4s, y = 0, z = 2 - 4s.$

Soru 14.8. The following two lines do not intersect. Find the distance between them.

doğru 1: $x = 10 + 4t, y = -t, z = 4t,$

doğru 2: $x = 10 - 4s, y = 1, z = 2 - 4s.$

Planes

To describe a plane, we need

- a point $P_0(x_0, y_0, z_0)$ which the plane passes through; and
- a vector $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ which is perpendicular to the plane.

The vector $\mathbf{n}$ is said to be *normal* to the plane.




Figure 15.1: A plane passing through the point $P_0(x_0, y_0, z_0)$ with normal vector $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$.
Şekil 15.1:

Definition. The plane passing through the point $P_0(x_0, y_0, z_0)$ with normal vector $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ has the vector equation

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0.$$

Writing this equation in coordinates, we have

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

or

$$Ax + By + Cz = D$$

where $D = Ax_0 + By_0 + Cz_0$ is a constant.

Example 15.1. Find an equation for the plane passing through $P_0(-3, 0, 7)$ normal to $\mathbf{n} = 5\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$.

solution:

$$\begin{aligned} A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) &= 0 \\ 5(x - (-3)) + 2(y - 0) + (-1)(z - 7) &= 0 \\ 5x - 15 + 2y - z + 7 &= 0 \\ 5x + 2y - z &= -22. \end{aligned}$$

Düzlemler

To describe a plane, we need

- a point $P_0(x_0, y_0, z_0)$ which the plane passes through; and
- a vector $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ which is perpendicular to the plane.

The vector $\mathbf{n}$ is said to be *normal* to the plane.

Tanım. The plane passing through the point $P_0(x_0, y_0, z_0)$ with normal vector $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ has the vector equation

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0.$$

Writing this equation in coordinates, we have

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

or

$$Ax + By + Cz = D$$

where $D = Ax_0 + By_0 + Cz_0$ is a constant.

Örnek 15.1. Find an equation for the plane passing through $P_0(-3, 0, 7)$ normal to $\mathbf{n} = 5\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$.

çözüm:

$$\begin{aligned} A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) &= 0 \\ 5(x - (-3)) + 2(y - 0) + (-1)(z - 7) &= 0 \\ 5x - 15 + 2y - z + 7 &= 0 \\ 5x + 2y - z &= -22. \end{aligned}$$

Not. The vector $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ is normal to the plane $Ax + By + Cz = D$.

Örnek 15.2. Find a vector normal to the plane $x + 2y + 3z = 4$.

çözüm: We can immediately write down $\mathbf{n} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$.

Örnek 15.3. Find an equation for the plane containing the points $E(0, 0, 1)$, $F(2, 0, 0)$ and $G(0, 3, 0)$.

çözüm: First we need to find a vector normal to the plane. Since $\overrightarrow{EF} = 2\mathbf{i} - \mathbf{k}$ and $\overrightarrow{EG} = 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$, we have that

$$\begin{aligned} \mathbf{n} &= \overrightarrow{EF} \times \overrightarrow{EG} = (0 - -3)\mathbf{i} - (-2 - 0)\mathbf{j} + (6 - 0)\mathbf{k} \\ &= 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 6\mathbf{k} \end{aligned}$$

Remark. The vector $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ is normal to the plane $Ax + By + Cz = D$.

Example 15.2. Find a vector normal to the plane $x + 2y + 3z = 4$.

solution: We can immediately write down $\mathbf{n} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$.

Example 15.3. Find an equation for the plane containing the points $E(0, 0, 1)$, $F(2, 0, 0)$ and $G(0, 3, 0)$.

solution: First we need to find a vector normal to the plane. Since $\overrightarrow{EF} = 2\mathbf{i} - \mathbf{k}$ and $\overrightarrow{EG} = 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$, we have that

$$\begin{aligned}\mathbf{n} &= \overrightarrow{EF} \times \overrightarrow{EG} = (0 - -3)\mathbf{i} - (-2 - 0)\mathbf{j} + (6 - 0)\mathbf{k} \\ &= 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 6\mathbf{k}\end{aligned}$$

is normal to the plane. See figure ???. Using $P_0 = E(0, 0, 1)$, the equation for the plane is

$$\begin{aligned}3(x - 0) + 2(y - 0) + 6(z - 1) &= 0 \\ 3x + 2y + 6z &= 6.\end{aligned}$$

is normal to the plane. See figure ???. Using $P_0 = E(0, 0, 1)$, the equation for the plane is

$$\begin{aligned}3(x - 0) + 2(y - 0) + 6(z - 1) &= 0 \\ 3x + 2y + 6z &= 6.\end{aligned}$$

Lines of Intersection




Figure 15.2: Two planes are parallel $\iff \mathbf{n}_1 = k\mathbf{n}_2$ for some $k \in \mathbb{R}$.

Şekil 15.2:

Example 15.4. Find a vector parallel to the line of intersection of the planes $3x - 6y - 2z = 15$ and $2x + y - 2z = 5$.

solution: We can immediately write down $\mathbf{n}_1 = 3\mathbf{i} - 6\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ and $\mathbf{n}_2 = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$. A vector parallel to the line of intersection is

$$\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = (12 + 2)\mathbf{i} - (-6 + 4)\mathbf{j} + (3 + 12)\mathbf{k} = 14\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 15\mathbf{k}.$$

Example 15.5. Find the point where the line $x = \frac{8}{3} + 2t$, $y = -2t$, $z = 1 + t$ intersects the plane $3x + 2y + 6z = 6$.

Kesişim Doğruları




Figure 15.3: Two planes intersect in a line $\iff \mathbf{n}_1 \neq k\mathbf{n}_2$ for all $k \in \mathbb{R}$.

Şekil 15.3:

Örnek 15.4. Find a vector parallel to the line of intersection of the planes $3x - 6y - 2z = 15$ and $2x + y - 2z = 5$.

çözüm: We can immediately write down $\mathbf{n}_1 = 3\mathbf{i} - 6\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ and $\mathbf{n}_2 = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$. A vector parallel to the line of intersection is

$$\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = (12 + 2)\mathbf{i} - (-6 + 4)\mathbf{j} + (3 + 12)\mathbf{k} = 14\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 15\mathbf{k}.$$

Örnek 15.5. Find the point where the line $x = \frac{8}{3} + 2t$, $y = -2t$, $z = 1 + t$ intersects the plane $3x + 2y + 6z = 6$.

solution: We calculate that

$$\begin{aligned} 3x + 2y + 6z &= 6 \\ 3\left(\frac{8}{3} + 2t\right) + 2(-2t) + 6(1+t) &= 6 \\ 8 + 6t - 4t + 6 + 6t &= 6 \\ 8t &= -8 \\ t &= -1. \end{aligned}$$

The point of intersection is

$$P(x, y, z)|_{t=-1} = P\left(\frac{8}{3} + 2t, -2t, 1+t\right)\Big|_{t=-1} = P\left(\frac{2}{3}, 2, 0\right).$$

çözüm: We calculate that

$$\begin{aligned} 3x + 2y + 6z &= 6 \\ 3\left(\frac{8}{3} + 2t\right) + 2(-2t) + 6(1+t) &= 6 \\ 8 + 6t - 4t + 6 + 6t &= 6 \\ 8t &= -8 \\ t &= -1. \end{aligned}$$

The point of intersection is

$$P(x, y, z)|_{t=-1} = P\left(\frac{8}{3} + 2t, -2t, 1+t\right)\Big|_{t=-1} = P\left(\frac{2}{3}, 2, 0\right).$$

The Distance from a Point to a Plane




Figure 15.4: The distance from a Point to a Plane.

Şekil 15.4: Bir Noktadan Bir Düzleme Olan Uzaklık.

We can see from figure 15.4 that $d = \|\text{proj}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{PS}\|$. Therefore the distance from a point S to a plane containing the point P is

$$d = \frac{|\overrightarrow{PS} \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|}.$$


Example 15.6. Find the distance from the point $S(1, 2, 3)$ to the plane $x + 2y + 3z = 4$.

solution: First we need a point in the plane. Setting $y = 0$ and $z = 0$ we must have $x = 4 - 2y - 3z = 4$. Therefore $P(4, 0, 0)$ is in the plane. Clearly $\mathbf{n} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$.

Therefore the required distance is

$$\begin{aligned} d &= \frac{|\overrightarrow{PS} \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|} = \frac{|(-3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) \cdot (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k})|}{\|\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}\|} \\ &= \frac{|-3 + 4 + 9|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2}} = \frac{10}{\sqrt{14}}. \end{aligned}$$

Bir Noktadan Bir Düzleme Olan Uzaklık



We can see from figure 15.4 that $d = \|\text{proj}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{PS}\|$. Therefore the distance from a point S to a plane containing the point P is

$$d = \frac{|\overrightarrow{PS} \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|}.$$

Örnek 15.6. Find the distance from the point $S(1, 2, 3)$ to the plane $x + 2y + 3z = 4$.

çözüm: First we need a point in the plane. Setting $y = 0$ and $z = 0$ we must have $x = 4 - 2y - 3z = 4$. Therefore $P(4, 0, 0)$ is in the plane. Clearly $\mathbf{n} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$.

Therefore the required distance is

$$\begin{aligned} d &= \frac{|\overrightarrow{PS} \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|} = \frac{|(-3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) \cdot (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k})|}{\|\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}\|} \\ &= \frac{|-3 + 4 + 9|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2}} = \frac{10}{\sqrt{14}}. \end{aligned}$$

Angles Between Planes

There are two possible angles that can be measured between planes. We are interested in the smaller angle. See figure 15.5.

Definition. The angle between two planes is defined to be equal to whichever of the following angles is smaller

- the angle between $\mathbf{n}_1$ and $\mathbf{n}_2$;
- 180° minus the angle between $\mathbf{n}_1$ and $\mathbf{n}_2$.

The angle between two planes will always be between 0° and 90° .

Example 15.7. Find the angle between the planes $3x - 6y - 2z = 15$ and $-2x - y + 2z = 5$.

solution: We have normal vectors $\mathbf{n}_1 = 3\mathbf{i} - 6\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ and $\mathbf{n}_2 = -2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$. The angle between $\mathbf{n}_1$ and $\mathbf{n}_2$ is

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{\|\mathbf{n}_1\| \|\mathbf{n}_2\|} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{-4}{21} \right) \approx 101^\circ.$$

Because $101^\circ > 90^\circ$, the angle between the two planes is approximately $180^\circ - 101^\circ = 79^\circ$.

Düzlemler Arasındaki Aç

There are two possible angles that can be measured between planes. We are interested in the smaller angle. See figure 15.5.

Tanım. The angle between two planes is defined to be equal to whichever of the following angles is smaller

- the angle between $\mathbf{n}_1$ and $\mathbf{n}_2$;
- 180° minus the angle between $\mathbf{n}_1$ and $\mathbf{n}_2$.

The angle between two planes will always be between 0° and 90° .

Örnek 15.7. Find the angle between the planes $3x - 6y - 2z = 15$ and $-2x - y + 2z = 5$.

çözüm: We have normal vectors $\mathbf{n}_1 = 3\mathbf{i} - 6\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ and $\mathbf{n}_2 = -2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$. The angle between $\mathbf{n}_1$ and $\mathbf{n}_2$ is

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{\|\mathbf{n}_1\| \|\mathbf{n}_2\|} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{-4}{21} \right) \approx 101^\circ.$$

Because $101^\circ > 90^\circ$, the angle between the two planes is approximately $180^\circ - 101^\circ = 79^\circ$.




Figure 15.5: The angle between two planes is either θ or $(180^\circ - \theta)$, whichever is smaller.

Şekil 15.5:

Problems

Problem 15.1. Find an equation for the plane passing through the points $E(2, 4, 5)$, $F(1, 5, 7)$ and $G(-1, 6, 8)$.

Problem 15.2. Let $O(0, 0, 0)$ be the origin. Find an equation for the plane through the point $A(1, -2, 1)$ which is perpendicular to the vector $\overrightarrow{OA}$.

Problem 15.3. Find the point where the line intersects the plane.

- (a). Line: $x = 1 - t$, $y = 3t$, $z = 1 + t$,
Plane: $2x - y + 3z = 6$.
- (b). Line: $x = 2$, $y = 3 + 2t$, $z = -2 - 2t$,
Plane: $6x + 3y - 4z = -12$.

Problem 15.4. Find parametric equations for the lines in which the following pairs of planes intersect.

- (a). Plane 1: $x + y + z = 1$,
Plane 2: $x + y = 2$.
- (b). Plane 1: $3x - 6y - 2z = 3$,
Plane 2: $2x + y - 2z = 2$.

Problem 15.5.

- (a). Find the distance from the point $S(2, -3, 4)$ to the plane $x + 2y + 2z = 13$.
- (b). Find the distance from the point $S(1, 0, -1)$ to the plane $-4x + y + z = 4$.

Problem 15.6. Find the angle between the plane $x + y = 1$ and the plane $2x + y - 2x = 2$.

Problem 15.7. Find a formula for the distance between two planes.

Sorular

Soru 15.1. Find an equation for the plane passing through the points $E(2, 4, 5)$, $F(1, 5, 7)$ and $G(-1, 6, 8)$.

Soru 15.2. Let $O(0, 0, 0)$ be the origin. Find an equation for the plane through the point $A(1, -2, 1)$ which is perpendicular to the vector $\overrightarrow{OA}$.

Soru 15.3. Find the point where the line intersects the plane.

- (a). Line: $x = 1 - t$, $y = 3t$, $z = 1 + t$,
Plane: $2x - y + 3z = 6$.
- (b). Line: $x = 2$, $y = 3 + 2t$, $z = -2 - 2t$,
Plane: $6x + 3y - 4z = -12$.

Soru 15.4. Find parametric equations for the lines in which the following pairs of planes intersect.

- (a). Plane 1: $x + y + z = 1$,
Plane 2: $x + y = 2$.
- (b). Plane 1: $3x - 6y - 2z = 3$,
Plane 2: $2x + y - 2z = 2$.

Soru 15.5.

- (a). Find the distance from the point $S(2, -3, 4)$ to the plane $x + 2y + 2z = 13$.
- (b). Find the distance from the point $S(1, 0, -1)$ to the plane $-4x + y + z = 4$.

Soru 15.6. Find the angle between the plane $x + y = 1$ and the plane $2x + y - 2x = 2$.

Soru 15.7. Find a formula for the distance between two planes.

16

Projections

İzdüşümler

Recall that in chapter 12 we defined the projection of a vector $\mathbf{u}$ onto a vector $\mathbf{v}$ to be

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v}.$$

Recall that in chapter 12 we defined the projection of a vector $\mathbf{u}$ onto a vector $\mathbf{v}$ to be

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v}.$$

Projection of a Vector onto a Line

Definition. Let L be the line passing through the point P in the direction $\mathbf{v}$. The projection of a vector $\mathbf{u}$ onto the line L is

$$\text{proj}_L \mathbf{u} = \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}.$$

Example 16.1. Find the projection of the vector $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ onto the line $x = 1 + 2t$, $y = 2 - t$, $z = 4 - 4t$.

solution: Clearly $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} - 4\mathbf{k}$ is parallel to the line. Thus

$$\begin{aligned} \text{proj}_L \mathbf{u} &= \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v} \\ &= \left(\frac{4 + 1 - 12}{2^2 + (-1)^2 + (-4)^2} \right) (2\mathbf{i} - \mathbf{j} - 4\mathbf{k}) \\ &= \left(\frac{-7}{21} \right) (2\mathbf{i} - \mathbf{j} - 4\mathbf{k}) \\ &= -\frac{1}{3} (2\mathbf{i} - \mathbf{j} - 4\mathbf{k}) \\ &= -\frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} + \frac{4}{3}\mathbf{k}. \end{aligned}$$

Vektörün Doğru Üzerine İzdüşümü

Tanım. L doğrusu P noktasından geçip $\mathbf{v}$ ile aynı yönde olsun. $\mathbf{u}$ vektörünün L doğrusu üzerine izdüşümü

$$\text{proj}_L \mathbf{u} = \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}.$$

Örnek 16.1. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ vektörünün $x = 1 + 2t$, $y = 2 - t$, $z = 4 - 4t$ doğrusu üzerine izdüşümünü bulunuz.

çözüm: Aşıkarak $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} - 4\mathbf{k}$ vektörü doğruya paraleldir. Yani

$$\begin{aligned} \text{proj}_L \mathbf{u} &= \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v} \\ &= \left(\frac{4 + 1 - 12}{2^2 + (-1)^2 + (-4)^2} \right) (2\mathbf{i} - \mathbf{j} - 4\mathbf{k}) \\ &= \left(\frac{-7}{21} \right) (2\mathbf{i} - \mathbf{j} - 4\mathbf{k}) \\ &= -\frac{1}{3} (2\mathbf{i} - \mathbf{j} - 4\mathbf{k}) \\ &= -\frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} + \frac{4}{3}\mathbf{k}. \end{aligned}$$




Figure 16.1: The projection of a vector onto a line.
Şekil 16.1: Vektörün Doğruya İzdüşümü.

Projection of a Vector onto a Plane

Definition. The *projection* of a vector $\mathbf{u}$ onto a plane with normal vector $\mathbf{n}$ is

$$\text{proj}_{\text{plane}} \mathbf{u} = \mathbf{u} - \text{proj}_{\mathbf{n}} \mathbf{u} = \mathbf{u} - \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2} \right) \mathbf{n}.$$

See figure 16.2.

Example 16.2. Find the projection of the vector $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ onto the plane $3x - y + 2z = 7$.

solution: Clearly $\mathbf{n} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ and

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\mathbf{n}} \mathbf{u} &= \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2} \right) \mathbf{n} = \left(\frac{3 - 2 + 6}{3^2 + (-1)^2 + 2^2} \right) (3\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}) \\ &= \frac{1}{2} (3\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}) = \frac{3}{2}\mathbf{i} - \frac{1}{2}\mathbf{j} + \mathbf{k}. \end{aligned}$$

Therefore

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\text{plane}} \mathbf{u} &= \mathbf{u} - \text{proj}_{\mathbf{n}} \mathbf{u} \\ &= (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) - \left(\frac{3}{2}\mathbf{i} - \frac{1}{2}\mathbf{j} + \mathbf{k} \right) \\ &= -\frac{1}{2}\mathbf{i} + \frac{5}{2}\mathbf{j} + 2\mathbf{k}. \end{aligned}$$




Figure 16.2: The projection of a vector onto a plane.
Şekil 16.2:

Projection of a Vector onto a Plane

Tanım. The *projection* of a vector $\mathbf{u}$ onto a plane with normal vector $\mathbf{n}$ is

$$\text{proj}_{\text{düzlem}} \mathbf{u} = \mathbf{u} - \text{proj}_{\mathbf{n}} \mathbf{u} = \mathbf{u} - \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2} \right) \mathbf{n}.$$

See figure 16.2.

Örnek 16.2. Find the projection of the vector $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ onto the plane $3x - y + 2z = 7$.

çözüm: Clearly $\mathbf{n} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ and

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\mathbf{n}} \mathbf{u} &= \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2} \right) \mathbf{n} = \left(\frac{3 - 2 + 6}{3^2 + (-1)^2 + 2^2} \right) (3\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}) \\ &= \frac{1}{2} (3\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}) = \frac{3}{2}\mathbf{i} - \frac{1}{2}\mathbf{j} + \mathbf{k}. \end{aligned}$$

Therefore

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\text{düzlem}} \mathbf{u} &= \mathbf{u} - \text{proj}_{\mathbf{n}} \mathbf{u} \\ &= (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) - \left(\frac{3}{2}\mathbf{i} - \frac{1}{2}\mathbf{j} + \mathbf{k} \right) \\ &= -\frac{1}{2}\mathbf{i} + \frac{5}{2}\mathbf{j} + 2\mathbf{k}. \end{aligned}$$




Figure 16.3: The projection of a point onto a plane.
Şekil 16.3:

Projection of a Point onto a Plane

Definition. Let P be a point and let $Ax + By + Cz = D$ be a plane. Let Q be a point on the plane and let $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ denote a vector normal to the plane.

The projection of the point P onto this plane is

$$\text{proj}_{\text{plane}} P = P + \text{proj}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{PQ}$$

as shown in figure 16.3.

Example 16.3. Find the projection of the point $P(1, 2, -4)$ on the plane $2x + y + 4z = 2$.

solution: Note first that $\mathbf{n} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 4\mathbf{k}$ and that the point $Q(1, 0, 0)$ lies on the plane. Since

$$\overrightarrow{PQ} = Q - P = (1, 0, 0) - (1, 2, -4) = (0, -2, 4) = -2\mathbf{j} + 4\mathbf{k},$$

we have

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{PQ} &= \left(\frac{\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2} \right) \mathbf{n} \\ &= \left(\frac{0 - 2 + 16}{2^2 + 1^2 + 4^2} \right) (2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 4\mathbf{k}) \\ &= \left(\frac{14}{21} \right) (2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 4\mathbf{k}) \\ &= \frac{2}{3} (2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 4\mathbf{k}) \\ &= \frac{4}{3}\mathbf{i} + \frac{2}{3}\mathbf{j} + \frac{8}{3}\mathbf{k}. \end{aligned}$$

Therefore

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\text{plane}} P &= P + \text{proj}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{PQ} \\ &= (1, 2, -4) + \left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{8}{3} \right) \\ &= \left(\frac{7}{3}, \frac{8}{3}, -\frac{4}{3} \right). \end{aligned}$$

We should double check that the point $\left(\frac{7}{3}, \frac{8}{3}, -\frac{4}{3}\right)$ is on the plane $2x + y + 4z = 2$.

$$2x + y + 4z = 2 \left(\frac{7}{3} \right) + \left(\frac{8}{3} \right) + 4 \left(-\frac{4}{3} \right) = \frac{14}{3} + \frac{8}{3} - \frac{16}{3} = \frac{6}{3} = 2 \quad \checkmark$$

Projection of a Point onto a Plane

Tanım. Let P be a point and let $Ax + By + Cz = D$ be a plane. Let Q be a point on the plane and let $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ denote a vector normal to the plane.

The projection of the point P onto this plane is

$$\text{proj}_{\text{düzlem}} P = P + \text{proj}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{PQ}$$

as shown in figure 16.3.

Örnek 16.3. Find the projection of the point $P(1, 2, -4)$ on the plane $2x + y + 4z = 2$.

çözüm: Note first that $\mathbf{n} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 4\mathbf{k}$ and that the point $Q(1, 0, 0)$ lies on the plane. Since

$$\overrightarrow{PQ} = Q - P = (1, 0, 0) - (1, 2, -4) = (0, -2, 4) = -2\mathbf{j} + 4\mathbf{k},$$

we have

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{PQ} &= \left(\frac{\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2} \right) \mathbf{n} \\ &= \left(\frac{0 - 2 + 16}{2^2 + 1^2 + 4^2} \right) (2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 4\mathbf{k}) \\ &= \left(\frac{14}{21} \right) (2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 4\mathbf{k}) \\ &= \frac{2}{3} (2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 4\mathbf{k}) \\ &= \frac{4}{3}\mathbf{i} + \frac{2}{3}\mathbf{j} + \frac{8}{3}\mathbf{k}. \end{aligned}$$

Therefore

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\text{düzlem}} P &= P + \text{proj}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{PQ} \\ &= (1, 2, -4) + \left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{8}{3} \right) \\ &= \left(\frac{7}{3}, \frac{8}{3}, -\frac{4}{3} \right). \end{aligned}$$

We should double check that the point $\left(\frac{7}{3}, \frac{8}{3}, -\frac{4}{3}\right)$ is on the plane $2x + y + 4z = 2$.

$$2x + y + 4z = 2 \left(\frac{7}{3} \right) + \left(\frac{8}{3} \right) + 4 \left(-\frac{4}{3} \right) = \frac{14}{3} + \frac{8}{3} - \frac{16}{3} = \frac{6}{3} = 2 \quad \checkmark$$

Projection of a Line onto a Plane

Let L be a line passing through the point P in the direction $\mathbf{v}$. Let $Ax + By + Cz = D$ be a plane with normal vector $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$.

There are three cases to consider:

- (i). The line is orthogonal to the plane ($\mathbf{v} \times \mathbf{n} = \mathbf{0}$);
- (ii). The line is parallel to the plane ($\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0$); and
- (iii). The line is not parallel to the plane and is not orthogonal to the plane ($\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \neq 0$ and $\mathbf{v} \times \mathbf{n} \neq \mathbf{0}$).




Figure 16.4: The projection of a line onto an orthogonal plane.
Şekil 16.4:




Figure 16.5: The projection of a line onto a parallel plane.
Şekil 16.5:




Figure 16.6: The projection of a line onto a plane which is neither orthogonal to, nor parallel to, the line.
Şekil 16.6:

A Line Orthogonal to a Plane ($\mathbf{v} \times \mathbf{n} = \mathbf{0}$)

This is the easiest case: The projection of the line onto the plane is just the point where they intersect. See figure 16.4. Therefore

$$\text{proj}_{\text{plane}} L = \text{proj}_{\text{plane}} P.$$

A Line Parallel to a Plane ($\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0$)

From figure 16.5, we can see that

$$\text{proj}_{\text{plane}} L = \left(\begin{array}{l} \text{the line passing through the point} \\ \text{proj}_{\text{plane}} P \text{ in the direction } \mathbf{v}. \end{array} \right)$$

A Line which is Neither Parallel to nor Orthogonal to the Plane

See figure 16.6. Since $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \neq 0$, then the line must intersect the plane at some point B . Assuming $B \neq P$, we have

$$\text{proj}_{\text{plane}} L = \left(\begin{array}{l} \text{the line passing through the} \\ \text{points } B \text{ and } \text{proj}_{\text{plane}} P. \end{array} \right)$$

Doğrunun düzlem üzerine izdüşümü

L doğrusu P noktasından geçip $\mathbf{v}$ ile aynı yönde olsun. $Ax + By + Cz = D$ düzleminin normal vektörü $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$. Üç durum söz konusu:

- (i). Doğrunun düzleme dik olması ($\mathbf{v} \times \mathbf{n} = \mathbf{0}$);
- (ii). Doğrunun düzleme paralel olması ($\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0$); ve
- (iii). Doğrunun düzleme ne dik ne de paralel olması ($\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \neq 0$ ve $\mathbf{v} \times \mathbf{n} \neq \mathbf{0}$).

Düzleme Dik Doğru ($\mathbf{v} \times \mathbf{n} = \mathbf{0}$)

Bu en kolay durum: Doğrunun düzleme izdüşümü sadece kesiştikleri noktaysa. See figure 16.4. Bu durumda

$$\text{proj}_{\text{düzlem}} L = \text{proj}_{\text{düzlem}} P.$$

Doğru Düzleme Paralelse ($\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0$)

From figure 16.5, we görülen

$$\text{proj}_{\text{düzlem}} L = \left(\begin{array}{l} \text{the line passing through the point} \\ \text{proj}_{\text{düzlem}} P \text{ in the direction } \mathbf{v}. \end{array} \right)$$

Doğru düzleme ne Paralel ne de dik ise

See figure 16.6. If $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \neq 0$, then the line must intersect the plane at some point B . Assuming $B \neq P$, we have

$$\text{proj}_{\text{düzlem}} L = \left(\begin{array}{l} \text{the line passing through the} \\ \text{points } B \text{ and } \text{proj}_{\text{düzlem}} P. \end{array} \right)$$

Example 16.4. Find the projection of the line $x = 7 + 6t$, $y = -3 + 15t$, $z = 10 - 12t$ onto the plane $2x + 5y - 4z = 13$.

solution:

Step 1. Find $\mathbf{v}$ and $\mathbf{n}$.

$$\mathbf{v} = 6\mathbf{i} + 15\mathbf{j} - 12\mathbf{k}$$

$$\mathbf{n} = 2\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$$

Step 2. Does the line intersect the plane?

Since

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 12 + 75 + 48 = 135 \neq 0,$$

the answer is yes, the line does intersect the plane.

Step 3. Find the point of intersection.

We calculate that

$$\begin{aligned} 13 &= 2x + 5y - 4z \\ &= 2(7 + 6t) + 5(-3 + 15t) - 4(10 - 12t) \\ &= 14 + 12t - 15 + 75t - 40 + 48t \\ &= -41 + 135t \\ 54 &= 135t \\ 2 &= 5t \\ \frac{2}{5} &= t. \end{aligned}$$

Hence the point of intersection is

$$\begin{aligned} B(x, y, z)|_{t=\frac{2}{5}} &= B(7 + 6t, -3 + 15t, 10 - 12t)|_{t=\frac{2}{5}} \\ &= B(9.4, 3, 5.2) \end{aligned}$$

Step 4. Is the line orthogonal to the plane?

Since

$$\mathbf{v} \times \mathbf{n} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 6 & 15 & -12 \\ 2 & 5 & -4 \end{vmatrix} = 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k} = \mathbf{0},$$

the answer is yes, the line is orthogonal to the plane.

Örnek 16.4. $x = 7 + 6t$, $y = -3 + 15t$, $z = 10 - 12t$ doğrusunun $2x + 5y - 4z = 13$ düzlemi üzerine izdüşümünü bulunuz.

çözüm:

Adım 1. $\mathbf{v}$ ve $\mathbf{n}$ 'yi bulunuz.

$$\mathbf{v} = 6\mathbf{i} + 15\mathbf{j} - 12\mathbf{k}$$

$$\mathbf{n} = 2\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$$

Adım 2. Doğru düzlemi keser mi?

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 12 + 75 + 48 = 135 \neq 0,$$

olduğundan yanıtımız evet, doğru düzlemle kesişir.

Adım 3. Kesim noktasını bulunuz.

Şunu hesaplırsak

$$\begin{aligned} 13 &= 2x + 5y - 4z \\ &= 2(7 + 6t) + 5(-3 + 15t) - 4(10 - 12t) \\ &= 14 + 12t - 15 + 75t - 40 + 48t \\ &= -41 + 135t \\ 54 &= 135t \\ 2 &= 5t \\ \frac{2}{5} &= t. \end{aligned}$$

Kesişim noktası

$$\begin{aligned} B(x, y, z)|_{t=\frac{2}{5}} &= B(7 + 6t, -3 + 15t, 10 - 12t)|_{t=\frac{2}{5}} \\ &= B(9.4, 3, 5.2) \end{aligned}$$

olarak bulunur.

Adım 4. Doğru düzleme dik midir?

Burada

$$\mathbf{v} \times \mathbf{n} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 6 & 15 & -12 \\ 2 & 5 & -4 \end{vmatrix} = 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k} = \mathbf{0},$$


olduğundan sorunun yanıtı olumlu olup, doğru düzleme dik olur.

Adım 5. Bulunuz ki $\text{proj}_{\text{düzlem}} L$.

Dorunun düzleme izdüşümü bir nokta olup ve

$$\text{proj}_{\text{düzlem}} L = B(9.4, 3, 5.2).$$

noktası olarak karşımıza çıkar.



Step 5. Find $\text{proj}_{\text{plane}} L$.

The projection of the line on the plane is the point

$$\text{proj}_{\text{plane}} L = B(9.4, 3, 5.2).$$

Example 16.5. Find the projection of the line $x = 1 + 4t$, $y = 2 + 4t$, $z = 3 + 4t$ onto the plane $3x + 4y - 7z = 27$.

solution:

Step 1. Find $\mathbf{v}$ and $\mathbf{n}$.

$$\mathbf{v} = 4\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$$


$$\mathbf{n} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 7\mathbf{k}$$

Step 2. Does the line intersect the plane?

Since

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 12 + 16 - 28 = 0,$$

the line does not intersect the plane. Therefore the line is parallel to the plane.



Step 3. Find a point on $\text{proj}_{\text{plane}} L$.

$P(1, 2, 3)$ lies on the original line and $Q(9, 0, 0)$ lies on the plane. So

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PQ} &= Q - P = (9, 0, 0) - (1, 2, 3) = (8, -2, -3) \\ &= 8\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k} \end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{PQ} &= \left(\frac{\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2} \right) \mathbf{n} = \left(\frac{24 - 8 + 21}{9 + 16 + 49} \right) \mathbf{n} \\ &= \left(\frac{37}{74} \right) \mathbf{n} = \frac{1}{2} \mathbf{n}. \end{aligned}$$

Therefore

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\text{plane}} P &= P + \text{proj}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{PQ} \\ &= (1, 2, 3) + \left(\frac{3}{2}, 2, -\frac{7}{2} \right) \\ &= \left(\frac{5}{2}, 4, -\frac{1}{2} \right). \end{aligned}$$

Örnek 16.5. $x = 1 + 4t$, $y = 2 + 4t$, $z = 3 + 4t$ doğrusunun $3x + 4y - 7z = 27$ düzlemine izdüşümünü bulunuz.

çözüm:

Adım 1. $\mathbf{v}$ ve $\mathbf{n}$ 'yi bulunuz.

$$\mathbf{v} = 4\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$$

$$\mathbf{n} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 7\mathbf{k}$$

Adım 2. Doğru düzlemle kesişir mi?

Şimdi

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 12 + 16 - 28 = 0,$$

yani doğru düzlemle kesişmiyor. Yani doğru düzleme paraleldir.

Adım 3. Bir nokta bulunuz ki $\text{proj}_{\text{düzlem}} L$ olsun.

$P(1, 2, 3)$ noktası doğru üzerindedir ve $Q(9, 0, 0)$ noktası da düzlem üzerindedir. Yani

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PQ} &= Q - P = (9, 0, 0) - (1, 2, 3) = (8, -2, -3) \\ &= 8\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k} \end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{PQ} &= \left(\frac{\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2} \right) \mathbf{n} = \left(\frac{24 - 8 + 21}{9 + 16 + 49} \right) \mathbf{n} \\ &= \left(\frac{37}{74} \right) \mathbf{n} = \frac{1}{2} \mathbf{n}. \end{aligned}$$

Dolayısıyla

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\text{düzlem}} P &= P + \text{proj}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{PQ} \\ &= (1, 2, 3) + \left(\frac{3}{2}, 2, -\frac{7}{2} \right) \\ &= \left(\frac{5}{2}, 4, -\frac{1}{2} \right). \end{aligned}$$

Hızlı bir şekilde iki kez kontrol etmeliyiz $\text{proj}_{\text{düzlem}} P$ gerçekten de düzlem üzerindedir:

$$\begin{aligned} 3x + 4y - 7z &= 3 \left(\frac{5}{2} \right) + 4(4) - 7 \left(-\frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{15}{2} + 16 + \frac{7}{2} = 27. \quad \checkmark \end{aligned}$$

Adım 4. Bulunuz ki $\text{proj}_{\text{düzlem}} L$.

Verilen doğrunun verilen düzleme izdüşümünün geçtiği nokta $\text{proj}_{\text{düzlem}} P = \left(\frac{5}{2}, 4, -\frac{1}{2} \right)$ ve paralel olduğu yön $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, şu denklemlerle parametrize edilir

$$x = \frac{5}{2} + 4t, \quad y = 4 + 4t, \quad z = -\frac{1}{2} + 4t.$$

We should quickly double check that our $\text{proj}_{\text{plane}} P$ really is on the plane:

$$\begin{aligned} 3x + 4y - 7z &= 3\left(\frac{5}{2}\right) + 4(4) - 7\left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{15}{2} + 16 + \frac{7}{2} = 27. \quad \checkmark \end{aligned}$$

Step 4. Find $\text{proj}_{\text{plane}} L$.

The projection of the original line on the plane is the line passing through the point $\text{proj}_{\text{plane}} P = \left(\frac{5}{2}, 4, -\frac{1}{2}\right)$ in the direction $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, which has parametrised equations

$$x = \frac{5}{2} + 4t, \quad y = 4 + 4t, \quad z = -\frac{1}{2} + 4t.$$

Example 16.6. Find the projection of the line $x = 15 + 15t$, $y = -12 - 15t$, $z = 17 + 11t$ onto the plane $13x - 9y + 16z = 69$.

solution:

Step 1. Find $\mathbf{v}$ and $\mathbf{n}$.

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= 15\mathbf{i} - 15\mathbf{j} + 11\mathbf{k} \\ \mathbf{n} &= 13\mathbf{i} - 9\mathbf{j} + 16\mathbf{k} \end{aligned}$$

Step 2. Does the line intersect the plane?

Since

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 506 \neq 0,$$

the line intersects the plane.

Step 3. Find the point of intersection.

We calculate that

$$\begin{aligned} 69 &= 13x - 9y + 16z \\ &= 13(15 + 15t) - 9(-12 - 15t) + 16(17 + 11t) \\ &= 195 + 195t + 108 + 135t + 272 + 176t \\ &= 575 + 506t \\ -506 &= 506t \\ -1 &= t. \end{aligned}$$

Thus the line intersects the plane at

$$\begin{aligned} B(x, y, z)|_{t=-1} &= B(15 + 15t, -12 - 15t, 17 + 11t)|_{t=-1} \\ &= B(0, 3, 6). \end{aligned}$$

Step 4. Is the line orthogonal to the plane?

Since

$$\mathbf{v} \times \mathbf{n} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 15 & -15 & 11 \\ 13 & -9 & 16 \end{vmatrix} = -141\mathbf{i} - 97\mathbf{j} + 60\mathbf{k} \neq \mathbf{0},$$

the line is not orthogonal to the plane.

Örnek 16.6. $x = 15 + 15t$, $y = -12 - 15t$, $z = 17 + 11t$ doğrusunun $13x - 9y + 16z = 69$ düzlemine izdüşümünü bulunuz.

çözüm:

Adım 1. $\mathbf{v}$ ve $\mathbf{n}$ bulunur.

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= 15\mathbf{i} - 15\mathbf{j} + 11\mathbf{k} \\ \mathbf{n} &= 13\mathbf{i} - 9\mathbf{j} + 16\mathbf{k} \end{aligned}$$

Adım 2. Doğru düzlemle kesişir mi?

Aynı şekilde

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 506 \neq 0,$$

olduğundan doğru düzlemle kesişir.

Adım 3. Kesişim noktalarını bulalım.

Öncelikle

$$\begin{aligned} 69 &= 13x - 9y + 16z \\ &= 13(15 + 15t) - 9(-12 - 15t) + 16(17 + 11t) \\ &= 195 + 195t + 108 + 135t + 272 + 176t \\ &= 575 + 506t \\ -506 &= 506t \\ -1 &= t. \end{aligned}$$

Böylece doğrunun düzlemle kesiştiği nokta

$$\begin{aligned} B(x, y, z)|_{t=-1} &= B(15 + 15t, -12 - 15t, 17 + 11t)|_{t=-1} \\ &= B(0, 3, 6). \end{aligned}$$

Adım 4. Doğru düzleme dik midir?

$$\mathbf{v} \times \mathbf{n} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 15 & -15 & 11 \\ 13 & -9 & 16 \end{vmatrix} = -141\mathbf{i} - 97\mathbf{j} + 60\mathbf{k} \neq \mathbf{0},$$

olduğundan verilen doğru düzleme dik değildir.

Adım 5. Bir başka nokta bulunuz ki $\text{proj}_{\text{düzlem}} L$.

$P(15, -12, 17)$ noktası verilen doğru üzerinde olur. $\overrightarrow{PB} = (-15, 15, -11)$ ve

$$\text{proj}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{PB} = \left(\frac{\overrightarrow{PB} \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2} \right) \mathbf{n} = \left(\frac{-506}{506} \right) \mathbf{n} = -\mathbf{n}$$

olduğu için

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\text{düzlem}} P &= P + \text{proj}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{PB} \\ &= (15, -12, 17) + (-13, 9, -16) = (2, -3, 1). \end{aligned}$$


Adım 6. $\text{proj}_{\text{düzlem}} L$ bulunuz.

Burada

$$\mathbf{v}_2 = B \text{ den } \text{proj}_{\text{düzlem}} P \text{ bir vektör} = 2\mathbf{i} - 6\mathbf{j} - 5\mathbf{k}.$$

O zaman $\text{proj}_{\text{düzlem}} L$ doğrusu $B(0, 3, 6)$ noktasından geçer ve yönü de $\mathbf{v}_2 = 2\mathbf{i} - 6\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$ paralel olup parametrik denklemleri de şunlardır:

$$x = 2t, \quad y = 3 - 6t, \quad z = 6 - 5t.$$



Step 5. Find another point on $\text{proj}_{\text{plane}} L$.

The point $P(15, -12, 17)$ lies on the original line. Since $\overrightarrow{PB} = (-15, 15, -11)$ and

$$\text{proj}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{PB} = \left(\frac{\overrightarrow{PB} \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2} \right) \mathbf{n} = \left(\frac{-506}{506} \right) \mathbf{n} = -\mathbf{n}$$

we have that

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\text{plane}} P &= P + \text{proj}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{PB} \\ &= (15, -12, 17) + (-13, 9, -16) = (2, -3, 1). \end{aligned}$$

Step 6. Find $\text{proj}_{\text{plane}} L$.

Let

$\mathbf{v}_2$ = the vector from B to $\text{proj}_{\text{plane}} P = 2\mathbf{i} - 6\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$.

Then $\text{proj}_{\text{plane}} L$ is the line passing through $B(0, 3, 6)$ in the direction $\mathbf{v}_2 = 2\mathbf{i} - 6\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$ which has parametrised equations

$$x = 2t, \quad y = 3 - 6t, \quad z = 6 - 5t.$$

Problems

Problem 16.1.

- Find the projection of the vector $\mathbf{u} = -2\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$ onto the line $x = 2 + t$, $y = 1 - 2t$, $z = 3 + 2t$.
- Find the projection of the vector $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ onto the line $x = 20 + 3t$, $y = 1 + 4t$, $z = -10 + 5t$.
- Find the projection of the vector $\mathbf{u} = \mathbf{i} - \mathbf{k}$ onto the line $x = 1 - t$, $y = 1 + t$, $z = 1 + t$.

Problem 16.2.

- Find the projection of the vector $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 7\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$ onto the plane $6x + 4z = 100$.
- Find the projection of the vector $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ onto the plane $3x + 2y + z = -7$.
- Find the projection of the vector $\mathbf{u} = \mathbf{i}$ onto the plane $7y + 4z = 13$.

Problem 16.3.

- Find the projection of the point $P(38, -59, 4)$ onto the plane $10x - 20y + z = 61$.
- Find the projection of the point $P(13, 13, 13)$ onto the plane $2x - 3y + 5z = 5$.
- Find the projection of the point $P(65, 70, -4)$ onto the plane $9x + 10y - z = 15$.

Problem 16.4.

- Find the projection of the line $x = -48 - t$, $y = 6 + t$, $z = -13 + 4t$ onto the plane $7x - y + 2z = 10$.
- Find the projection of the line $x = 2 + 30t$, $y = 29 - 130t$, $z = \frac{104}{5} - 114t$ onto the plane $7y + 5z = 11$.
- Find the projection of the line $x = -t$, $y = 14 + t$, $z = -\frac{23}{4} - t$ onto the plane $8x - 8y + 8z = 10$.

Problem 16.5. Find a formula for the projection of a point P onto a line L .

Sorular

Soru 16.1.

- Find the projection of the vector $\mathbf{u} = -2\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$ onto the line $x = 2 + t$, $y = 1 - 2t$, $z = 3 + 2t$.
- Find the projection of the vector $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ onto the line $x = 20 + 3t$, $y = 1 + 4t$, $z = -10 + 5t$.
- Find the projection of the vector $\mathbf{u} = \mathbf{i} - \mathbf{k}$ onto the line $x = 1 - t$, $y = 1 + t$, $z = 1 + t$.

Soru 16.2.

- Find the projection of the vector $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 7\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$ onto the plane $6x + 4z = 100$.
- Find the projection of the vector $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ onto the plane $3x + 2y + z = -7$.
- Find the projection of the vector $\mathbf{u} = \mathbf{i}$ onto the plane $7y + 4z = 13$.

Soru 16.3.

- Find the projection of the point $P(38, -59, 4)$ onto the plane $10x - 20y + z = 61$.
- Find the projection of the point $P(13, 13, 13)$ onto the plane $2x - 3y + 5z = 5$.
- Find the projection of the point $P(65, 70, -4)$ onto the plane $9x + 10y - z = 15$.

Soru 16.4.

- Find the projection of the line $x = -48 - t$, $y = 6 + t$, $z = -13 + 4t$ onto the plane $7x - y + 2z = 10$.
- Find the projection of the line $x = 2 + 30t$, $y = 29 - 130t$, $z = \frac{104}{5} - 114t$ onto the plane $7y + 5z = 11$.
- Find the projection of the line $x = -t$, $y = 14 + t$, $z = -\frac{23}{4} - t$ onto the plane $8x - 8y + 8z = 10$.

Soru 16.5. Find a formula for the projection of a point P onto a line L .

Part III

Finite Mathematics

17

Combinatorics : Basic Counting Principles

The Addition Principle

Theorem 17.1. For any two sets A and B ,

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

where $n(A)$ denotes the number of elements in set A .

Example 17.1.

$$A = \{1, 2, 3\} \quad n(A) = 3$$

$$B = \{2, 3, 4\} \quad n(B) = 3$$

$$A \cap B = \{2, 3\} \quad n(A \cap B) = 2$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 3 + 3 - 2 = 4.$$

Example 17.2. Ali has three yellow shirts and two blue shirts. How many shirts does Ali have?

solution: Ali has $3 + 2 = 5$ shirts. If we let S denote the set of Ali's yellow shirts, and M denote the set of Ali's blue shirts, then we have

$$n(S \cup M) = n(S) + n(M) - n(S \cap M) = 3 + 2 - 0 = 5,$$

since S and M are discrete sets.




Figure 17.1: Ali's yellow and blue shirts.

Şekil 17.1: Ali'nin sarı ve mavi gömlekleri.

Kombinatorik : Temel Sayma Prensipleri

Toplam Prensibi

Teorem 17.1. A ve B herhangi iki küme olsun. $n(A)$ A elemanının sayısını belirtmek üzere

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

dir.

Örnek 17.1. Ali'nin 3 sarı, iki de mavi gömleği vardır. Ali gömleklerini kaç farklı şekilde giyinir?

çözüm: Ali, gömleklerini $3 + 2 = 5$ farklı şekilde giyinir. Sarı gömlekleri S , mavi gömlekleri M kümesi ile gösterirsek;

$$n(S \cup M) = n(S) + n(M) = 3 + 2 = 5$$

elde edilir.

Burada S ve M kümelerinin ayrık olduğuna dikkatinizi çekmek isterim.




Figure 17.2: Mathematics and Physics students.

Şekil 17.2: Matematik ve Fizik eğitimi alan öğrenciler.

Örnek 17.2. Bir okulda matematik dersine kayıtlı 8, fizik dersine kayıtlı 12, kimya ve her iki derse de kayıtlı 5 öğrenci bulunmaktadır. Bu okulda matematik veya fizik dersine kayıtlı öğrenci sayısı kaçtır?

Example 17.3. In a college, there are 8 students studying Mathematics, 12 students studying Physics, and 5 students enrolled in a joint Chemistry-Physics-Mathematics program. How many students are studying either Mathematics or Physics?

solution: Let M and F denote the sets of students studying Mathematics and Physics respectively. Then $M \cap F$ will be the set of students who are studying both Mathematics and Physics. The answer is

$$n(M \cup F) = n(M) + n(F) - n(M \cap F) = 8 + 12 - 5 = 15.$$

çözüm: Matematik dersini alan öğrencilerin kümesini M , fizik dersini alanları ise F ile gösterirsek hem matematik hem fizik dersini alan öğrenciler $M \cap F$ ile gösterilir. Sorunun yanıtı ise;

$$n(M \cup F) = n(M) + n(F) - n(M \cap F) = 8 + 12 - 5 = 15$$

dir.




Figure 17.3: Roads linking four cities.

Şekil 17.3:

The Multiplication Principle

Theorem 17.2. If operation O_1 can be done n ways, and operation O_2 can be done m ways, then there are

$$n \cdot m$$

possible ways to do O_1 followed by O_2 .

Example 17.4. A man has five different shirts, three different ties and two different pairs of trousers. How many different ways can this person wear a shirt, a tie and a pair of trousers combination?

solution: Once the person has chosen a pair of trousers, he has a choice of 5 different shirts. For each shirt there are 3 different ties. Therefore he has $2 \cdot 5 \cdot 3 = 30$ choices of outfit.

Example 17.5. Four cities, called Aberdeen (A), Birmingham (B), Coventry (C) and Derby (D), are joined by roads as shown in figure 17.3. By how many different routes can a vehicle travel from A to D, without going back on itself.

solution: A vehicle that wants to travel from A to D must pass through either B or C.

If it passes through B, it can travel from A to B in 4 different ways, then from B to D in only one way – thus it can arrive at D along $4 \cdot 1 = 4$ different routes.

Çarpma Prensibi

Teorem 17.2. O_1 işlemi n yoldan, O_2 işlemi m yoldan yapılabiliyorsa, $O_1 O_2$ işlemlerinin ardışık olarak yapılması ile $n \cdot m$ sonuç ortaya çıkar.

Örnek 17.3. Bir adamın 5 farklı gömleği, 3 farklı kravatı, 2 farklı pantolonu olsun. Bu kişi gömlek-kravat-pantolon kombinini kaç farklı şekilde giyinebilir?

çözüm: Kişinin bir pantolon seçtikten sonra o pantolon için 5 farklı gömlek seçimi vardır. Her gömlek için ise 3 farklı kravat seçimi olur. Bunu matematiksek olarak ifade edecek olursak, $2 \cdot 5 \cdot 3 = 30$ farklı şekilde giyinir.

Örnek 17.4. Antalya (A), Bursa (B), Ceyhan (C) ve Denizli (D) kentlerini bağlayan yollar yukarıdaki şekildeki gibi olsun: A noktasından çıkıp D noktasına gitmek isteyen bir araç gittiği yolu geri dönmek üzere kaç farklı yoldan gidebilir?

çözüm: A dan D ye gitmek isteyen biri B yada C den geçmek zorundadır.

B üzerinden giderse A dan B ye 4 farklı şekilde B den D ye 1 tek yoldan gidebileceğinden en nihayetinde A dan D ye $4 \cdot 1 = 4$ farklı yoldan gidebilir.

C üzerinden giderse A dan C ye 2, C den D ye 3 farklı yol olduğundan A dan D ye $2 \cdot 3 = 6$ farklı yoldan gidebilir.

Sonuç olarak A dan D ye $4 + 6 = 10$ farklı yoldan gidebilir.

If the vehicle passes through C, it can travel from A to C in 2 different ways, then from C to D in 3 different ways – thus it can arrive at D along $2 \cdot 3 = 6$ different routes.

Hence the total number of different routes from A to D is $4 + 6 = 10$.

Example 17.6. How many divisors does 2800 have?

solution: Note first that

$$2800 = 2^4 \cdot 5^2 \cdot 7 = 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7.$$

To create a divisor of 2800, we can use between zero and four of the 2s (so there are 4+1 choices of how many 2s to use). We can also use zero, one or both of the 5s (2+1 choices) and we can either use or not use the 7 (1+1 choices). So there are

$$(4+1)(2+1)(1+1) = 30$$

divisors of 2800. In fact, the divisors of 2800 are: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 56, 70, 80, 100, 112, 140, 175, 200, 280, 350, 400, 560, 700, 1400 and 2800.

In general, suppose that $p_1, p_2, \dots, p_n$ are prime numbers and suppose that $x = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_n^{k_n}$. Then x has

$$(k_1 + 1)(k_2 + 1) \dots (k_n + 1)$$

divisors.

Problems

Problem 17.1 (A coin and a die). A coin is tossed with possible outcomes of heads (H) or tails (T). Then a die is rolled with possible outcomes of 1, 2, 3, 4, 5 or 6. How many different outcomes in total are there?

Problem 17.2 (Code words).

- How many 3-letter code words can be formed from the letters A,B,C,D,E if no letter is repeated?
- How many many 3-letter code words can be formed from the letters A,B,C,D,E if letters can be repeated?
- How many 3-letter code words can be formed from the letters A,B,C,D,E if adjacent letters must be different?

Problem 17.3 (Postcodes). The postcode for Okan University is 34959. Suppose that the first two digits of a postcode are between 01 (Adana) and 81 (Düzce), and the final three digits can be any number. How many different postcodes are possible? How many have no repeated digits?

Örnek 17.5. 2800 sayısının kaç böleni vardır?

çözüm: $2800 = 2^4 \cdot 5^2 \cdot 7$ olduğundan 2,2,2,2,5,5,7 çarpanlarından en az bir tane olmak üzere çarpanlar seçilip bunların çarpılması ile 2800 in bir böleni elde edilir. 1 sayısı her sayıyı bölebileceğinden 1 dışındaki farklı bölenlerin sayısı:

$$(4+1)(2+1)(1+1) - 1 = 29$$

dur.

Genel olarak bir $p_1 p_2 \dots p_n$ asal sayılar olmak üzere bir sayının çarpanlara ayrılışı $p_1^{k_1}, p_2^{k_2}, \dots, p_n^{k_n}$ ise bu sayının “1” dahil bölenlerinin sayısı:

$$(k_1 + 1)(k_2 + 1) \dots (k_n + 1)$$

ile bulunur.

Sorular

Soru 17.1 (A coin and a die). A coin is tossed with possible outcomes of heads (H) or tails (T). Then a die is rolled with possible outcomes of 1, 2, 3, 4, 5 or 6. How many different outcomes in total are there?

Soru 17.2 (Code words).

- How many 3-letter code words can be formed from the letters A,B,C,D,E if no letter is repeated?
- How many many 3-letter code words can be formed from the letters A,B,C,D,E if letters can be repeated?
- How many 3-letter code words can be formed from the letters A,B,C,D,E if adjacent letters must be different?

Soru 17.3 (Postcodes). The postcode for Okan University is 34959. Suppose that the first two digits of a postcode are between 01 (Adana) and 81 (Düzce), and the final three digits can be any number. How many different postcodes are possible? How many have no repeated digits?

18

Combinatorics : Permutations and Combinations

Factorials

Definition. The product of the first n natural numbers is called n *factorial* and denoted by $n!$.

We also define the *zero factorial*, $0!$ to be equal to 1.

$$n! = n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

$$0! = 1$$

$$n! = n \cdot (n-1)!$$

Example 18.1.

(a) $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$

(b) $\frac{7!}{5!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{5!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot \cancel{5!}}{\cancel{5!}} = 42$

(c) $\frac{52!}{5!47!} = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48 \cdot \cancel{47!}}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \cancel{47!}} = 2\,598\,960$

Remark. Note that $n!$ grows very rapidly:

$$5! = 120$$

$$10! = 3\,628\,800$$

$$15! = 1\,307\,674\,368\,000$$

Permutations

Example 18.2. Imagine that you have four pictures to arrange on a wall. See figure 18.1 on page 93. How many different ways are there to arrange them?

solution: There are four ways to select the first picture. After we choose the first picture, we are left with three pictures to choose from. Then after we choose the second picture, we are

Kombinatorik : Permütasyon ve Kombinasyonlar

Faktöriyel

Tanım. n bir doğal sayı olmak üzere 1 den n e kadar olan doğal sayıların çarpımı $n!$ ile gösterilir.

Sıfır faktöriyel 1 kabul edilir.

Tanımdan aşağıdaki eşitlikler kolaylıkla elde edilebilir:

$$n! = n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

$$0! = 1$$

$$n! = n \cdot (n-1)!$$

Örnek 18.1.

(a) $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$

(b) $\frac{7!}{5!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{5!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot \cancel{5!}}{\cancel{5!}} = 42$

(c) $\frac{52!}{5!47!} = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48 \cdot \cancel{47!}}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \cancel{47!}} = 2\,598\,960$

Not. $n!$ 'nin ne kadar hızlı büyüdüğüne dikkat ediniz:

$$5! = 120$$

$$10! = 3\,628\,800$$

$$15! = 1\,307\,674\,368\,000$$

Permütasyon

Örnek 18.2. Imagine that you have four pictures to arrange on a wall. See figure 18.1 on page 93. How many different ways are there to arrange them?

çözüm: There are four ways to select the first picture. After we choose the first picture, we are left with three pictures to choose from. Then after we choose the second picture, we are




Figure 18.1: How many ways are there to arrange four (distinct) pictures on a wall?
 Şekil 18.1:



Figure 18.2: How many ways are there to select and arrange two pictures taken from a total of four pictures?
Şekil 18.2:

left with two pictures. And so on. So there are

$$4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4! = 24$$

different ways to hang our pictures.

Definition. A *permutation* of a set of distinct objects is an arrangement of the objects in a specific order without repetition.

The number of permutations of n distinct objects (without repetition) is denoted by ${}_nP_n$ or by $P(n, n)$.

Theorem 18.1.

$${}_nP_n = n!$$

Example 18.3. Now suppose that from your four pictures, you decide to only hang two on your wall. How many ways are there to hang two out of four pictures?

solution: There are four choices for the first picture, then three for the second picture. Please see figure 18.3 on page 96. So there are

$$4 \cdot 3 = 12$$

ways to hang two out of the four pictures.

How can we write this in terms of $n!$? Note that

$$12 = 4 \cdot 3 = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1} = \frac{4!}{2!}.$$

Definition. A permutation of a set of n distinct objects taken r at a time (without repetition) is an arrangement of r of the n objects in a specific order. The numbers of such permutations is denoted by ${}_nP_r$ or by $P(n, r)$.

For example, suppose that we have three objects (labeled a , b and c) and suppose that we take r of the objects. The possible permutations are shown below:

$n = 3$		
$r = 1$	$r = 2$	$r = 3$
a	ab	abc
b	ac	acb
c	ba	bac
	bc	bca
	ca	cab
	cb	cba
${}_3P_1 = P(3, 1) = 3$	${}_3P_2 = P(3, 2) = 6$	${}_3P_3 = P(3, 3) = 6$

left with two pictures. And so on. So there are

$$4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4! = 24$$

different ways to hang our pictures.

Tanım. A *permutation* of a set of distinct objects is an arrangement of the objects in a specific order without repetition.

The number of permutations of n distinct objects (without repetition) is denoted by ${}_nP_n$ or by $P(n, n)$.

Teorem 18.1.

$$P(n, n) = n!$$

Örnek 18.3. Now suppose that from your four pictures, you decide to only hang two on your wall. How many ways are there to hang two out of four pictures?

çözüm: There are four choices for the first picture, then three for the second picture. Please see figure 18.3 on page 96. So there are

$$4 \cdot 3 = 12$$

ways to hang two out of the four pictures.

How can we write this in terms of $n!$? Note that

$$12 = 4 \cdot 3 = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1} = \frac{4!}{2!}.$$

Tanım. n tane farklı nesnenin r tanesinin tüm dizilişlerinin sayısına n nin r li permütasyonu denir ve $P(n, r)$ ile gösterilir.

Örneğin; $n = 3$ alırsak ve nesneler a, b, c olursa dizilimler r ye bağlı olarak aşağıdaki gibidir:

Theorem 18.2. The number of permutations of n distinct objects taken r at a time (without repetition) is

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (1 \leq r \leq n)$$

Example 18.4. Find the number of permutations of 16 objects taken 3 at a time.

solution: Using the formula, we calculate that:

$${}_{16}P_3 = \frac{16!}{(16-3)!} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot \cancel{13!}}{\cancel{13!}} = 16 \cdot 15 \cdot 14 = 3360.$$

Combinations

Example 18.5. To enter the Turkish national lottery (Sayısal Loto 6/49) you must select six numbers from a choice of 49 numbers.

How many different ways are there of choosing 6 objects from 49 objects?



Figure 18.3: Entering the Turkish national lottery, Sayısal Loto 6/49.

Şekil 18.3:

The answer is not ${}_{49}P_6$ because the order of the numbers does not matter: For example

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline 28 & 16 & 9 & 7 & 35 & 47 \\ \hline \end{array}$$

is the same as

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline 7 & 9 & 16 & 28 & 35 & 47 \\ \hline \end{array}.$$

Definition. A **combination** of a set of n distinct objects taken r at a time (without repetition) is an r -element subset of the set of n objects. The arrangement of the elements in the subset does not matter. We denote the number of combinations by

$${}_nC_r \quad \text{or} \quad \binom{n}{r} \quad \text{or} \quad C(n, r).$$

Teorem 18.2. n elemanlı bir kümenin r elemanlı permütasyonları

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (1 \leq r \leq n)$$

formülü ile bulunur.

Örnek 18.4. Lütfen Example 18.4'ye bakınız.

Örnek 18.5. 17 elemanlı bir kümenin 15 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?

çözüm: Formülü kullanırsak:

$$P(17, 15) = \frac{17!}{(17-15)!} = \frac{17!}{2!} = 177\,843\,714\,048\,000.$$

Kombinasyon

Örnek 18.6. Sayısal loto oynamak için 49 sayı içinden altı sayı seçmelisiniz.

Bu 49 sayıdan 6 farklı sayıyı seçerek kaç farklı loto oynanabilir?



Figure 18.4: A draw of the Turkish national lottery, Sayısal Loto 6/49.

Şekil 18.4:

Cevap $P(49, 6)$ değildir. çünkü bu oyund dizilişin sırasının bir önemi yoktur: Örneğin;

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline 28 & 16 & 9 & 7 & 35 & 47 \\ \hline \end{array}$$

seçimi

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline 7 & 9 & 16 & 28 & 35 & 47 \\ \hline \end{array}$$

seçimi ile aynıdır.

Tanım. n adet farklı nesnenin r tanesinin seçiminin sayısına n nin r li **kombinasyonu** denir ve $C(n, r)$ ile gösterilir. Kombinasyon hesabında sıralamanın bir önemi yoktur.

Önceki a, b, c örneğinde sıralamadan bağımsız olarak bu kümenin alt kümelerinin kaç farklı şekilde seçileceği sorulursa cevap aşağıdaki gibi olur:

For example, suppose again that we have three objects labeled a , b and c and suppose that we take r of these objects. The possible combinations are shown below:

$n = 3$		
$r = 1$	$r = 2$	$r = 3$
a	ab	abc
b	ac	
c	bc	
${}_3C_1 = \binom{3}{1} = C(3, 1) = 3$	${}_3C_2 = \binom{3}{2} = C(3, 2) = 3$	${}_3C_3 = \binom{3}{3} = C(3, 3) = 1$

Theorem 18.3. The number of combinations of n distinct objects taken r at a time (without repetition) is

$${}_nC_r = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!} \quad (1 \leq r \leq n)$$

Example 18.6. A collector has 20 different coins. How many different ways can 6 coins be selected?

solution:

$$\begin{aligned} {}_{20}C_6 &= \frac{20!}{(20-6)! \cdot 6!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot \cancel{14!}}{\cancel{14!} \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} \\ &= \frac{\cancel{20} \cdot 19 \cdot \cancel{18} \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15}{\cancel{6} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot 2} = \frac{19 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15}{2} \\ &= 38\,760. \end{aligned}$$

Example 18.7. We can now answer Example 18.5.

There are

$${}_{49}C_6 = \frac{49!}{(49-6)! \cdot 6!} = \frac{49!}{43! \cdot 6!} = 13\,983\,816$$

different ways to choose 6 numbers from a choice of 49 numbers.

Example 18.8. From a group of 9 people,

- In how many ways can a chairperson, a vice-chairperson and a secretary be elected, assuming that one person can not hold more than one position?
- In how many ways can we choose a committee of three people?

solution:

- The order of election is important in the election of a chairperson, a vice-chairperson and a secretary. There is a meaning to who is the chairperson and who is the secretary. If we start with the election of the chairperson, there are 9 different candidates for him. Since one person is missing from the group of people, 8 different candidates can stand for the vice-chairperson. Finally, there are 7 different candidates for the position of secretary. Therefore, this tripartite committee can be formed in $9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$ different ways. Or we can answer this problem with permutations:

$${}_9P_3 = \frac{9!}{(9-3)!} = 504.$$

Teorem 18.3. n elemanlı bir kümenin r elemanlı kombinasyonları

$$C(n, r) = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!} \quad (1 \leq r \leq n)$$

formülü ile bulunur.

Örnek 18.7. Bir koleksiyoncunun 20 farklı madeni parası var. Bunlar arasından 6 para kaç farklı şekilde seçilebilir?

çözüm:

$$\begin{aligned} C(20, 6) &= \frac{20!}{(20-6)! \cdot 6!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot \cancel{14!}}{\cancel{14!} \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} \\ &= \frac{\cancel{20} \cdot 19 \cdot \cancel{18} \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15}{\cancel{6} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot 2} = \frac{19 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15}{2} \\ &= 38\,760. \end{aligned}$$

Örnek 18.8. Şimdi Örnek 18.5 için yanıtımız şu şekildedir; 46 sayıdan 6 sayı için

$$C(49, 6) = \frac{49!}{(49-6)! \cdot 6!} = \frac{49!}{43! \cdot 6!} = 13\,983\,816$$

farklı yol vardır.

Örnek 18.9. 9 kişilik bir topluluktan

- Bir başkan bir başkan yardımcısı ve bir sekreter kaç farklı şekilde seçilebilir?
- 3 kişilik bir alt topluluk kaç farklı şekilde seçilir?

çözüm:

- Bir başkan bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçiminde seçim sırası önemlidir. Kimin başkan, kimin sekreter olduğunun bir anlamı vardır. Önce başkan seçiminden başlarsak onun için 9 farklı aday vardır. Topluluktan bir kişi ek-sildiğinden başkan yardımcısı için 8 farklı aday seçimi yapılabilir. Son olarak da sekreter için 7 farklı aday kalır. Dolayısıyla bu üçlü komite $9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$ farklı şekilde oluşturulabilir. Dolayısıyla bu hesabı permütasyon ile yaparız:

$$P(9, 3) = \frac{9!}{(9-3)!} = 504.$$

- (ii). In order to form a committee of 3 people, the order does not matter! So we use combinations:

$${}_9C_3 = \frac{9!}{(9-3)!3!} = 84.$$

Remark. Permutations and Combinations are similar in that repetition in selections are not permitted. However, there is one important difference between them:

- In a permutation, the order is important;
- In a combination, the order is irrelevant.

You need to understand when to use ${}_nP_r$ and when to use ${}_nC_r$.

Example 18.9. From a standard deck of 52 cards,

- How many 5-card hands have two kings and three aces?
- How many 5-card hands have two clubs and three hearts?
- How many 3-card hands have all cards from the same suit?



Figure 18.5: Two kings and three aces.
Şekil 18.5:

solution:

- We need to use the multiplication principle and combinations. We must select two kings from a total of four (that is ${}_4C_2$) and we must select three aces from a total of four (${}_4C_3$). Therefore, by the multiplication principle we have that

$$\begin{aligned} \text{number of hands} &= {}_4C_2 \cdot {}_4C_3 \\ &= \frac{4!}{(4-2)! \cdot 2!} \cdot \frac{4!}{(4-3)! \cdot 3!} \\ &= 6 \cdot 4 = 24. \end{aligned}$$

- There are ${}_{13}C_2 \cdot {}_{13}C_3 = \frac{13!}{11! \cdot 2!} \cdot \frac{13!}{10! \cdot 3!} = 78 \cdot 208 = 22\,308$ hands with two clubs and three hearts.

- There are 13 cards in each suit, so the number of 3-card hands having all hearts, say, is

$${}_{13}C_3 = \frac{13!}{(13-3)! \cdot 3!} = \frac{13!}{10! \cdot 3!} = 286.$$

- 3 kişilik bir alt topluluğun oluşturulmasında ise sıranın bir önemi yoktur! Dolayısıyla bu hesabı kombinasyon ile yaparız:

$$C(9, 3) = \frac{9!}{(9-3)!3!} = 84.$$

Not. Permütasyonlar ve Kombinasyonlar, seçimlerde tekrara izin verilmediği zaman benzerdir. Ancak aralarında önemli bir fark vardır:

- Bir permütasyonda, sıra önemlidir;
- Bir kombinasyonda, sıra önemli değildir.

Sizin yapmanız gereken tek şey ne zaman $P(n, r)$ ve ne zaman $C(n, r)$ kullanmanız gerektiğini bilmenizdir.

Örnek 18.10. Standart 52 kartlık bir desteden,

- Çekilen 5 kartın kaç tanesinde iki papaz, üç as bulunur?
- Çekilen 5 kartın kaç tanesinde iki sinek, üç kupa bulunur?
- Çekilen 3 kartın kaç tanesinin aynı takımından olur?



Figure 18.7: Two clubs and three hearts.
Şekil 18.7:

çözüm:

- Çarpma prensibini ve kombinasyonlarını kullanmamız gerekiyor. Toplam dört tane papazdan ikisini seçmeliyiz (yani $C(4, 2)$) ve dört papazdan üç as seçmeliyiz ($C(4, 3)$). Çarpım prensibi gereği;

$$\begin{aligned} \text{number of hands} &= C(4, 2) \cdot C(4, 3) \\ &= \frac{4!}{(4-2)! \cdot 2!} \cdot \frac{4!}{(4-3)! \cdot 3!} \\ &= 6 \cdot 4 = 24 \end{aligned}$$

elde ederiz.

- $C(13, 2) \cdot C(13, 3) = \frac{13!}{11! \cdot 2!} \cdot \frac{13!}{10! \cdot 3!} = 78 \cdot 208 = 22\,308$ bulunur.

Similarly, there are 286 hands having all clubs, 286 hands having all diamonds and 286 hands having all spades. Thus the number of hands having all cards from the same suit is

$$4 \cdot {}_{13}C_3 = 4 \cdot 286 = 1144.$$

Example 18.10. A bag contains 2 white and 3 red balls. In how many ways can 3 balls be chosen if at least one ball must be white?

solution: We can have either 1 white ball and 2 red balls, or 2 white balls and 1 red ball.

There are ${}_2C_1 \cdot {}_3C_2$ ways to get 1 white and 2 red. There are ${}_2C_2 \cdot {}_3C_1$ ways to get 2 white and 1 red. So the total number of ways is

$${}_2C_1 \cdot {}_3C_2 + {}_2C_2 \cdot {}_3C_1 = (2)(3) + (1)(3) = 9.$$

Example 18.11. You have 1 red ball, 1 blue ball, 1 green ball and 3 orange balls. The three orange balls are identical. How many visually different ways are there to arrange the balls in a line?

solution: If you had balls of six different colours, then this is easy: ${}_6P_6 = 6!$. However because you have 3 balls of the same colour, the correct answer will be less than this. For example, if we label the balls r, b, g, o_1, o_2 and o_3 then  then the same, but be counted twice.

We need to ask: How many different ways are there to rearrange the orange balls, $o_1 o_2 o_3$? There are ${}_3P_3 = 6$ different ways. This means that when we calculate ${}_6P_6$, we are counting each arrangement 6 times.

Therefore the answer to this problem is

$$\frac{{}_6P_6}{{}_3P_3} = 120.$$

Example 18.12. In how many different ways can the letters of the word 'MATHEMATICS' be arranged such that the vowels are consecutive?

solution: The word 'MATHEMATICS' has 11 letters including 4 vowels: 'A', 'E', 'A', 'I'. These 4 vowels must always be consecutive. Hence these 4 vowels can be grouped together and then thought of as a single object. In other words, we may assume that we have only 8 objects, MTHMTCS(AEAI).

Of these 8 objects, we have two 'M's, two 'T's, one 'H', one 'C', one 'S' and one '(AEAI)'. The number of ways to arrange these 8 objects is

$$\frac{{}_8P_8}{{}_2P_2 \cdot {}_2P_2} = \frac{8!}{2! \cdot 2!} = 10080.$$

Next we must ask how many ways the vowels 'AEAI' can be rearranged. The letter 'A' occurs twice and the other letters occur once. Hence there are

$$\frac{{}_4P_4}{{}_2P_2} = 12$$

ways to arrange the vowels.

(iii). Her takımında 13 kart bulunur. Bu nedenle tüm kupa kartları içinden üç kart

$$C(13, 3) = \frac{13!}{(13-3)! \cdot 3!} = \frac{13!}{10! \cdot 3!} = 286.$$

farklı şekilde seçilir. Benzer şekilde 286 sinek, 286 karo and 286 maça seçilir. Böylelikle aynı takımdan üç kart

$$4 \cdot C(13, 3) = 4 \cdot 286 = 1144$$

farklı şekilde oluşturulur.

Örnek 18.11. Bir torbada 2 beyaz ve 3 kırmızı top vardır. En az bir topun beyaz olması koşuluyla, 3 top kaç şekilde seçilebilir?



çözüm: Bu koşulda iki durum vardır: Ya 1 beyaz top ve 2 kırmızı top; ya da 2 beyaz top ve 1 kırmızı top olabilir.

1 beyaz top ve 2 kırmızı top için $C(2, 1) \cdot C(3, 2)$ yol; 2 beyaz top ve 1 kırmızı top için $C(2, 2) \cdot C(3, 1)$ farklı seçim vardır. Toplamda

$$C(2, 1) \cdot C(3, 2) + C(2, 2) \cdot C(3, 1) = (2)(3) + (1)(3) = 9$$

farklı seçim elde edilir.

Örnek 18.12. 1 kırmızı topunuz, 1 mavi topunuz, 1 yeşil topunuz ve 3 turuncu topunuz var. Üç turuncu top aynıdır. Topları bir sıraya yerleştirmenin görsel olarak kaç farklı yolu vardır?

çözüm: Altı farklı renkte topunuz olsaydı, bu kolaydı: $P(6, 6) = 6!$. Ancak, aynı renkte 3 topunuz olduğu için doğru cevap bundan biraz daha zor olacaktır. Örneğin, topları  şeklinde etiketlersek  aynı görünüşte olacak, fakat iki kez sayılmış olacaktır.

Turuncu topların  kendi içindeki diziliş sayısı, $P(3, 3) = 6$ dir. Bu da demek oluyor ki biz $P(6, 6)$ 'yı hesaplarken her bir dizilişi 6 kere sayıyoruz.

Bu yüzden yanıt;

$$\frac{P(6, 6)}{P(3, 3)} = 120$$

dir.

Örnek 18.13. Lütfen Example 18.13'ye bakınız.

Örnek 18.14. " MATEMATİK " kelimesinin harfleri, ünlüler ardışık olacak şekilde, kaç farklı şekilde dizilebilir?

çözüm: MATEMATİK kelimesi 4 ünlü olmak üzere 9 harften oluşur: 'A', 'E', 'A', 'İ'. Bu 4 ünlü her zaman ardışık olmalıdır. Dolayısıyla bu 4 sesli harf birlikte gruplanabilir ve sonra tek bir nesne olarak düşünülebilir. Yani sadece 6 nesnemiz olduğunu varsayabiliriz, MTMTK (AEAI).

Bu 6 nesneden iki 'M', iki 'T', bir 'K' ve bir '(AEAI)' var. Bu 6 nesneyi dizmenin yollarının sayısı

$$\frac{P(6, 6)}{P(2, 2) \cdot P(2, 2)} = \frac{6!}{2! \cdot 2!} = 180.$$

Multiplying these together, we get our answer: There are

$$10080 \cdot 12 = 120960$$

ways.

Example 18.13. Please see Örnek 18.13.



Figure 18.6: Does your calculator have nPr and nCr?
Şekil 18.6:

Dahası, AEAİ ünlülerinin kaç şekilde yeniden dizilebileceğini bulmalıyız. 'A' harfi iki kez, diğer harfler bir kez geçer. Dolayısıyla ünlüleri kendi içinde

$$\frac{P(4, 4)}{P(2, 2)} = 12$$

farklı şekilde dizebiliriz.

Bulduğumuz iki sayıyı çarparsak

$$180 \cdot 12 = 2160$$

sonucunu elde ederiz.



Figure 18.8: Try typing “7permute3” or “7choose3” into wolframalpha.com .
Şekil 18.8:

Problems

Problem 18.1 (Triangles in a Circle). Five distinct points are selected on the circumference of a circle. How many different triangles can be drawn using these points as vertices?

Problem 18.2 (Playing Cards). From a standard 52 card deck:

- How many 6-card hands consist entirely of red cards?
- How many 6-card hands consist entirely of hearts?
- How many 5-card hands consist entirely of face cards (kings, queens and jacks)?
- How many 5-card hands consist entirely of queens?
- How many 7-card hands contain four kings?
- How many 4-card hands contain a card from each suit?
- How many 3-card hands do not contain any hearts?
- How many 3-card hands contain at least one heart?

Problem 18.3 (Mobile Phone Shop). A mobile phone shop receives a delivery of 24 smartphones, but 5 of these phones are broken. Three of these smartphones will be selected for display in the shop window.

- How many selections can be made?
- How many of these selections will contain three working phones?

Problem 18.4 (Architecture and Mimarlık). In how many different ways can the letters of the word 'ARCHITECTURE' be arranged such that the vowels are consecutive? What about the word 'MİMARLIK'?

Problem 18.5 (Divisible by 5). How many 3 digit numbers can be formed from the digits 2, 3, 5, 6, 7 and 9 which are divisible by 5 and none of the digits is repeated?

Problem 18.6 (Serial Numbers). Serial numbers for a product are made using 2 letters followed by 3 numbers. If the letters are taken from $\{A, B, C, D, E, F, G, H\}$ with no repeats, and the numbers are taken from $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$ with no repeats, how many serial numbers are possible?

Sorular

Soru 18.1 (Triangles in a Circle). Bir dairenin çevresinde beş ayrı nokta seçilir. Bu noktalar köşeler olarak kullanılarak kaç farklı üçgen çizilebilir?

Soru 18.2 (Oyun kartları). Standart 52 kartlık bir iskambil destesinden:

- Kaç tane 6 kartlı el tamamen kırmızı kartlardan oluşur?
- Kaç tane 6 kartlı el tamamen kupalardan oluşur?
- Kaç tane 5 kartlı el tamamen resimli kartlardan oluşur (papaz, kız ve vale)?
- Kaç tane 5 kartlı el kızların hepsini içerir?
- Kaç tane 7 kartlı el dört papazın hepsini içerir?
- Kaç tane 4 kartlı el her takımdan bir kart içerir?
- Kaç tane 3 kartlı el hiç kupa içermez?
- Kaç tane 3 kartlı el en az bir kart içerir?

Soru 18.3 (Mobil Telefon Mağazası). Bir cep telefonu mağazası 24 adet akıllı telefon teslim alıyor ancak bu telefonlardan 5'i bozuk. Mağaza penceresinde görüntülenmek üzere bu akıllı telefonlardan üçü seçilecektir.

- Kaç tane seçim yapılabilir?
- Bu seçimlerden kaç tanesi üç çalışan telefon içerebilir?

Soru 18.4 (Architecture and Mimarlık). 'ARCHITECTURE' kelimesinin harfleri, ünlüler ardışık olacak şekilde kaç farklı şekilde dizilebilir? Peki ya 'MİMARLIK' kelimesi??

Soru 18.5 (5 ile bölünebilme). 2, 3, 5, 6, 7 ve 9 rakamlarından 5'e bölünebilen ve hiçbir rakam tekrarlanmayan kaç tane 3 rakamlı sayı oluşturulabilir?

Soru 18.6 (Serial Numbers). Bir ürünün serri numarası iki harf ve ardından üç sayı ile oluşturuluyor. Aynı rakam ve harfler tekrar edilmeksizin $\{A, B, C, D, E, F, G, H\}$ harfleri ve $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$ sayıları kullanılarak kaç tane seri numarası oluşturulabilir?

19

Introduction to Probability

Olasılığa Giriş




Figure 19.1: One die.
Şekil 19.1: Bir zar.

If you roll a single (standard six-sided) die, what are the possible outcomes?

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

This is called a **sample space**. Each of the numbers in S are called **simple events**.

Now suppose that we want to roll an even number: The subset

$$E = \{2, 4, 6\} \subseteq S$$

is called a **compound event**.

Definition. The set

$$S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

is called a **sample space** for some experiment iff,

- S contains all possible outcomes;
- one and only one of the outcomes in S must occur.

Definition. An **event** E is any subset of S (including the empty set $\emptyset$ and S itself). e_i is a **simple event**. $E = \{e_i\}$ is a **simple event** if E contains only one element. E is a **compound event** if E contains more than one element.




Figure 19.2: Two dice.
Şekil 19.2: İki zar.

Tek bir (standart altı taraflı) zar atarsanız, olası sonuçlar nelerdir?

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Bu, **örnek uzay** olarak isimlendirilir. S kümesindeki her bir eleman **basit olay** olarak adlandırılır.

Şimdi bir çift sayı döndürmek istediğimizi varsayalım. Alt küme;

$$E = \{2, 4, 6\} \subseteq S$$

bir **birleşik olay**dır.

Tanım.

$$S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

kümesi bir deneyin olası sonuçlarının kümesi olsun. Eğer, is called a **sample space** for some experiment iff,

- S kümesi tüm olası sonuçları içerirse;
- S 'nin bir ve yalnız bir çıktısı meydana gelmişse,

S 'ye **örnek uzay** denir.

Tanım. E kümesi, S 'nin ($\emptyset$ boş kümesini ve S 'yi içeren) bir alt kümesi olsun. E 'ye **olay** denir. e_i is a **simple event**. Eğer E , $E = \{e_i\}$ şeklinde tek elemandan oluşuyorsa **basit olay**, birden fazla elemandan oluşuyorsa **birleşik olay** adını alır.

1 horse	2 horses
1 woman	2 women
1 vertex	2 vertices
1 focus	2 foci
1 die	2 dice

		second die ikinci zar					
							
first die birinci zar		(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
		(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
		(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
		(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
		(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
		(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

Table 19.1: Possible outcomes from rolling two dice.

Şekil 19.2: k

Example 19.1 (Two Dice). Next suppose that you are rolling two standard six-sided dice. Please see Table 19.1. The sample space is

$$S = \{(a, b) \mid a, b \in \{1, 2, \dots, 6\}\}.$$

What is the event which corresponds to:

- (i). A total score of 7.
- (ii). A total score of 3.
- (iii). A total score greater than 10.
- (iv). A total score of 2.

solution:

- (i). $E = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}.$
- (ii). $E = \{(1, 2), (2, 1)\}.$
- (iii). $E = \{(5, 6), (6, 5), (6, 6)\}.$
- (iv). $E = \{(1, 1)\}.$

Örnek 19.1 (Two Dice). Varsayalım ki standart altı-yönlü iki zar atıyoruz. Lütfen tabloya bakınız: 19.1. Örnek uzay:

$$S = \{(a, b) \mid a, b \in \{1, 2, \dots, 6\}\}.$$

Aşağıdaki olaylar nelerdir:

- (i). Toplam puanın 7 olması.
- (ii). Toplam puanın 3 olması.
- (iii). Toplam puanın 10 dan büyük olması.
- (iv). Toplam puanın 2 olması.

çözüm:

- (i). $E = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}.$
- (ii). $E = \{(1, 2), (2, 1)\}.$
- (iii). $E = \{(5, 6), (6, 5), (6, 6)\}.$
- (iv). $E = \{(1, 1)\}.$

The Probability of an Event

Definition. Let

$$S = \{e_1, e_2, e_3, \dots, e_n\}$$

be a sample space with n simple events. The **probability of event** e_i is a real number denoted by $P(e_i)$. We must have

- (i). $P(e_i) \in [0, 1]$ for all i ; and
- (ii). $P(e_1) + P(e_2) + P(e_3) + \dots + P(e_n) = 1$.

Example 19.2 (A Single Coin). Suppose that we are flipping a single coin. Then $S = \{H, T\}$. We can assume that

$$P(H) = \frac{1}{2} \quad \text{and} \quad P(T) = \frac{1}{2}.$$

Note that

- (i). $0 \leq P(H) \leq 1$ and $0 \leq P(T) \leq 1$; and
- (ii). $P(H) + P(T) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.

If we flip this coin 1000 times, we would expect to get H roughly (but not exactly) 500 times.

Definition. The **probability of an event** E , denoted $P(E)$ must satisfy:

- (i). If $E = \emptyset$ is the empty set, then $P(E) = 0$;
- (ii). If $E = S$, then $P(E) = 1$.
- (iii). If $E = \{e_i\}$ is a simple event, then $P(E) = P(e_i)$;
- (iv). If E is a compound event, then $P(E)$ must be equal to the sum of the probabilities of all the simple events in E .
E.g. if $E = \{a, b, c\}$ then $P(E) = P(a) + P(b) + P(c)$.

Remark. $P(E) = 1$ means that E is certain to occur. $P(E) = 0$ means that E will never occur.

Example 19.3 (Two coins). Now suppose that you are flipping two different coins. The sample space is

$$S = \{HH, HT, TH, TT\}.$$

We can assume that

$$P(HH) = P(HT) = P(TH) = P(TT) = \frac{1}{4}.$$

- (i). What is the probability of getting one head and one tail?
- (ii). What is the probability of getting at least one tail?
- (iii). What is the probability of getting at least one head or at least one tail?
- (iv). What is the probability of getting two tails?
- (v). What is the probability of getting three tails?

solution:

- (i). We have $E = \{HT, TH\}$ and

$$P(E) = P(HT) + P(TH) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

Bir Olayın Olasılığı

Tanım. Örnek uzay

$$S = \{e_1, e_2, e_3, \dots, e_n\}$$

olarak n tane basit olaydan oluşsun. The **e_i olayının olması olasılığı** $P(e_i)$ ile gösterdiğimiz bir reel sayı. Burada

- (i). $P(e_i) \in [0, 1]$ her i ; ve
- (ii). $P(e_1) + P(e_2) + P(e_3) + \dots + P(e_n) = 1$.

Örnek 19.2 (Madeni Para). Bir madeni para havaya atalım. O zaman $S = \{H, T\}$. Varsayabiliriz ki

$$P(H) = \frac{1}{2} \quad \text{ve} \quad P(T) = \frac{1}{2}.$$

Şunu not edersek

- (i). $0 \leq P(H) \leq 1$ ve $0 \leq P(T) \leq 1$; ve
- (ii). $P(H) + P(T) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.

Bu parayı 1000 kez atarsak, kabaca 500 kez (ancak tam olarak değil) H gelmesini bekleriz.

Tanım. The **$\text{bir } E \text{ olayının olma olasılığı}$** , $P(E)$ ile gösterilir ve şunlar sağlanır:

- (i). $E = \emptyset$ boş küme ise, o zaman $P(E) = 0$;
- (ii). $E = S$ olduğunda, $P(E) = 1$.
- (iii). $E = \{e_i\}$ olursa, $P(E) = P(e_i)$;
- (iv). E bir bileşik olay ise, $P(E)$ E deki tüm basit olayların olasılıkları toplamına eşittir. Örneğin $E = \{a, b, c\}$ olursa $P(E) = P(a) + P(b) + P(c)$.

Not. $P(E) = 1$ demek E kesin olay demek. $P(E) = 0$ demek E imkansız olay.

Örnek 19.3 (İki madeni para). Şimdi iki farklı madeni para attığımızı varsayalım. Örnek uzay

$$S = \{HH, HT, TH, TT\}.$$

Varsayabiliriz ki

$$P(HH) = P(HT) = P(TH) = P(TT) = \frac{1}{4}.$$

- (i). Bir yazı bir tura gelmesi olasılığı kaçtır?
- (ii). En az bir yazı gelmesi olasılığı kaçtır?
- (iii). En az bir yazı ve bir tura gelmesi olasılığı kaçtır?
- (iv). İki de yazı gelmesi olasılığı kaçtır?
- (v). Üç yazı gelmesi olasılığı kaçtır?

çözüm:

- (i). Burada $E = \{HT, TH\}$ and

$$P(E) = P(HT) + P(TH) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

(ii). We have $E = \{HT, TH, TT\}$ and

$$P(E) = P(HT) + P(TH) + P(TT) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

(iii). We have $E = \{HH, HT, TH, TT\} = S$ and

$$P(E) = P(S) = 1.$$

(iv). We have $E = \{TT\}$ and $P(E) = \frac{1}{4}$.

(v). It is not possible to get three tails, so $E = \emptyset$ and $P(E) = P(\emptyset) = 0$.

Theorem 19.1. If we assume that each simple event in S is equally likely, then the probability of an event E is

$$P(E) = \frac{\text{number of elements in } E}{\text{number of elements in } S} = \frac{n(E)}{n(S)}.$$

Example 19.4. Suppose that we are rolling two dice and suppose that each simple event is equally likely. Find the probabilities of the following:

- (i). A total score of 7.
- (ii). A total score of 3.
- (iii). A total score greater than 10.
- (iv). A total score of 2.

solution: Please refer to Example 19.1 and Table 19.1 again.

(i). Since $E = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$, we have that

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

(ii). We have that $E = \{(1, 2), (2, 1)\}$ and that

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}.$$

(iii). Here $E = \{(5, 6), (6, 5), (6, 6)\}$ and

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

(iv). Since $E = \{(1, 1)\}$, it follows that

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{1}{36}.$$

Example 19.5. You randomly draw five cards from a standard deck of 52 cards. What is the probability of getting two clubs and three hearts?

solution: There are $n(S) = {}_{52}C_5$ possible 5-card hands. As we covered in Example 18.10, there are $n(E) = {}_{13}C_2 \cdot {}_{13}C_3$ 5-card hands which have two clubs and three hearts. So the probability is

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{{}_{13}C_2 \cdot {}_{13}C_3}{{}_{52}C_5} = \frac{78 \cdot 208}{2\,598\,960} \approx 0.0062$$

(ii). Burada $E = \{HT, TH, TT\}$ ve

$$P(E) = P(HT) + P(TH) + P(TT) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

(iii). Burada $E = \{HH, HT, TH, TT\} = S$ ve

$$P(E) = P(S) = 1.$$

(iv). Burada da $E = \{TT\}$ ve $P(E) = \frac{1}{4}$.

(v). Üç yazı gelmesi mümkün olmadığından, $E = \emptyset$ ve $P(E) = P(\emptyset) = 0$.

Teorem 19.1. S 'daki her basit olayın eşit derecede olası olduğunu varsayarsak, E olayının olasılığı şu şekildedir:

$$P(E) = \frac{E'nin\ eleman\ sayısı}{S'nin\ eleman\ sayısı} = \frac{n(E)}{n(S)}.$$

Örnek 19.4. İki zar attığımızı ve her basit olayın eşit derecede olası olduğunu varsayalım. Aşağıdakilerin olasılıklarını bulun:

- (i). Toplam puanın 7 olması.
- (ii). Toplam puanın 3 olması.
- (iii). Toplam puanın 10 dan büyük olması.
- (iv). Toplam puanın 2 olması.

çözüm: Lütfen Örnek 19.1'ye ve Tablo 19.1'ye tekrar bakınız.

(i). $E = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$ olduğundan,

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

elde ederiz.

(ii). $E = \{(1, 2), (2, 1)\}$ ve

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

elde ederiz.

(iii). $E = \{(5, 6), (6, 5), (6, 6)\}$ ve

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

(iv). $E = \{(1, 1)\}$ olduğundan

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{1}{36}$$

olur.

Örnek 19.5. Standart 52 lik iskambil kağıtlarından rastgele beş kart çekiliyor. İki sinek ve üç kupa gelme olasılığı kaçtır?

çözüm: 5 kartı $n(S) = C(52, 5)$ şekilde seçebiliriz. Hatırlarsak Örnek 18.10te olduğu gibi, $n(E) = C(13, 2) \cdot C(13, 3)$. Bu durumda olasılık

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{C(13, 2) \cdot C(13, 3)}{C(52, 5)} = \frac{78 \cdot 208}{2\,598\,960} \approx 0.0062$$

olarak hesaplanır.

Problems

Problem 19.1 (Three coins). You are flipping 3 coins. Two of the coins have a head (H) on one side and a tail (T) on the other side. The third coin has two heads. What is the probability of getting

- (a). 0 tails?
- (b). 1 tail?
- (c). 2 tails?
- (d). 3 tails?
- (e). less than 2 tails?
- (f). more than 1 tail?

Problem 19.2 (Playing cards). A standard deck of 52 cards has 13 hearts, 13 diamonds, 13 clubs and 13 spades. Hearts and diamonds are *red*. Clubs and spades are *black*. Kings, queens and jacks are called *face cards*.

What is the probability that:

- (a). a 5-card hand consists of only red cards?
- (b). a 5-card hand consists of only face cards?
- (c). a 4-card hand does not have any aces?
- (d). a 13-card hand does not have any clubs?
- (e). a 13-card hand has only black cards?
- (f). a 13-card hand has only aces and face cards?
- (g). a 13-card hand contains all four aces?

Sorular

Soru 19.1 (Üç madeni para). 3 madeni para atıyorsun. Madeni paralardan ikisinin bir yüzünde bir kafa (H) ve diğer yüzünde bir kuyruk (T) vardır. Üçüncü madalyonun iki başı vardır.

- (a). 0 kuyruk?
- (b). 1 kuyruk?
- (c). 2 kuyruk?
- (d). 3 kuyruk?
- (e). 2'den az kuyruk?
- (f). 1'den fazla kuyruk?

alma olasılığımız nedir?

Soru 19.2 (Oyun kartları). Standart 52 kartlık bir iskambil destesinde 13 kupa, 13 karo, 13 sinek ve 13 maça vardır. Kalpler ve karolar *kırmızı*. Sinekler ve maçalar *siyah*. Papaz, kız ve valeler *yüz kartları* olarak adlandırılır.

What is the probability that:

- (a). eldeki 5 kartın sadece kırmızı kartlardan oluşma?
- (b). eldeki 5 kartın sadece yüz kartlarından oluşma?
- (c). eldeki 4 kartta hiç as bulunmama?
- (d). eldeki 13 kartta hiç sinek bulunmama?
- (e). eldeki 13 kartın sadece siyah olması?
- (f). eldeki 13 kartın sadece as ve yüz kartlarından oluşması?
- (g). eldeki 13 kartın tüm asları içermesi?


olasılığı nedir?

20


Concepts of Probability Olasılık Kavramları

Union and Intersection


Birleşim Kümesi ve Kesişim Kümesi



$$A \cup B$$



$$A \cap B$$



$$A^c$$

Example 20.1 (One die). The sample space for rolling a single die is

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Assume that each of these simple events are equally likely.

- What is the probability of rolling a number which is even and greater than 3?
- What is the probability of rolling a number which is even or greater than 3?

solution: Let

$$A = \text{even numbers} = \{2, 4, 6\}$$

and

$$B = \text{numbers greater than 3} = \{4, 5, 6\}.$$

- Since $A \cap B = \{4, 6\}$, we have that

$$P(A \cap B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

- Since $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$, we have that

$$P(A \cup B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Remark. Please recall the Addition Principle (Theorem 17.1) which stated that

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B).$$

Örnek 20.1 (Tek zar). Bir zar atıldığında örnek uzay

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

olur. Bu basit olayların her birinin eşit derecede olası olduğunu varsayın.

- Gelen sayının çift ve 3'ten büyük olma olasılığı nedir?
- Gelen sayının çift yada 3'ten büyük olma olasılığı nedir?

çözüm:

$$A = \text{çift sayılar} = \{2, 4, 6\}$$

ve

$$B = \text{3'ten büyük sayılar} = \{4, 5, 6\}$$

olsun.

- $A \cap B = \{4, 6\}$ olduğundan,

$$P(A \cap B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

olur.

- $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$ olduğundan,

$$P(A \cup B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

olur.

Not. Lütfen toplam prensibini hatırlayınız: (Teorem 17.1) öyle ki

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B).$$

Theorem 20.1.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Example 20.2 (Two dice). You roll two dice. What is the probability that:

- (i). the sum is either 5 or 10?
- (ii). either the sum is greater than 9, or both dice show the same number?

solution:

- (i). Let

$$\begin{aligned} A &= \text{the sum is 5} \\ &= \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\} \end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned} B &= \text{the sum is 10} \\ &= \{(4, 6), (5, 5), (6, 4)\}. \end{aligned}$$

Since $A \cap B = \emptyset$, we have that

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{4}{36} + \frac{3}{36} = \frac{7}{36}.$$

- (ii). Let

$$\begin{aligned} C &= \text{the sum is greater than 9} \\ &= \{(4, 6), (5, 5), (5, 6), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\} \end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned} D &= \text{both dice show the same number} \\ &= \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}. \end{aligned}$$

Note that $C \cap D = \{(5, 5), (6, 6)\}$. Therefore

$$\begin{aligned} P(C \cup D) &= P(C) + P(D) - P(C \cap D) \\ &= \frac{6}{36} + \frac{6}{36} - \frac{2}{36} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}. \end{aligned}$$

Teorem 20.1.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Örnek 20.2 (İki zar). İki zar atıyorsunuz:

- (i). sayılar toplamının 5 yada 10 olması olasılığı nedir?
- (ii). Sayılar toplamının 9'dan büyük yada atılan her zarın aynı sayıyı göstermesi olasılığı nedir?

çözüm:

- (i).

$$\begin{aligned} A &= \text{toplam 5} \\ &= \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\} \end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned} B &= \text{toplam 10} \\ &= \{(4, 6), (5, 5), (6, 4)\}. \end{aligned}$$

olsun. $A \cap B = \emptyset$ olduğundan,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{4}{36} + \frac{3}{36} = \frac{7}{36}$$

elde ederiz.

- (ii).

$$\begin{aligned} C &= \text{toplamları 9 da büyük} \\ &= \{(4, 6), (5, 5), (5, 6), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\} \end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned} D &= \text{iki zar da aynı sayıyı göstere} \\ &= \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\} \end{aligned}$$

olsun. Ayrıca $C \cap D = \{(5, 5), (6, 6)\}$ olur. Bu nedenle

$$\begin{aligned} P(C \cup D) &= P(C) + P(D) - P(C \cap D) \\ &= \frac{6}{36} + \frac{6}{36} - \frac{2}{36} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}. \end{aligned}$$

Complements

Theorem 20.2.

$$P(E) = 1 - P(E^c).$$

Sometimes it is easier to calculate $1 - P(E^c)$, than to calculate $P(E)$ directly.

Example 20.3 (Whiteboard Markers). A box containing 45 whiteboard markers is delivered to Istanbul Okan University. Nine of the markers are red. The remaining markers are black. Your teacher is given 10 markers at random. He will be happy if one or more of his markers is red. What is the probability that your teacher will be happy?

solution: Let

E = one or more of the markers is red.

Then

E^c = all 10 markers are black.

Since

$$P(E^c) = \frac{n(E^c)}{n(S)} = \frac{{}_{36}C_{10}}{{}_{45}C_{10}},$$

we have that

$$P(E) = 1 - P(E^c) = 1 - \frac{{}_{36}C_{10}}{{}_{45}C_{10}} \approx 0.92.$$

Example 20.4. In a class of 30 students, what is the probability that at least two students have the same birthday? (Same month and day. Ignore 29 February)

solution: We assume that there are 365 days in a year and that each day is equally likely. We have

$$n(S) = 365^{30}$$

by the Multiplication Principle. Let

E = 2 or more people have the same birthday.

Then

E^c = all 30 students have different birthdays.

We calculate that

$$n(E^c) = 365 \cdot 364 \cdot 363 \cdot \dots \cdot 336 = \frac{365!}{335!} = {}_{365}P_{30},$$

$$P(E^c) = \frac{n(E^c)}{n(S)} = \frac{365!}{335! \cdot 365^{30}}$$

and

$$P(E) = 1 - P(E^c) = 1 - \frac{365!}{335! \cdot 365^{30}} \approx 0.706$$

Complements

Teorem 20.2.

$$P(E) = 1 - P(E^c).$$

Bazen $1 - P(E^c)$ 'ni hesaplamak $P(E)$ 'yi direkt hesaplamaktan daha kolaydır.

Örnek 20.3 (Tahta Kalemleri). 45 beyaz tahta kalemi içeren bir kutu İstanbul Okan Üniversitesi'ne teslim edildi. Kalem-lerden dokuzu kırmızı, kalan kalemler siyahtır. Öğretmeninize rastgele 10 kalem verilir. Kalemlerden biri veya daha fazlası kırmızı ise öğretmen mutlu olacaktır. Öğretmeninizin mutlu olma olasılığı nedir?

çözüm:

E = bir yada daha fazla kalem kırmızı

dersek

E^c = 10 kalemin hepsi siyah

olur.

$$P(E^c) = \frac{n(E^c)}{n(S)} = \frac{C(36, 10)}{C(45, 10)}$$

olduğundan,

$$P(E) = 1 - P(E^c) = 1 - \frac{C(36, 10)}{C(45, 10)} \approx 0.92$$

elde ederiz.

Örnek 20.4. 30 öğrencilik bir sınıfta, en az iki öğrencinin aynı doğum gününe sahip olma olasılığı nedir? (Aynı ay ve gün. 29 Şubat'ı dikkate almayın)

çözüm: Bir yılda 365 gün olduğunu ve her günün eşit olasılıkla mümkün olduğunu varsayıyoruz. Çarpım Prensibinden

$$n(S) = 365^{30}$$

olduğu aşıkardır.

E = 2 or more people have the same birthday

olsun. O halde

E^c = all 30 students have different birthdays.

Sonuç olarak,

$$n(E^c) = 365 \cdot 364 \cdot 363 \cdot \dots \cdot 336 = \frac{365!}{335!} = P(365, 30),$$

$$P(E^c) = \frac{n(E^c)}{n(S)} = \frac{365!}{335! \cdot 365^{30}}$$

and

$$P(E) = 1 - P(E^c) = 1 - \frac{365!}{335! \cdot 365^{30}} \approx 0.706$$

Problems

Problem 20.1 (Lottery). A bag contains 20 tokens numbered 1 – 20. One ball is drawn at random. What is the probability that the number drawn is:

- (a). odd or a multiple of 3?
- (b). even or odd?
- (c). prime or greater than 10?
- (d). a multiple of 5 or a multiple of 7?
- (e). less than 14 or greater than 10?
- (f). even or less than 4?

Problem 20.2 (Complements).

- (a). Two cards are chosen at random from a standard deck of playing cards. What is the probability that at least one of them is a face card (Jack, Queen or King)?
- (b). A fair die is thrown. What is the probability that the score is not a factor of 6?
- (c). The letters a,b,c,d,...,x,y,z are written on 26 cards. Two cards are chosen at random (without replacement). What is the probability that at least one of them is a consonant?
- (d). Two fair dice are thrown. What is the probability that the two scores do not add to 7?
- (e). A bag contains 20 balls numbered from 1 to 20. Two balls are selected at the same time from the bag. What is the probability that the two numbers selected do NOT differ by 12?

Sorular

Soru 20.1 (Piyango). Bir çanta, 1 – 20 sayıları ile numaralandırılmış 20 top içeriyor. Rastgele bir top çekilir. Çekilen toptaki sayının;

- (a). tek veya 3'ün katı?
- (b). tek yada çift?
- (c). asal veya 10'dan büyük?
- (d). 5'in katı veya 7'nin katı?
- (e). 14'ten küçük veya 10'dan büyük?
- (f). çift veya 4'ten az?

olma olasılığı nedir?

Soru 20.2 (Tamlayanlar).

- (a). Standart bir oyun kağıdı destesinden rastgele iki kart seçilir. En az birinin yüzü kart olma olasılığı nedir (Vale, Kız veya Papaz)?
- (b). Adil bir zar atılır. Puanın 6 çarpanı olmama olasılığı nedir?
- (c). 26 kart üzerine a, b, c, d, ..., x, y, z harfleri yazılır. Rastgele iki kart seçilir (geri yerleştirilmeden). En az birinin ünsüz olma olasılığı nedir?
- (d). Bir torba 1'den 20'ye kadar numaralandırılmış 20 top içerir. Torbadan aynı anda iki top seçilir. Seçilen iki sayının farkının 12 OLMAMASI olasılığı nedir?

21

Conditional Probability Koşullu Olasılık

Sometimes the probability of an event will depend on another event. For example, suppose that

A = Ali has cancer

and

B = Ali is a smoker.

Clearly the probability that A occurs depends on B .

Definition. The *conditional probability* of A given B is

$$P(A|B) = \left(\begin{array}{l} \text{the probability of A, if we} \\ \text{already know that B occurs} \end{array} \right).$$

Theorem 21.1.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Example 21.1 (Marbles). A bag contains red and blue marbles. Two marbles are drawn without replacement. The probability of selecting a red marble and then a blue marble is 0.28. The probability of selecting a red marble on the first draw is 0.5. What is the probability of selecting a blue marble on the second draw, given that the first marble drawn was red?

solution: Let

R = the first marble is red

and

B = the second marble is blue.

The required probability is

$$P(B|R) = \frac{P(B \cap R)}{P(R)} = \frac{0.28}{0.5} = 0.56$$

Example 21.2 (One die). Your friend says that when she rolled a die, she rolled an odd number. What is the probability that your friend rolled a 3?

solution: Let

A = your friend rolled a 3

Bazen bir olayın olasılığı başka bir olaya bağlı olur. Örneğin, varsayalım ki

A = Ali has cancer

ve

B = Ali is a smoker

olsun. A olayının olma olasılığının B 'nin olması olasılığına bağlı olduğu açıkça görülür.

Tanım. Verilen B için A 'nin *şartlı olasılığı*

$$P(A|B) = \left(\begin{array}{l} \text{the probability of A, if we} \\ \text{already know that B occurs} \end{array} \right)$$

ile hesaplanır.

Teorem 21.1.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Örnek 21.1 (Misket). Bir çanta kırmızı ve mavi misketler vardır. Geri atılmaksızın ardarda iki misket çekilir. Kırmızı bilye ve ardından mavi bilye seçme olasılığı 0,28'dir. İlk çekilişte kırmızı bilye seçme olasılığı 0.5'dir. Çekilen ilk bilyenin kırmızı olduğu düşünülürse, ikinci çekilişte mavi bilye seçme olasılığı nedir?

çözüm:

R = the first marble is red

ve

B = the second marble is blue

olsun. O halde

$$P(B|R) = \frac{P(B \cap R)}{P(R)} = \frac{0.28}{0.5} = 0.56$$

olur.

Örnek 21.2 (One die). Arkadaşınız bir zar attığında tek bir sayı attığını söylüyor. Arkadaşınızın 3 atma olasılığı nedir?

çözüm:

A = your friend rolled a 3

and

B = your friend rolled an odd number.

Then $P(A) = \frac{1}{6}$, $P(A \cap B) = P(A) = \frac{1}{6}$ and $P(B) = \frac{1}{2}$. Hence

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}.$$

Remark. Given that $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, we have that

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B).$$

Similarly,

$$P(A \cap B) = P(B \cap A) = P(A)P(B|A).$$

Therefore:

Theorem 21.2 (Product Rule).

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$$

and

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}.$$

ve

B = your friend rolled an odd number

olsun. O halde $P(A) = \frac{1}{6}$, $P(A \cap B) = P(A) = \frac{1}{6}$ ve $P(B) = \frac{1}{2}$. Böylece

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}.$$

Not. $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ verildiğinden,

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B)$$

elde edilir. Benzer şekilde,

$$P(A \cap B) = P(B \cap A) = P(A)P(B|A).$$


Bu yüzden:

Teorem 21.2 (Çarpım Kuralı).

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$$

ve

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}.$$



Monty Hall
USA, 1921-2017.

Figure 21.1: The Monty Hall Problem.
Şekil 21.1:

The Monty Hall Problem

Suppose you're on a TV game show, and you're given the choice of three doors: Behind one door is a car; behind the others, goats. You pick a door, say No. 1, and the host, who knows what's behind the doors, opens another door, say No. 3, which has a goat. He then says to you, "Do you want to pick door No. 2?" Is it to your advantage to switch your choice?

The *Monty Hall Problem* is one that confuses a lot of people that haven't studied Probability.

- (i). You choose a door. What is the probability that the car is behind that door? Easy $P(\text{car}) = \frac{1}{3}$ right?

CORRECT

- (ii). Then the host opens another door and shows you a goat. Now there are two closed doors: Behind one is a car and behind the other is a goat.
- (iii). What is the probability that the car is behind the door that you chose? Two closed doors. One Car. So clearly now $P(\text{car}) = \frac{1}{2}$ right?

WRONG!!!

What? Why?

To explain, let us look at all the possible outcomes if you choose door number 1 first.

behind door 1	behind door 2	behind door 3	outcome if you don't switch	outcome if you switch
car	goat	goat	win	lose
goat	car	goat	lose	win
goat	goat	car	lose	win

The Monty Hall Problem

Bir TV yarışma programında olduğunuzu ve size üç kapı seçeneği sunulduğunu varsayalım: Bir kapının arkasında bir araba; diğerlerinin arkasında keçiler var. Bir kapı seçiyorsunuz, mesela 1 numarayı seçtiniz, ve kapıların arkasında ne olduğunu bilen ev sahibi başka bir kapıyı açıyor, örneğin 3 numaralı arkasında keçi olan kapıyı. Sonra size "2 numaralı kapıyı seçmek ister misiniz?" diye soruyor. Seçiminizi değiştirmek sizin yararınıza mı?

Monty Hall Problem olasılık eğitimi almamış birçok insanın kafasını karıştıran bir soru.

- (i). Bir kapı seçersiniz. Arabanın o kapının arkasında olma olasılığı nedir? Kolay $P(\text{car}) = \frac{1}{3}$ doğru?

CORRECT

- (ii). Sonra ev sahibi başka bir kapıyı açar ve size bir keçi gösterir. Şimdi iki kapalı kapı var: Birinin arkasında araba, diğerinin arkasında bir keçi.
- (iii). Arabanın seçtiğiniz kapının arkasında olma olasılığı nedir? İki kapalı kapı. Bir araba. Şimdi çok net $P(\text{car}) = \frac{1}{2}$ doğru?

WRONG!!!

What? Why?

Açıklamak gerekirse, önce 1 numaralı kapıyı seçerseniz tüm olası sonuçlara bakalım.

We can see from the table that if you don't switch your choice, then you have a $\frac{1}{3}$ chance of winning the car, but if you do switch then you have $\frac{2}{3}$ chance of winning it. These are the probabilities if you choose door number 1, but of course we would get the same results if you choose door 2 or 3 first.



Figure 21.2: Where is the car?
Şekil 21.2:

1 numaralı kapının arkası	2 numaralı kapının arkası	3 numaralı kapının arkası	eğer sonucu değiştirmeseydin	eğer sonucu değiştirirsen
araba	keçi	keçi	zafer	kaybet
keçi	araba	keçi	kaybet	zafer
keçi	keçi	araba	kaybet	zafer

Tablodan, seçiminizi değiştirmeseydiniz, arabayı kazanma şansınızın $\frac{1}{3}$ olduğunu, ancak değiştirirseniz, kazanma şansınızın $\frac{2}{3}$ olduğunu görebiliyoruz. Bunlar, 1 numaralı kapıyı seçerseniz olasılıklardır, ancak elbette önce 2 veya 3 numaralı kapıyı seçerseniz aynı sonuçları alırsınız.




Figure 21.3: car?
Şekil 21.3:

Another way

Let's think of this another way: Please see figure 21.3. You initially choose door number 1. At the start, the chance of the car being behind door one is $\frac{1}{3}$ and the chance of the car being behind doors 2 or 3 is $\frac{2}{3}$.

Let's imagine that the host doesn't open a door, he just says you can change your choice for *both* of the other two doors. Would you switch then?

We know that at least one of doors 2 and 3 hides a goat. Remember that the host knows where the car is: He doesn't open a door at random, he always opens a door with a goat. So he isn't really giving you any extra information. The probabilities don't change to $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, they are still $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$.

Another way

Let's think of this another way: Please see figure 21.3. You initially choose door number 1. At the start, the chance of the car being behind door one is $\frac{1}{3}$ and the chance of the car being behind doors 2 or 3 is $\frac{2}{3}$.

Let's imagine that the host doesn't open a door, he just says you can change your choice for *both* of the other two doors. Would you switch then?

We know that at least one of doors 2 and 3 hides a goat. Remember that the host knows where the car is: He doesn't open a door at random, he always opens a door with a goat. So he isn't really giving you any extra information. The probabilities don't change to $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, they are still $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$.

Using Conditional Probabilities

Let

C = door number 1 has a car behind it

C^c = door number 1 does not have a car behind it

= door number 1 has a goat behind it

and

E = the host has opened a door with a goat behind it.

We have that $P(C) = \frac{1}{3}$ and $P(C^c) = 1 - P(C) = \frac{2}{3}$. Moreover, $P(E|C) = 1$ and $P(E|C^c) = 1$ because the host always opens a door with a goat.

Then we can calculate that

$$\begin{aligned} P(C|E) &= \frac{P(C)P(E|C)}{P(E)} \\ &= \frac{P(C)P(E|C)}{P(E \cap C) + P(E \cap C^c)} \\ &= \frac{P(C)P(E|C)}{P(C)P(E|C) + P(C^c)P(E|C^c)} \\ &= \frac{\frac{1}{3} \cdot 1}{\frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{2}{3} \cdot 1} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

This means that it doesn't matter if the host opens a door or not, the probability that the car is behind door number 1 is always $\frac{1}{3}$.

Conclusion

You should always switch door if you want to win the car.

Using Conditional Probabilities

Let

C = door number 1 has a car behind it

C^c = door number 1 does not have a car behind it

= door number 1 has a goat behind it

and

E = the host has opened a door with a goat behind it.

We have that $P(C) = \frac{1}{3}$ and $P(C^c) = 1 - P(C) = \frac{2}{3}$. Moreover, $P(E|C) = 1$ and $P(E|C^c) = 1$ because the host always opens a door with a goat.

Then we can calculate that

$$\begin{aligned} P(C|E) &= \frac{P(C)P(E|C)}{P(E)} \\ &= \frac{P(C)P(E|C)}{P(E \cap C) + P(E \cap C^c)} \\ &= \frac{P(C)P(E|C)}{P(C)P(E|C) + P(C^c)P(E|C^c)} \\ &= \frac{\frac{1}{3} \cdot 1}{\frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{2}{3} \cdot 1} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

This means that it doesn't matter if the host opens a door or not, the probability that the car is behind door number 1 is always $\frac{1}{3}$.

Conclusion

You should always switch door if you want to win the car.

Problems

Problem 21.1 (Conditional Probability).

- (a). Two cards are chosen at random without replacement from a pack of 52 playing cards.
If the first card chosen is an Ace, what is the probability the second card chosen is a King?
- (b). Two cards are chosen at random without replacement from a pack of 52 playing cards.
If the first card chosen is an Ace, what is the probability the second card chosen is also an Ace?
- (c). In Eton School, 60% of the boys play rugby, and 24% of the boys play rugby and football.
What percent of those that play rugby also play football?

Problem 21.2 (Conditional Probability).

- (a). Your roll two dice. Given that you get a sum is 10, what is the probability that the first die shows a 5?
- (b). Harry Potter turns up at class either late or on time. He is then either shouted at or not. The probability that he turns up late is $\frac{2}{5}$. If he turns up late, the probability that he is shouted at is $\frac{7}{10}$. If he turns up on time, the probability that he is still shouted at for no particular reason is $\frac{1}{5}$.
You hear Harry being shouted at. What is the probability that he was late?
- (c). The probability of raining on Sunday is 0.07. If today is Sunday then find the probability of rain today.
- (d). Susan took two tests. The probability of her passing both tests is 0.6. The probability of her passing the first test is 0.8. What is the probability of her passing the second test given that she has passed the first test?
- (e). A student has studied only 15 of the 25 topics covered in MATH117. When writing the final exam, the teacher randomly selects four topics to ask questions on. What is the probability that the student has studied these four topics?

Sorular

Soru 21.1 (Conditional Probability).

- (a). Two cards are chosen at random without replacement from a pack of 52 playing cards.
If the first card chosen is an Ace, what is the probability the second card chosen is a King?
- (b). Two cards are chosen at random without replacement from a pack of 52 playing cards.
If the first card chosen is an Ace, what is the probability the second card chosen is also an Ace?
- (c). In Eton School, 60% of the boys play rugby, and 24% of the boys play rugby and football.
What percent of those that play rugby also play football?

Soru 21.2 (Conditional Probability).

- (a). Your roll two dice. Given that you get a sum is 10, what is the probability that the first die shows a 5?
- (b). Harry Potter turns up at class either late or on time. He is then either shouted at or not. The probability that he turns up late is $\frac{2}{5}$. If he turns up late, the probability that he is shouted at is $\frac{7}{10}$. If he turns up on time, the probability that he is still shouted at for no particular reason is $\frac{1}{5}$.
You hear Harry being shouted at. What is the probability that he was late?
- (c). The probability of raining on Sunday is 0.07. If today is Sunday then find the probability of rain today.
- (d). Susan took two tests. The probability of her passing both tests is 0.6. The probability of her passing the first test is 0.8. What is the probability of her passing the second test given that she has passed the first test?
- (e). A student has studied only 15 of the 25 topics covered in MATH117. When writing the final exam, the teacher randomly selects four topics to ask questions on. What is the probability that the student has studied these four topics?

22

Probability Trees Olasılık Ağaçları

Example 22.1 (5 balls in a box). A box contains 3 red and 2 yellow balls. Two balls are randomly drawn without replacement. What is the probability that the second ball is yellow?

solution: A *probability tree* for this problem is shown in figure 22.1. From this probability tree, we can see that

$$P(YY) + P(RY) = \frac{1}{10} + \frac{3}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

The probability that the second ball is yellow is $\frac{2}{5}$.




Figure 22.2: 3 red balls and 2 yellow balls in a box.
Şekil 22.2:

Örnek 22.1 (5 balls in a box). A box contains 3 red and 2 yellow balls. Two balls are randomly drawn without replacement. What is the probability that the second ball is yellow?

çözüm: A *probability tree* for this problem is shown in figure 22.1. From this probability tree, we can see that

$$P(YY) + P(RY) = \frac{1}{10} + \frac{3}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

The probability that the second ball is yellow is $\frac{2}{5}$.




Figure 22.1: A probability tree for the 5 balls in a box problem.
Şekil 22.1:




Figure 22.3: A probability tree for the tennis match between Keir and Boris.
Şekil 22.3:

Example 22.2 (Tennis). Boris and Keir are playing tennis. The first player to win 2 sets wins the match. In each set, the probability that Keir wins that set is $\frac{2}{3}$. Find the probability that:

- (i). Boris wins the match.
- (ii). 3 sets are played.
- (iii). The player who wins the first set, wins the match.

solution: A probability tree for this problem is show in figure 22.3.

- (i). We calculate that

$$P(KBB) + P(BKB) + P(BB) = \frac{2}{27} + \frac{2}{27} + \frac{1}{9} = \frac{7}{27}.$$

- (ii). Now

$$\begin{aligned} P(KBK) + P(KBB) + P(BKK) + P(BKB) \\ &= \frac{4}{27} + \frac{2}{27} + \frac{4}{27} + \frac{2}{27} \\ &= \frac{4}{9}. \end{aligned}$$

- (iii). Finally

$$\begin{aligned} P(KK) + P(KBK) + P(BKB) + P(BB) \\ &= \frac{4}{9} + \frac{4}{27} + \frac{2}{27} + \frac{1}{9} \\ &= \frac{7}{9}. \end{aligned}$$

Örnek 22.2 (Tennis). Boris and Keir are playing tennis. The first player to win 2 sets wins the match. In each set, the probability that Keir wins that set is $\frac{2}{3}$. Find the probability that:

- (i). Boris wins the match.
- (ii). 3 sets are played.
- (iii). The player who wins the first set, wins the match.

çözüm: A probability tree for this problem is show in figure 22.3.

- (i). We calculate that


$$P(KBB) + P(BKB) + P(BB) = \frac{2}{27} + \frac{2}{27} + \frac{1}{9} = \frac{7}{27}.$$

- (ii). Now

$$\begin{aligned} P(KBK) + P(KBB) + P(BKK) + P(BKB) \\ &= \frac{4}{27} + \frac{2}{27} + \frac{4}{27} + \frac{2}{27} \\ &= \frac{4}{9}. \end{aligned}$$

- (iii). Finally

$$\begin{aligned} P(KK) + P(KBK) + P(BKB) + P(BB) \\ &= \frac{4}{9} + \frac{4}{27} + \frac{2}{27} + \frac{1}{9} \\ &= \frac{7}{9}. \end{aligned}$$

Figure 22.4: What is $P(B)$?

Şekil 22.4:

Example 22.3. Please see figure 22.4. Calculate $P(B)$.

solution:

We calculate that

$$\begin{aligned} P(B) &= P(RMB) + P(RNB) + P(SOB) + P(SB) \\ &= \left(\frac{3}{10} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{3}{10} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{7}{10} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{7}{10} \cdot \frac{4}{5}\right) \\ &= \frac{6}{150} + \frac{18}{150} + \frac{7}{100} + \frac{28}{50} = \frac{79}{100}. \end{aligned}$$

Example 22.4. Ron Weasley has a bag with 7 blue sweets and 3 red sweets in it. He takes a sweet at random from the bag, then puts it back in the bag. Then he picks a sweet at random from the bag and eats it. Finally he picks a third sweet at random.

Draw a probability tree to represent this situation.

solution:

Örnek 22.3. Please see figure 22.4. Calculate $P(B)$.

çözüm:

We calculate that

$$\begin{aligned} P(B) &= P(RMB) + P(RNB) + P(SOB) + P(SB) \\ &= \left(\frac{3}{10} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{3}{10} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{7}{10} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{7}{10} \cdot \frac{4}{5}\right) \\ &= \frac{6}{150} + \frac{18}{150} + \frac{7}{100} + \frac{28}{50} = \frac{79}{100}. \end{aligned}$$

Örnek 22.4. Ron Weasley has a bag with 7 blue sweets and 3 red sweets in it. He takes a sweet at random from the bag, then puts it back in the bag. Then he picks a sweet at random from the bag and eats it. Finally he picks a third sweet at random.

Draw a probability tree to represent this situation.

çözüm:




Figure 22.5: A probability tree for Ron Weasley's sweets.

Şekil 22.5:

Problems

Use probability trees to answer the following problems:

Problem 22.1 (Tennis). Recep and Kemal are playing tennis. The first player to win 2 sets wins the match. The probability that Recep will win the first set is $\frac{4}{5}$. The probability that Recep will win the second set is $\frac{2}{5}$. The probability that Recep will win the third set (if it is played) is $\frac{1}{5}$.

- What is the probability that Recep will win the match?
- What is the probability that Kemal will win the match?
- What is the probability that the third set will be played?
- What is the probability that Kemal will win atleast one set?
- What is the probability that the last two sets played are won by the same person?
- If the match finishes after two sets, who is more likely to win?
- If the match finishes after three sets, who is more likely to win?

Problem 22.2 (Money Money Money). A vase contains 2 ten-lira banknotes, 1 fifty-lira banknote, and 1 one-hundred-lira banknote. You randomly take the banknotes out of the vase (without replacement) until you take the one-hundred-lira note. Then you stop. You keep all the money that you have taken.

- What is the probability that you have taken exactly 160 liras?
- What is the probability that you take all of the money out of the vase?
- What is the probability that you take two banknotes?

Sorular

Use probability trees to answer the following problems:

Soru 22.1 (Tennis). Recep and Kemal are playing tennis. The first player to win 2 sets wins the match. The probability that Recep will win the first set is $\frac{4}{5}$. The probability that Recep will win the second set is $\frac{2}{5}$. The probability that Recep will win the third set (if it is played) is $\frac{1}{5}$.

- What is the probability that Recep will win the match?
- What is the probability that Kemal will win the match?
- What is the probability that the third set will be played?
- What is the probability that Kemal will win atleast one set?
- What is the probability that the last two sets played are won by the same person?
- If the match finishes after two sets, who is more likely to win?
- If the match finishes after three sets, who is more likely to win?

Soru 22.2 (Money Money Money). A vase contains 2 ten-lira banknotes, 1 fifty-lira banknote, and 1 one-hundred-lira banknote. You randomly take the banknotes out of the vase (without replacement) until you take the one-hundred-lira note. Then you stop. You keep all the money that you have taken.

- What is the probability that you have taken exactly 160 liras?
- What is the probability that you take all of the money out of the vase?
- What is the probability that you take two banknotes?

23

Graph Theory

Çizge Kuramı





Figure 23.1: The seven bridges of Königsberg in Prussia (now Kaliningrad, Russia) in 1652.

Şekil 23.1:

Often when analysing theoretical problems, it is useful to transform the problem into a collection of vertices joined by lines.

When visiting the city of Königsberg in 1736, the Swiss Mathematician Leonhard Euler (1707-1783) was set a problem by the inhabitants. To solve this problem, he invented a type of Mathematics called Graph Theory.

The town of Königsberg in Prussia (now Kaliningrad, Russia) was divided into four landmasses by the Pregel river. There were 7 separate bridges between these landmasses as shown in figure 23.1.

Visitors were often asked the following problem by the locals:

Can a person walk around the town and cross each bridge *once and only once*?

Euler was the first person to solve this problem.

Graph Theory, which has been used by mathematicians for many years to solve interesting riddles and puzzles, is nowadays in computing (algorithm design, telecommunication and GPS), physics (atomic structures), neurology (brain-like structures), chemistry (molecular structures), and many other disciplines.

Kuramsal sorunların çözümlenmesinde belli büyüklükler yada kavramlar arasındaki bağlantıları incelerken ara bağlantıları bir çizgeye dönüştürmek ya kaçınılmaz yada en akılcı yöntemdir.

Euler (1707-1783), Königsberg kentindeki köprülerle ilgili problemin çözümünü araştırırken, sorunu bir takım düğüm ve ayrıtların arabağlantılarına indirgeyerek, çizge kuramının da temellerini atmış oldu.

Prusya'daki Königsberg kasabası Pregel nehri ile ikiye ayrılıyordu ve nehrin içinde iki adacık bulunuyordu. Bu adacıklarla kasaba arasında şekildeki gibi 7 ayrı köprü bulunmaktaydı.

Problem, kasabanın bir yakasından gezinti yapmaya çıkan biri tüm köprüleri **sadece bir kez** geçerek başladığı noktaya dönebilirmiydi? sorusu idi. Bu sorunun matematiksel olarak yanıtı yıllar sonra keşfedildi.

Uzun yıllar, yalnız matematikçilerin uğraştığı ve ilginç bilmece/bulmacaları çözmekten öteye gidemeyen çizge kuramı bu gün bilişimde (algoritma tasarlamada, telekomünikasyon ve GPS'lerde), fizikte (atomik yapıların incelenmesinde), nörolojide (beyne benzer yapıların incelenmesinde), kimyada (moleküler yapıların incelenmesinde) ve daha birçok bilim dalının içinde her gün kendine yeni bir yer ediniyor.

Definitions and Notation

Definition. A graph is formed by points called *vertices* (or *nodes*), and lines called *edges*.

Notation. Vertices are denoted by lowercase letters: $a, b, c, \dots$. The edge from vertex u to vertex v is denoted by $e = (u, v)$. u and v are called *endpoints* of e .

Definition. A non-empty set of vertices V together with a set of edges E is called a *graph* and is denoted by $G(V, E)$.

Definition. An edge which starts and finishes at the same vertex is called a *loop*. See figure 23.2.




Figure 23.2: A graph with 3 vertices and 4 edges. One of the edges is a loop.

Şekil 23.2:

Example 23.1. Let $V = \{a, b, c, d\}$ and $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$ where $e_1 = (a, b)$, $e_2 = (b, c)$, $e_3 = (c, d)$, $e_4 = (a, c)$ and $e_5 = (b, d)$. Draw the graph $G = (V, E)$.

solution: Please see figure 23.3.

Definition. Two edges with the same endpoints are called *parallel edges*.

Tanım. Bir çizginin (hattın) her uç noktasına düğüm denir.

Notasyon. Düğümler küçük harflerle gösterilir: $a, b, \dots, v, b$. Bir çift düğüm ile etiketlenmiş hatlardır. İki uç noktasının belirtildiği $e = (v, w)$ sembolü ile gösterilir.

Tanım. V , köşelerin(vertex) ve E , kenarların(edges) boş olmayan bir kümesi olmak üzere E kümesindeki elemanların V kümesinin farklı elemanlarına belli bir kurala bağlı oladan bağlandığı kümeye çizge(graph) denir ve $G(V, E)$ ile gösterilir.

Tanımlanan her soyut çizgeye ilişkin, somut bir çizimsel gösterimin varolacağı unutulmamalıdır.

Tanım. Hattın başlangıç ve bitişi aynı düğüm ise bu tür hatlara *çevrim(cycle)* denir. Şekil 23.2.

Örnek 23.1. $V = a, b, c, d$ ve $E = e_1, e_2, e_3, e_4, e_5$, $e_1 = a, b$, $e_2 = b, c$, $e_3 = c, d$, $e_4 = a, c$ ve $e_5 = b, d$ olsun. $G = (V, E)$ grafını çiziniz.

çözüm: Şekil 23.3.

Tanım. Two edges with the same endpoints are called *parallel edges*.




Figure 23.3: The solution to Example 23.1. This graph is a simple graph.

Şekil 23.3:

Types of Graph

Definition. A *simple graph* is a graph without parallel edges or loops.

Definition. If a graph contains parallel edges, it is called a *multigraph*. See figure 23.4.




Figure 23.4: A multigraph.
Şekil 23.4: Bir çoklu graf

Definition. A *pseudograph* is a non-simple graph in which both loops and parallel edges are permitted. See figure 23.5.

Definition. If $e = (u, v)$ is an edge of a undirected graph G , then the vertices u and v are called *neighbours* in G .

Definition. The *degree* of a vertex v in a(n undirected) graph is

$$\deg(v) = \text{the number of edges connected to } v.$$

When we calculate the degree of a vertex, a loop is counted as 2.

Example 23.2. In figure 23.6, give the degrees of all the vertices in graphs G and H .

solution:

G	
$\deg(a) = 2$	
$\deg(b) = 4$	
$\deg(c) = 4$	
$\deg(d) = 1$	
$\deg(e) = 3$	
$\deg(f) = 4$	
$\deg(g) = 0$	

H	
$\deg(a) = 3$	
$\deg(b) = 6$	
$\deg(c) = 1$	
$\deg(d) = 5$	
$\deg(e) = 5$	

Definition. A vertex without an edge (degree=0) is called an *isolated vertex*. E.g. In figure 23.6, vertex g of graph G is an isolated vertex.

Definition. A vertex of degree 1 is called a *pendant*. A pendant has only one edge. E.g. In figure 23.6, vertex d of graph G is a pendant.

Çizge Çeşitleri

Tanım. Aynı iki düğümün sadece bir hatla bağlandığı, herhangi bir düğümü yine kendisine bağlayan bir hattın (çevrimin) olmadığı, hatların bir değer almadığı ve yönünün tanımlanmadığı, düğüm ve hatların sınıflandırılmadığı graflara *basit graf* denir. Bu açıdan yukarıdaki graf bir basit graftır.

Tanım. İki yada daha fazla düğüm arasında birden fazla hat (paralel hatlar) varsa bu tür graflara *çoklu (multi) graf* denir. Çoklu graflar da yönsüz ve çevrimsizdir. Şekil 23.4.

Tanım. Pseudo Graflar: Çevrim içeren çoklu graflardır. Yönlendirilmemiş grafların en genel halidir. Şekil 23.5.




Figure 23.5: A pseudograph.
Şekil 23.5: Bir pseudo graf.

Tanım. Eğer $e = (v, w)$ yönlendirilmemiş bir G grafinin bir kenarı ise u ve v köşelerine G 'de *komşu* denir.

Tanım. Yönlendirilmemiş bir grafta bir köşenin derecesi, o köşeye bağlı olan kenarların sayısı kadardır. Ayrıca bir köşede bulunan bir çevrimin (halkanın), o köşenin derecesine katkısı 2 dir. Bir v köşesinin derecesi $\deg(v)$ ile gösterilir.

Örnek 23.2. Şekil 23.6. H ve G graflarındaki köşelerin derecelerini belirtiniz.

çözüm:

G	
$\deg(a) = 2$	
$\deg(b) = 4$	
$\deg(c) = 4$	
$\deg(d) = 1$	
$\deg(e) = 3$	
$\deg(f) = 4$	
$\deg(g) = 0$	

H	
$\deg(a) = 3$	
$\deg(b) = 6$	
$\deg(c) = 1$	
$\deg(d) = 5$	
$\deg(e) = 5$	

Tanım. Hat bağlantısı olmayan düğümlere *izole yada ayrık düğüm (isolated vertex)* denir. Ayrık düğümler hiçbir köşeye komşu değildir ve *dereceleri "0" dır*. G grafindeki g köşesi bir ayrık düğümdür.

Tanım. Derecesi "1" olan köşeye *pendant* denir. Bir pendant sadece *tek* bir köşeye komşudur. G grafindeki d köşesi bir pendanttır.




Figure 23.6: Two graphs referred to in example 23.2.
Şekil 23.6:

Theorem 23.1. Let $G = (V, E)$ be a pseudograph and let $n(E)$ denote the number of edges in G . Then

$$n(E) = \frac{1}{2} \sum_{v \in V} \deg(v).$$

Example 23.3. A graph has 10 vertices, each of degree 4. How many edges does this graph have?

solution:

Suppose that $V = \{v_1, \dots, v_{10}\}$. Then by Theorem 23.1, we have that

$$\begin{aligned} n(E) &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{10} \deg(v_i) \\ &= \frac{1}{2} (\deg(v_1) + \deg(v_2) + \dots + \deg(v_{10})) \\ &= \frac{1}{2} (4 + 4 + \dots + 4) = \frac{1}{2} (40) = 20. \end{aligned}$$

Therefore this graph has 20 edges.




Figure 23.7: A directed graph.
Şekil 23.7:

Definition. If the edges in a graph have directions, the graph is called a **directed graph** (or **digraph**). This direction indicates where the connection starts and ends. See figure 23.7.

Theorem 23.1. $G = (V, E)$ bir pseudo graf ve $n(E)$ de bu grafın kenar sayısı olsun. O halde,

$$n(E) = \frac{1}{2} \sum_{v \in V} \deg(v).$$

Örnek 23.3. Her köşesinin derecesi 4 olan 10 köşeli bir grafın kaç kenarı vardır?

çözüm:

$n(E)$ kenar sayısını $v_i, i = 1, 2, \dots, 10$ köşeleri belirtmek üzere bu grafın toplam köşe sayısı: $\sum_{i=1}^{10} \deg(v_i) = \sum_{i=1}^{10} 4 = 40$ dir. Teorem 23.1 den $n(E) = \frac{40}{2} = 20$ bulunur.




Figure 23.10: A directed multigraph
Şekil 23.10:

Tanım. Eğer bir graftaki hatlar yön bilgisine sahipse bu tür graflara **yönlü graf** (**Directed graph** / **Digraph**) denir. Bu yön bilgisi bağlantının nereden başlayıp nereden bittiğini belirtir. Yön bilgisi olan graflarda düğümler arasındaki bağlantının yönü vardır. Şekil 23.7.

Tanım. Eğer yönlü bir grafta iki yönde de bağlantı varsa ters yönde iki ayrı hat kullanılır ve bu tür graflara **çoklu yönlü graf** denir. Şekil 23.10.

Definition. If a directed graph has parallel edges, it is called a **directed multigraph** (or **multidigraph**). See figure 23.10.

Remark. In a graph, all edges are the same type. So either all edges are directed or all edges are undirected. A graph representing the road network is an example of a directed graphs, where traffic is one-way or bi-directional. See figure 23.14 on 128.

Notation. Let G be a directed graph. Now when we write $e = (u, v)$, the order of u and v is important. The edge $e = (u, v)$ starts at u and finishes at v .

Definition. Let G be a directed graph. The **indegree** of a number vertex v is

$\deg^-(v)$ = the number of edges coming **into** v

and the **outdegree** of v is

$\deg^+(v)$ = the number of edges coming **out** of v .

A loop is counted as 1 for both $\deg^-(v)$ and $\deg^+(v)$.

Example 23.4. Please see figure 23.11. Find the indegree and outdegree of each vertex in this graph.

solution:

The indegrees are:

$$\deg^-(a) = \langle 2 \rangle 2, \quad \deg^-(b) = \langle 2 \rangle 2, \quad \deg^-(c) = \langle 2 \rangle 3$$

$$\deg^-(d) = \langle 2 \rangle 2, \quad \deg^-(e) = \langle 2 \rangle 3, \quad \deg^-(f) = \langle 2 \rangle 0$$

The outdegrees are:

$$\deg^+(a) = \langle 3 \rangle 4, \quad \deg^+(b) = \langle 3 \rangle 1, \quad \deg^+(c) = \langle 3 \rangle 2$$

$$\deg^+(d) = \langle 3 \rangle 2, \quad \deg^+(e) = \langle 3 \rangle 3, \quad \deg^+(f) = \langle 3 \rangle 0.$$

Theorem 23.2. Let $G = (V, E)$ be a directed graph and let $n(E)$ denote the number of edges in G . Then

$$n(E) = \sum_{v \in V} \deg^-(v) = \sum_{v \in V} \deg^+(v).$$

Definition. A simple graph which includes all possible edges is called a **complete graph**.

Remark. In a complete graph, every vertex has an edge with every other vertex. A complete graph with n vertices is denoted by K_n . The degree of every vertex in K_n is $(n - 1)$. Thus K_n has a total of $\frac{n(n-1)}{2}$ edges. Please see figure 23.16 on page 129.

Definition. A **planar graph** is a graph that can be drawn on the plane in such a way that its edges intersect only at their endpoints. Please see figure 23.15 for an example.

Definition. A graph that is not a planar graph is called a **three-dimensional graph**. See figure 23.12.

Not. Graf yapısında bütün kenarlar aynı çeşittir. Yani ya hepsi yönlüdür ya da değildir. Yol ağını temsil eden bir grafa trafiğin tek yada çift yönlü oluşu yönlü graflar için bir örnektir. Şekil 23.14.

Bir graftaki herhangi bir **düğümün derecesi**, kendisini diğer düğümlere birleştiren hatların sayısı kadardır. Bu düğümlerden derecesi en büyük olanı ise, aynı zamanda **grafın derecesini** belirler. Düğüm noktalarındaki **çevrim** düğüm derecesine iki kere katılır.

G , yönlendirilmiş bir graf olsun. Bu grafın kenarları $e(u, v)$ şeklinde **sıralı ikililerle** gösterilir. Burada u 'ya **v 'nin komşusu** ve $e(u, v)$ 'nin **başlangıç köşesi**; v 'ye ise **u 'nun komşusu** ve $e(u, v)$ 'nin **bitiş köşesi** denir. Çevrimlerin başlangıç ve bitiş köşesi aynıdır.

Yönlendirilmiş kenarlı bir gratta v köşesine gelen kenar sayısı (in-degree) $\deg^-(v)$, v köşesinden çıkan kenar sayısı ise (out-degree) $\deg^+(v)$ ile gösterilir. Bir çevrimin hem $\deg^-(v)$ 'ye hem de $\deg^+(v)$ 'ye katkısı "1" dir.




Figure 23.11: The graph referred to in example 23.4.

Şekil 23.11: 8

Örnek 23.4. Şekil 23.11. Şekildeki yönlendirilmiş G grafının $\deg^-(v)$ ve $\deg^+(v)$ değerlerini bulunuz.

çözüm:

G 'nin $\deg^-(v)$ değerleri;

$$\deg^-(a) = \langle 2 \rangle 2, \quad \deg^-(b) = \langle 2 \rangle 2, \quad \deg^-(c) = \langle 2 \rangle 3$$

$$\deg^-(d) = \langle 2 \rangle 2, \quad \deg^-(e) = \langle 2 \rangle 3, \quad \deg^-(f) = \langle 2 \rangle 0$$

G 'nin $\deg^+(v)$ değerleri;

$$\deg^+(a) = \langle 3 \rangle 4, \quad \deg^+(b) = \langle 3 \rangle 1, \quad \deg^+(c) = \langle 3 \rangle 2$$

$$\deg^+(d) = \langle 3 \rangle 2, \quad \deg^+(e) = \langle 3 \rangle 3, \quad \deg^+(f) = \langle 3 \rangle 0.$$

Theorem 23.2. $G = (V, E)$ yönlendirilmiş bir graf ve $n(E)$

Definition. Suppose that $n \geq 3$, that $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ and that $E = \{(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_{n-1}, v_n), (v_n, v_1)\}$. Then the graph $C_n = (V, E)$ is called a **cycle graph**. Please see figure 23.17 on page 129.

Definition. If we take C_n and add a new vertex which is attached to all the other vertices, we get the **wheel graph** W_n . Please see 23.18 on page 129.

Bipartite Graphs

Definition. A **bipartite graph** is a graph where the set V of vertices can be divided into two distinct subsets V_1 and V_2 such that every edge connects a vertex in V_1 with a vertex in V_2 .

Remark. In a bipartite graph, there are no edges going from V_1 to V_1 , or from V_2 to V_2 .




Figure 23.8: A bipartite graph.
Şekil 23.8:

Example 23.5. Please see figure 23.8. Note that the graph C_6 is a bipartite graph because if we let $V_1 = \{v_1, v_2, v_3\}$ and $V_2 = \{v_4, v_5, v_6\}$, then every edge goes from V_1 to V_2 .

Example 23.6. Please see figures 23.9 and 23.13. Is G a bipartite graph? Is H a bipartite graph?

solution: G is a bipartite graph because we can set $V_1 = \{a, b, d\}$ and $V_2 = \{c, e, f, g\}$. Note that each edge connects V_1 to V_2 . The lack of an edge here between some vertices does not affect it being bipartite. For example, vertices b and g are not neighbours.

Graph H is not bipartite because the set of vertices cannot be divided into two subsets without an edge between the two corners within the same set.

bu grafin kenar sayısı olsun. O halde,

$$n(E) = \sum_{v \in V} \deg^-(v) = \sum_{v \in V} \deg^+(v).$$

Tanım. Graftaki her bir düğümün diğer tüm düğümlerle arasında bir hat mevcutsa, yani olabilecek tüm hatlara sahipse, bu tür graflara **tam(tamamlanmış) graf** denir.

Not. Bu tür bir grafta bütün düğümlerin dereceleri birbirine eşit ve toplam düğüm sayısının bir eksiği kadardır. n düğümlü bir tamamlanmış graf K_n ile gösterilir ve grafin hat sayısı $\frac{n(n-1)}{2}$ ile hesaplanır. Şekil 23.16.

Tanım. Birbirini kesmeyen hatlardan oluşacak şekilde çizilebilen graflara **düzlemsel graf** denir. Şekil 23.15.

Tanım. Birbirini kesmeyen hatlardan oluşacak şekilde çizilemeyen, sadece üç boyutlu uzayda ele alındığında hatlarının birbirini kesmeyecek şekilde çizilmesi mümkün olan graflara **üç boyutlu graf** denir. Şekil 23.12.

Tanım. $n \neq 3$ olmak üzere n tane $v_1, v_2, \dots, v_n$ köşelerinden ve $v_1, v_2, v_2, v_3, \dots, v_{n-1}, v_n, v_n, v_1$ kenarlarından oluşan graflar çember olarak adlandırılır ve C_n ile gösterilir. Şekil 23.17.

Tanım. $n \neq 3$ olmak üzere C_n çemberindeki tüm köşelere bağlı yeni bir köşe daha eklenerek oluşturulan graf tekerlek (wheel) olarak adlandırılır ve W_n ile gösterilir. Şekil 23.18.

Tanım. G basit grafinin köşelerinin kümesi olan V kümesi, boş olmayan V_1 ve V_2 gibi iki köşeye ayrılabilir ve grafin her kenarı V_1 'in bir köşesini V_2 'nin bir köşesine bağlıyorsa G basit grafına **iki parçalı(bipartit) graf** denir. Bipartit graf, V_1 'in eleman sayısı m , V_2 'nin eleman sayısı n olmak üzere $G_{m,n}$ ile gösterilir.

Not. G grafindeki hiçbir kenar V_1 kümesindeki köşeleri veya V_2 kümesindeki köşeleri kendi aralarında bağlamaz.

Örnek 23.5. Şekil 23.8. 'deki C_6 grafi bipartittir, çünkü köşelerinin kümesi kendi içinde $V_1 = \{v_1, v_2, v_3\}$ ve $V_2 = \{v_4, v_5, v_6\}$ olarak iki kümeye parçalanabiliyor. C_6 'nın her kenarı V_1 'deki bir köşeyi V_2 'deki bir köşeye bağlıyor.

Örnek 23.6. Şekil 23.9 ve 23.13. Şekildekiş G ve H grafları bipartit midir?

çözüm: G grafi bipartittir, çünkü köşelerinin kümesi ayrı iki a, b, d ve c, e, f, g kümelerinin birleşimi ile oluşuyor ve her kenar bu kümelerin birindeki en az bir köşeyi diğer kümedeki en az bir köşeye bağlıyor. Burada bazı köşeler arasında bağ olmaması bipartitliği etkilemez. Örneğin, b ve g göşeleri komşu değildir.

H grafi bipartit değildir, çünkü aynı küme içindeki iki köşe arasında bir kenar olmaksızın köşelerin kümesi iki alt kümeye ayrılamaz.




Figure 23.9: A graph referred to in example 23.6.
Şekil 23.9:




Figure 23.12: A three-dimensional graph.
Şekil 23.12: Üç Boyutlu Graf




Figure 23.13: A graph referred to in example 23.6.
Şekil 23.13:




Figure 23.14: A small part of a road network.
Şekil 23.14: Yol ağını.




Figure 23.15: The graph on the left can also be drawn as shown on the right. Thus this is a planar graph.
Şekil 23.15: Soldaki graf, kesilmeyen kenerlerden (het) oluşacak sehilde sağdaki gibi de çizilebilir.




Figure 23.16: The first six complete graphs.
Şekil 23.16:




Figure 23.17: The first 4 cycle graphs.
Şekil 23.17:




Figure 23.18: The first 4 wheel graphs.
Şekil 23.18:

Walks

Definition. A *walk* is a list $v_0, e_1, v_1, \dots, e_k, v_k$ of vertices and edges such that for $1 \leq i \leq k$, the edge e_i has endpoints v_{i-1} and v_i .

Example 23.7. Consider figure 23.21.

$a, e_1, b, e_5, e, e_4, d, e_3, c, e_6, f, e_7, g, e_7, f$

is a walk in this graph.

Definition. An *Eulerian trail* is a walk such that

- (i). no edge is repeated; and
- (ii). every edge is included.




Figure 23.19: The graph referred to in example 23.8.

Şekil 23.19:

Example 23.8. Consider figure 23.19. The walk

$d, e_5, e, e_6, a, e_7, f, e_8, b, e_1, a, e_4, d, e_3, c, e_{10}, g, e_9, b, e_2, c$

is an Eulerian trail. Each of the ten edges appears once and only once in this list.

Remark. The Königsberg bridge problem can be rephrased as:

Does there exist an Eulerian trail in Königsberg?

Definition. A graph is *connected* if there exists a walk between every pair of vertices.

Example 23.9. In figure 23.6 on page 124, graph H is connected, but graph G is not connected.

Yol

Tanım. Bir *yol*, köşe ve kenarların $v_0, e_1, v_1, \dots, e_k, v_k$ şeklindeki bir listesidir öyle ki her $1 \leq i \leq k$ için e_i kenarını v_{i-1} ve v_i köşeleri ile bağlar.




Figure 23.21: The graph referred to in example 23.7.

Şekil 23.21:

Örnek 23.7. 23.21 şeklini ele alalım.

$a, e_1, b, e_5, e, e_4, d, e_3, c, e_6, f, e_7, g, e_7, f$

bu graf için bir yoldur.

Tanım. *Euler yolu*,

- (i). hiçbir köşenin tekrarlanmadığı, ve
- (ii). tüm kenarları içeren bir yoldur.

Örnek 23.8. 23.19 şeklini ele alalım.

$d, e_5, e, e_6, a, e_7, f, e_8, b, e_1, a, e_4, d, e_3, c, e_{10}, g, e_9, b, e_2, c$

yolu bir Euler yoludur. On kenarın her biri bu listede bir ve sadece bir kez görünür.

Not. Königsberg köprüsü problemi şu şekilde de sorulabilir: b

Königsberg köprüsü bir Euler yolu oluşturur mu??

Tanım. Farklı köşelerin her çifti arasında bir yol varsa bu grafa *bağlantılı* graf denir.

Örnek 23.9. 124 sayfasındaki 23.6 graflarından, H bağlantılıdır, fakat G bağlantılı değildir.

Theorem 23.3. *Let G be a connected graph. Then there exists an Eulerian trail if and only if the number of vertices of odd degree is either 0 or 2.*

Furthermore, if G has 2 vertices of odd degree, then the Eulerian trail must start and finish at these two vertices.

Example 23.10. Please consider figure 23.16 on page 129. Note that in K_3 and K_5 , every vertex has even degree. So there is an Eulerian trail in K_3 and in K_5 .

Notice further that all four vertices in K_4 are of odd degree. This means that K_4 does not contain an Eulerian trail.

Example 23.11. Please consider figure 23.19 again. Note that

$$\begin{aligned} \deg(a) = 4, \deg(b) = 4, \deg(c) = 3, \deg(d) = 3, \\ \deg(e) = 2, \deg(f) = 2, \deg(g) = 2. \end{aligned}$$

Two of the vertices have odd degree, c and d . So there must exist an Eulerian trail and it must start and end at c and d . (In example 23.8 we have already found such a trail.)




Figure 23.20: A graph of the seven bridges of Königsberg.
Şekil 23.20:

Example 23.12 (The Königsberg Bridge Problem). Now consider Königsberg as shown in figure 23.20. Note that

$$\deg(a) = 3, \quad \deg(b) = 5, \quad \deg(c) = 3, \quad \deg(d) = 3.$$

Since all four vertices have odd degree, there does not exist an Eulerian trail in Königsberg.

Therefore it was not possible to walk around the city of Königsberg and cross each bridge once.

Teorem 23.3. *G bağlı bir graf olsun. Bir Eulerian yolunun var olması için gerek ve yeter koşul tek dereceli köşelerin sayısının 0 ya da 2 olmasıdır.*

Dahası, Eğer G tek dereceli iki köşeye sahipse, Euler yolu

Örnek 23.10. Please consider figure 23.16 on page 129. Note that in K_3 and K_5 , every vertex has even degree. So there is an Eulerian trail in K_3 and in K_5 .

Notice further that all four vertices in K_4 are of odd degree. This means that K_4 does not contain an Eulerian trail.

Örnek 23.11. Please consider figure 23.19 again. Note that

$$\begin{aligned} \deg(a) = 4, \deg(b) = 4, \deg(c) = 3, \deg(d) = 3, \\ \deg(e) = 2, \deg(f) = 2, \deg(g) = 2. \end{aligned}$$

Two of the vertices have odd degree, c and d . So there must exist an Eulerian trail and it must start and end at c and d . (In example 23.8 we have already found this trail.)

Örnek 23.12 (The Königsberg Bridge Problem). Now consider Königsberg as shown in figure 23.20. Note that

$$\deg(a) = 3, \quad \deg(b) = 5, \quad \deg(c) = 3, \quad \deg(d) = 3.$$

Since all four vertices have odd degree, there does not exist an Eulerian trail in Königsberg.

Therefore it was not possible to walk around the city of Königsberg and cross each bridge once.

Euler’s Formula for Polyhedra

Euler’s formula is

$n(V) - n(E) + n(F)$

where

- $n(V)$ = number of vertices
- $n(E)$ = number of edges
- $n(F)$ = number of faces.

Euler’in Çok Yüzlü Cisim Formülü

Euler’s formula is

$n(V) - n(E) + n(F)$


where


- $n(V)$ = number of vertices
- $n(E)$ = number of edges
- $n(F)$ = number of faces.

	cube küp	tetrahedron dört yüzlü	pyramid piramit	dodecahedron oniki yüzlü (12 pentagons)	football futbol topu (12 pentagons & 20 hexagons)
$n(V)$	8	4	5	20	60
$n(E)$	12	6	8	30	90
$n(F)$	6	4	5	12	32
$n(V) - n(E) + n(F)$	$8 - 12 + 6 = 2$	$4 - 6 + 4 = 2$	$5 - 8 + 5 = 2$	$20 - 30 + 12 = 2$	$60 - 90 + 32 = 2$

Remark. It looks like: If we have a polyhedron without any holes in it, we always get that Euler’s formula is equal to 2? Is this true, and if so, how can we prove it?

Not. If we have a polyhedron without any holes in it, is Euler’s formula always equal to 2? And if so, how can we prove it?






Every three dimensional polyhedron (without holes) is equivalent to a connected, planar, simple graph. So if we know something about these graphs, then we also know it about polyhedra. So what do we know about connected, planar, simple graphs?

Every three dimensional polyhedron is equivalent to a connected, planar, simple graph. So if we know something about these graphs, then we also know it about polyhedra. What do we know about such graphs?

Let us start with the first complete graph:

Let us start with the first complete graph:



This graph, K_1 , is called the *trivial graph*. It has one vertex, zero edges and one face. So


This graph, K_1 , is called the *trivial graph*. It has one vertex, zero edges and one face. So

$$n(V) - n(E) + n(F) = 1 - 0 + 1 = 2.$$

$$n(V) - n(E) + n(F) = 1 - 0 + 1 = 2.$$


Now let us take any connected, planar, simple graph. How can we simplify this graph? We can remove a pendant vertex (a vertex v with $\deg(v) = 1$) and its edge.

Now let us take any connected, planar, simple graph. How can we simplify this graph? We can remove a pendant vertex (a vertex v with $\deg(v) = 1$) and its edge.



Then we still have a connected, planar, simple graph and we have decreased $n(V)$ by 1 *and* we have decreased $n(E)$ by 1. So $n(V) - n(E) + n(F)$ stays the same.


We can also remove an edge which separates two faces. E.g.



As before, we still have a connected, planar, simple graph. Moreover, we have decreased $n(E)$ by 1 *and* we have decreased $n(F)$ by 1. So again, $n(V) - n(E) + n(F)$ stays the same.

Then we still have a connected, planar, simple graph and we have decreased $n(V)$ by 1 *and* we have decreased $n(E)$ by 1. So $n(V) - n(E) + n(F)$ stays the same.

We can also remove an edge which separates two faces. E.g.



As before, we still have a connected, planar, simple graph. Moreover, we have decreased $n(E)$ by 1 *and* we have decreased $n(F)$ by 1. So again, $n(V) - n(E) + n(F)$ stays the same.

Because we can reduce every connected, planar, simple graph to the trivial graph, every such graph must have the same $n(V) - n(E) + n(F)$ number as the trivial graph. Therefore:

Theorem 23.4. *If G is a connected, planar, simple graph, then*

$$n(V) - n(E) + n(F) = 2.$$

... and the same is true for polyhedra without holes.

Because we can reduce every connected, planar, simple graph to the trivial graph, every such graph must have the same $n(V) - n(E) + n(F)$ number as the trivial graph. Therefore:

Theorem 23.4. *If G is a connected, planar, simple graph, then*

$$n(V) - n(E) + n(F) = 2.$$

... and the same is true for polyhedra without holes.

Problems

Problem 23.1 (Drawing Graphs). Draw the graph $G = (V, E)$ where $V = \{a, b, c, d, e\}$ and

- (a). $E = \{e_1 = (a, b), e_2 = (b, c), e_3 = (c, d), e_4 = (d, e)\}$.
- (b). $E = \{e_1 = (a, b), e_2 = (b, c), e_3 = (c, d), e_4 = (d, e), e_5 = (a, e), e_6 = (b, d), e_7 = (b, e), e_8 = (a, d)\}$.
- (c). $E = \{e_1 = (b, c), e_2 = (d, e), e_3 = (c, d), e_4 = (a, c), e_5 = (b, d), e_6 = (c, e), e_7 = (a, d), e_8 = (b, e)\}$.

Problem 23.2 (Counting Edges). How many edges do the following graphs have?

- (a). K_n
- (b). K_{nm}
- (c). C_n
- (d). W_n
- (e). Q_n
- (f). the trivial graph

Problem 23.3 (Planar Graphs). Please see figures 23.9 and 23.13 on page 127. Are these planar graphs? Prove your answer.

Problem 23.4 (Bipartite Graphs). Are the following graphs bipartite graphs?

- (a). Q_2
- (b). Figure 23.12
- (c). Figure 23.19
- (d). Figure 23.21
- (e). Figure 23.22
- (f). Figure 23.23

Problem 23.5 (Euler's Formula). Draw a graph which does not satisfy $n(V) - n(E) + n(F) = 2$.

Problem 23.6 (Eulerian trails). Consider the two graphs below. For each graph, answer the question: Does this graph contain an Eulerian trail? If "yes", give an example of an Eulerian trail in that graph. If "no", explain how we know that it does not contain an Eulerian trail.

- (a). Figure 23.22.
- (b). Figure 23.23.




Figure 23.22: A graph referred to in exercise 23.6.
Şekil 23.22:

Sorular

Soru 23.1 (Drawing Graphs). Draw the graph $G = (V, E)$ where $V = \{a, b, c, d, e\}$ and

- (a). $E = \{e_1 = (a, b), e_2 = (b, c), e_3 = (c, d), e_4 = (d, e)\}$.
- (b). $E = \{e_1 = (a, b), e_2 = (b, c), e_3 = (c, d), e_4 = (d, e), e_5 = (a, e), e_6 = (b, d), e_7 = (b, e), e_8 = (a, d)\}$.
- (c). $E = \{e_1 = (b, c), e_2 = (d, e), e_3 = (c, d), e_4 = (a, c), e_5 = (b, d), e_6 = (c, e), e_7 = (a, d), e_8 = (b, e)\}$.

Soru 23.2 (Counting Edges). Asagidaki graflarin kener sayilarini bulunuz.

- (a). K_n
- (b). K_{nm}
- (c). C_n
- (d). W_n
- (e). Q_n
- (f). the trivial graph

Soru 23.3 (Planar Graphs). Please see figures 23.9 and 23.13 on page 127. Are these planar graphs? Prove your answer.

Soru 23.4 (Bipartite Graphs). Are the following graphs bipartite graphs?

- (a). Q_2
- (b). Figure 23.12
- (c). Figure 23.19
- (d). Figure 23.21
- (e). Figure 23.22
- (f). Figure 23.23

Soru 23.5 (Euler's Formula). Draw a graph which does not satisfy $n(V) - n(E) + n(F) = 2$.

Soru 23.6 (Eulerian trails). Consider the two graphs below. For each graph, answer the question: Does this graph contain an Eulerian trail? If "yes", give an example of an Eulerian trail in that graph. If "no", explain how we know that it does not contain an Eulerian trail.

- (a). Figure 23.22.
- (b). Figure 23.23.




Figure 23.23: A graph referred to in exercise 23.6.
Şekil 23.23:

Part IV

Calculus

24

Limits

Limit




Figure 24.1: The function $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$.

Şekil 24.1: $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ fonksiyonu.

x	$f(x)$
0.9	1.9
1.1	2.1
0.99	1.99
1.01	2.01
0.999	1.999
1.001	2.001

Table 24.1: Some values of $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$.

Tablo 24.1: $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ 'nin bazı değerleri.

Consider the function $f : (-\infty, 1) \cup (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ as shown in figure 24.1.

Question: How does f behave when x is close to 1?

We can see from table 24.1 that:

“If x is close to 1, then $f(x)$ is close to 2.”

Mathematically, we write this as

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$$

and read it as “the limit, as x tends to 1, of $f(x)$ is equal to 2”.

$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ ile tanımlı $f : (-\infty, 1) \cup (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ nın bazı değerleri şekil 24.1 de veriliyor.

Soru: x , 1’e yakın olduğunda f nasıl davranıyor?

Tablo 24.1 den şu gözlemi yapabiliriz:

“ x , 1’e yakınsa, $f(x)$ de, 2’ye yakın olur.”


Matematiksel olarak, bunu

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$$


olarak yazarız ve x , 1 e yakaşırken, $f(x)$ in limiti 2’ye eşittir olarak okuruz.

Example 24.1. Consider the following three functions:


Örnek 24.1. Aşağıdaki üç fonksiyonu inceleyecek olursak:



$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$



$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1} & x \neq 1 \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$



$$h(x) = x + 1$$

Note that

- $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$, but f is not defined at $x = 1$;
- $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$, but $g(1) \neq 2$; and
- $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 2$ and $h(1) = 2$.

- $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$, fakat f , $x = 1$ de tanımlı değildir;
- $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$, fakat $g(1) \neq 2$; ve
- $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 2$ ve $h(1) = 2$.

olduğuna dikkat edelim.




Figure 24.2: The Identity Function
Şekil 24.2: Özdeş fonksiyon.




Figure 24.3: A Constant Function
Şekil 24.3: Sabit fonksiyon.

Example 24.2 (The Identity Function). $f(x) = x$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$$

Example 24.3 (A Constant Function). $f(x) = 13$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} 13 = 13$$

Örnek 24.2 (Birim Fonksiyon). $f(x) = x$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$$

Örnek 24.3 (Sabit Fonksiyon). $f(x) = 13$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} 13 = 13$$




Figure 24.4: A graph of the function $u(x)$.
Şekil 24.4: $u(x)$ fonksiyonunun bir grafiği.




Figure 24.5: A graph of the function $v(x)$.
Şekil 24.5: $v(x)$ fonksiyonunun bir grafiği.

Example 24.4 (Sometimes Limits Do Not Exist). Consider the functions

$$u(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases} \quad \text{and} \quad v(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \sin \frac{1}{x} & x > 0 \end{cases}$$

as shown in figures 24.4 and 24.5.

Note that $\lim_{x \rightarrow 0} u(x)$ does not exist. To understand why, we consider x close to 0:

- If x is close to 0 and $x < 0$, then $u(x) = 0$.
- If x is close to 0 and $x > 0$, then $u(x) = 1$.

Because 0 is not close to 1, the limit as $x \rightarrow 0$ can not exist.

Moreover $\lim_{x \rightarrow 0} v(x)$ does not exist because $v(x)$ oscillates up and down too quickly if $x > 0$ and $x \rightarrow 0$.

Örnek 24.4 (Limit Her Zaman Mevcut Olmayabilir). Şu fonksiyonları inceleyelim

$$u(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases} \quad \text{ve} \quad v(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \sin \frac{1}{x} & x > 0 \end{cases}$$

bakınız şekil 24.4 ve 24.5.

$\lim_{x \rightarrow 0} u(x)$ limitinin mevcut olmadığına dikkat ediniz. Bunun neden mevcut olmadığını anlamak için, x 'in 0'a çok yakın olduğunu düşünelim:

- x , 0'a çok yakın ve $x < 0$ iken, $u(x) = 0$ dır.
- x , 0'a çok yakın ve $x > 0$ iken, $u(x) = 1$ olur.

0, 1'e çok yakın olmadığı için, $x \rightarrow 0$ iken limit mevcut değildir.

Ayrıca, $x > 0$ ve $x \rightarrow 0$ iken, $v(x)$, çok hızlı bir şekilde yukarıya ve aşağıya doğru salınır, çünkü $\lim_{x \rightarrow 0} v(x)$ mevcut değildir.

Theorem 24.1 (The Limit Laws). *Suppose that*

- $L, M, c, k \in \mathbb{R}$;
- f and g are functions;
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$; and
- $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$.

Then

(i). **Sum Rule:**

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M;$$

(ii). **Difference Rule:**

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = L - M;$$

(iii). **Constant Multiple Rule:**

$$\lim_{x \rightarrow c} (kf(x)) = kL;$$

(iv). **Product Rule:**

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x)g(x)) = LM;$$

(v). **Quotient Rule:** if $M \neq 0$, then

$$\lim_{x \rightarrow c} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{L}{M};$$

(vi). **Power Rule:** if $n \in \mathbb{N}$, then

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x))^n = L^n;$$

(vii). **Root Rule:** if $n \in \mathbb{N}$ and $\sqrt[n]{L}$ exists, then

$$\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L} = L^{\frac{1}{n}}.$$

Teorem 24.1 (Limit Kuralları). *Varsayalım ki*

- $L, M, c, k \in \mathbb{R}$;
- f ve g iki fonksiyon;
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$; ve
- $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$ olsun.

O halde

(i). **Toplam Kuralı:**

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M;$$

(ii). **Fark Kuralı:**

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = L - M;$$

(iii). **Sabitli Çarpım Kuralı:**

$$\lim_{x \rightarrow c} (kf(x)) = kL;$$

(iv). **Çarpım Kuralı:**

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x)g(x)) = LM;$$

(v). **Bölüm Kuralı:** $M \neq 0$, ise

$$\lim_{x \rightarrow c} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{L}{M};$$

(vi). **Kuvvet Kuralı:** $n \in \mathbb{N}$, ise

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x))^n = L^n;$$

(vii). **Kök Kuralı:** if $n \in \mathbb{N}$ ve $\sqrt[n]{L}$ mevcutsa, then

$$\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L} = L^{\frac{1}{n}}.$$

Example 24.5. Find $\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 + 4x^2 - 3)$.

solution:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} (x^3 + 4x^2 - 3) &= \left(\lim_{x \rightarrow 2} x^3 \right) + \left(\lim_{x \rightarrow 2} 4x^2 \right) - \left(\lim_{x \rightarrow 2} 3 \right) \\ &\quad \text{(sum and difference rules)} \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 2} x \right)^3 + 4 \left(\lim_{x \rightarrow 2} x \right)^2 - \left(\lim_{x \rightarrow 2} 3 \right) \\ &\quad \text{(power and constant multiple rules)} \\ &= 2^3 + 4(2^2) - 3 = 21. \end{aligned}$$

Example 24.7. Find $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^4 + x^2 - 1}{x^2 + 5}$.

Örnek 24.6. $\lim_{x \rightarrow 6} 8(x-5)(x-7)$ limitini bulunuz.

çözüm:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 6} 8(x-5)(x-7) &= 8 \lim_{x \rightarrow 6} (x-5)(x-7) \\ &\quad \text{(sabitli çarpım kuralı)} \\ &= 8 \left(\lim_{x \rightarrow 6} (x-5) \right) \left(\lim_{x \rightarrow 6} (x-7) \right) \\ &\quad \text{(çarpım kuralı)} \\ &= 8(1)(-1) = -8. \end{aligned}$$

Örnek 24.8. $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2 + 3x - 11}{x + 6}$ limitini bulunuz.

solution:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^4 + x^2 - 1}{x^2 + 5} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 5} (x^4 + x^2 - 1)}{\lim_{x \rightarrow 5} (x^2 + 5)} \\
 &\text{(quotient rule)} \\
 &= \frac{\lim_{x \rightarrow 5} x^4 + \lim_{x \rightarrow 5} x^2 - \lim_{x \rightarrow 5} 1}{\lim_{x \rightarrow 5} x^2 + \lim_{x \rightarrow 5} 5} \\
 &\text{(sum and difference rules)} \\
 &= \frac{5^4 + 5^2 - 1}{5^2 + 5} \\
 &\text{(power rule)} \\
 &= \frac{649}{30}.
 \end{aligned}$$

Theorem 24.2 (Limits of Polynomial Functions). If $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ is a polynomial function, then

$$\lim_{x \rightarrow c} P(x) = P(c).$$

Theorem 24.3 (Limits of Rational Functions). If $P(x)$ and $Q(x)$ are polynomial functions and if $Q(c) \neq 0$, then

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}.$$

Example 24.9.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{(-1)^3 + 4(-1)^2 - 3}{(-1)^2 + 5} = \frac{0}{6} = 0.$$

Eliminating Zero Denominators Algebraically

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)}$$

What can we do if $Q(c) = 0$?

Example 24.11.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x}$$

If we just put in $x = 1$, we would get “ $\frac{0}{0}$ ” and we never never want “ $\frac{0}{0}$ ”.

Instead, we try to factor $x^2 + x - 2$ and $x^2 - x$. If $x \neq 1$, we have that

$$\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \frac{(x-1)(x+2)}{x(x-1)} = \frac{x+2}{x}.$$

So

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x} = \frac{1+2}{1} = 3.$$

çözüm:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2 + 3x - 11}{x + 6} &= \frac{\lim_{x \rightarrow -5} (x^2 + 3x - 11)}{\lim_{x \rightarrow -5} (x + 6)} \\
 &\text{(bölüm kuralı)} \\
 &= \frac{\lim_{x \rightarrow -5} x^2 + \lim_{x \rightarrow -5} 3x - \lim_{x \rightarrow -5} 11}{\lim_{x \rightarrow -5} x + \lim_{x \rightarrow -5} 6} \\
 &\text{(toplam ve fark kuralı)} \\
 &= \frac{(-5)^2 - 15 - 11}{-5 + 6} \\
 &\text{(kuvvet kuralı)} \\
 &= \frac{-1}{1} = -1.
 \end{aligned}$$

Teorem 24.2 (Polinomların Limitleri). $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ bir polinom fonksiyonsa,

$$\lim_{x \rightarrow c} P(x) = P(c).$$

Teorem 24.3 (Rasyonel Fonksiyonların Limitleri). $P(x)$ ve $Q(x)$ polinomlar ve $Q(c) \neq 0$ ise, o halde

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}.$$

Örnek 24.10.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{(2)^3 + 4(2)^2 - 3}{(2)^2 + 5} = \frac{8 + 16 - 3}{4 + 5} = \frac{21}{9} = \frac{7}{3}.$$

Sıfır Paydaların Cebirsel Olarak Yok Edilmesi

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)}$$

$Q(c) = 0$ ise ne yapılabilir?

Örnek 24.12.

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2 + 3x - 10}{x^2 + 5x}$$

If we just put in $x = -5$ koyarsak, “ $\frac{0}{0}$ ” buluruz ve unutmayın “ $\frac{0}{0}$ ” asla ve asla istemediğimiz birşey.

Onun yerine, $x^2 + 3x - 10$ ve $x^2 + 5x$ yi çarpalarına ayırırız. $x \neq -5$ ise, şunu buluruz

$$\frac{x^2 + 3x - 10}{x^2 + 5x} = \frac{(x+5)(x-2)}{x(x+5)} = \frac{x-2}{x}.$$

Yani

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2 + 3x - 10}{x^2 + 5x} = \lim_{x \rightarrow -5} \frac{x-2}{x} = \frac{-5-2}{-5} = \frac{7}{5}.$$




Figure 24.6: The Sandwich Theorem
Şekil 24.6: Sandöviç Teoremi

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

The Sandwich Theorem

See figure 24.6.

Theorem 24.4 (The Sandwich Theorem). Suppose that

- $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ for all x “close” to c ($x \neq c$); and
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$.

Then

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L$$

also.

Example 24.13. The inequality

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x} < 1$$

holds for all x close to 0 ($x \neq 0$). Calculate $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x}$.

solution: Since $\lim_{x \rightarrow 0} 1 - \frac{x^2}{6} = 1 - \frac{0}{6} = 1$ and $\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$, it follows by the Sandwich Theorem that $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x} = 1$.

Theorem 24.5. If

- $f(x) \leq g(x)$ for all x close to c ($x \neq c$);
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ exists; and
- $\lim_{x \rightarrow c} g(x)$ exists,

then

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow c} g(x).$$

Sandöviç Teoremi

Bkz. şekil 24.6.

Teorem 24.4 (Sandöviç Teoremi). Varsayalım ki

- c ($x \neq c$) ye “çok yakın” bütün x ler için $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ ve
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$ olsun.

O zaman

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L$$

ifadesi doğrudur.

Örnek 24.13.

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x} < 1$$

eşitsizliği 0 a çok yakın bütün x ler ($x \neq 0$) için doğrudur.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x}$ limitini bulunuz.

çözüm: $\lim_{x \rightarrow 0} 1 - \frac{x^2}{6} = 1 - \frac{0}{6} = 1$ ve $\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$ olduğundan, Sandöviç Teoremi gereğince $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x} = 1$ olarak bulunur.

Teorem 24.5. Eğer

- Her c ye çok yakın (ama $x \neq c$) bütün x ler için $f(x) \leq g(x)$ ise ;
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ mevcutsa ve
- $\lim_{x \rightarrow c} g(x)$ mevcutsa,

o vakit

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow c} g(x)$$

doğru olur.

Problems

Problem 24.1. Consider the function shown in figure 24.7. Decide if each of the following statements is true or false.

- (a). $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ exists, (e). $\lim_{x \rightarrow -1.5} f(x) = -1$,
 (b). $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, (f). $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$,
 (c). $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$, (g). $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} f(x)$ does not exist,
 (d). $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ exists, (h). $\lim_{x \rightarrow -1.5} f(x) = -0.5$.

Problem 24.2. Find the following limits. For each one, state which limit laws or other theorems you are using.

- (a). $\lim_{x \rightarrow -7} (2x + 5)$ (d). $\lim_{x \rightarrow \frac{2}{3}} 3x(2x - 1)$
 (b). $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 3}{x + 6}$ (e). $\lim_{t \rightarrow 5} \frac{t - 5}{t^2 - 25}$
 (c). $\lim_{y \rightarrow -5} \frac{y^2}{y - 5}$ (f). $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - 1}{x - 1}$

Problem 24.3. If $2 - x^2 \leq g(x) \leq 2 \cos x$ for all x , find $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$. State which limit laws or other theorems you are using.

Problem 24.4. Suppose that $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 0$ and $\lim_{x \rightarrow 4} g(x) = -3$. Find the following limits.

- (a). $\lim_{x \rightarrow 4} (g(x)^2)$ (c). $\lim_{x \rightarrow 4} xf(x)$
 (b). $\lim_{x \rightarrow 4} (g(x) + 3)$ (d). $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{g(x)}{f(x) - 1}$




Figure 24.7: The function considered in Exercise 24.1.
 Şekil 24.7:

Sorular

Soru 24.1. Consider the function shown in figure 24.7. Decide if each of the following statements is true or false.

- (a). $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ exists, (e). $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -1$,
 (b). $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, (f). $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$,
 (c). $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$, (g). $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} f(x)$ does not exist,
 (d). $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ exists, (h). $\lim_{x \rightarrow -1.5} f(x) = -0.5$.

Soru 24.2. Aşağıdaki limitleri bulunuz. her birinde, kullandığınız kural ve teoremleri yazınız.

- (g). $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3}{\sqrt{3h + 1} + 1}$
 (h). $\lim_{y \rightarrow 2} \frac{y + 2}{y^2 + 5y + 6}$
 (i). $\lim_{v \rightarrow 2} \frac{v^3 - 8}{v^4 - 16}$

Soru 24.3. Her x için, $2 - x^2 \leq g(x) \leq 2 \cos x$ ise, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ limitini bulunuz. Kullandığınız kural ve teoremleri belirtiniz.

Soru 24.4. $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 0$ ve $\lim_{x \rightarrow 4} g(x) = -3$ olsun. Aşağıdaki limitleri bulunuz.

- (e). $\lim_{x \rightarrow 4} 4f(x) - 2g(x)$
 (f). $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{7f(x) + 6}{2g(x)}$

25

Continuity

Süreklilik





Figure 25.1: A continuous function and a function which is not continuous.

Şekil 25.1: Bir sürekli fonksiyon ve sürekli olmayan bir fonksiyon.

Definition. The function $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ is *continuous at $c \in D$* if

- $f(c)$ exists;
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ exists; and
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Definition. If f is not continuous at c , we say that f is *discontinuous* at c – we say that c is a *point of discontinuity* of f .

Tanım. Şu üç koşulun hepsi sağlanırsa $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu bir $c \in D$ *noktasında süreklidir* denir.

- $f(c)$ tanımlı olacak;
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ mevcut olacak; ve
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Tanım. Eğer f fonksiyonu c de sürekli değilse, f , c de *sürekli değildir* denir – ve c 'ye f 'nin bir *süreksizlik noktası* denir.

Example 25.1. Consider the function $f : [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ which has its graph shown in figure 25.2. Where is f continuous? Where is f discontinuous?

solution:

c	Is f continuous at c ?	Why?
0	Yes	because $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 = f(0)$
$(0, 1)$	Yes	because $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$
1	No	because $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ does not exist
$(1, 2)$	Yes	because $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$
2	No	because $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1 \neq 2 = f(2)$
$(2, 4)$	Yes	because $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$
4	No	because $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 1 \neq \frac{1}{2} = f(4)$





Figure 25.2: The function considered in example 25.1.
Şekil 25.2:

Örnek 25.1. Grafiği şekil 25.2'deki $f : [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonunu ele alalım. Bu f nerede süreklidir? Bu f nerede süreksizdir?

çözüm:


c	f fonksiyonu c de sürekli midir?	Neden?
0	Evet	çünkü $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 = f(0)$
$(0, 1)$	Evet	çünkü $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$
1	Hayır	çünkü $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ does not exist
$(1, 2)$	Evet	çünkü $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$
2	Hayır	çünkü $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1 \neq 2 = f(2)$
$(2, 4)$	Evet	çünkü $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$
4	Hayır	çünkü $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 1 \neq \frac{1}{2} = f(4)$

Example 25.2. $f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$




f is continuous at every $c \in [-2, 2]$.

Example 25.3. $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$



g has a point of discontinuity at $c = 0$. g is continuous at every point $c \neq 0$.

Example 25.4. $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^2(x-2)^2} & x \neq 1 \text{ or } 2 \\ 10 & x = 1 \text{ or } 2 \end{cases}$



h is continuous on $(-\infty, 1)$, $(1, 2)$ and $(2, \infty)$. h has a points of discontinuity at $c = 1$ and $c = 2$.

Örnek 25.2. $f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$
 f fonksiyonu her $c \in [-2, 2]$ noktasında süreklidir.

Örnek 25.3. $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$

g nin $c = 0$. g da bir süreksizlik noktası var ve fonksiyon her $c \neq 0$ için süreklidir.

Örnek 25.4. $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^2(x-2)^2} & x \neq 1 \text{ or } 2 \\ 10 & x = 1 \text{ or } 2 \end{cases}$
 h fonksiyonu $(-\infty, 1)$, $(1, 2)$ ve $(2, \infty)$ aralıklarında süreklidir. h nin $c = 1$ ve $c = 2$ de süreksizlikleri mevcuttur.

Continuous Functions

Definition. $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ is a *continuous function* if it is continuous at every $c \in D$.

Theorem 25.1. If f and g are continuous at c , then $f+g$, $f-g$, kf ($k \in \mathbb{R}$), fg , $\frac{f}{g}$ (if $g(c) \neq 0$) and f^n ($n \in \mathbb{N}$) are all continuous at c . If $\sqrt[n]{f}$ is defined on $(c-\delta, c+\delta)$, then $\sqrt[n]{f}$ is also continuous at c ($n \in \mathbb{N}$).

Example 25.5. Every polynomial

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

is continuous.

Example 25.6. If

- P and Q are polynomials; and
- $Q(c) \neq 0$,

then $\frac{P(x)}{Q(x)}$ is continuous at c .

Example 25.7. $\sin x$ and $\cos x$ are continuous.

Composites

$$g \circ f(x)$$

$g \circ f(x)$ means $g(f(x))$.

Theorem 25.2. If

- f is continuous at c ; and
- g is continuous at $f(c)$,

then $g \circ f$ is continuous at c .

Example 25.8. Show that $h(x) = \sqrt{x^2 - 2x - 5}$ is continuous on its domain.

solution: The function $g(t) = \sqrt{t}$ is continuous by Theorem 25.1. The function $f(x) = x^2 - 2x - 5$ is continuous because all polynomials are continuous. Therefore $h(x) = g \circ f(x)$ is continuous.

Example 25.9. Show that $\frac{x^{\frac{2}{3}}}{1+x^4}$ is continuous.

solution: $x^{\frac{2}{3}}$ and $1+x^4$ are continuous. Because $1+x^4 \neq 0$ for all x , we have that $\frac{x^{\frac{2}{3}}}{1+x^4}$ is continuous.

Sürekli Fonksiyonlar

Tanım. Her $c \in D$ noktasında sürekli olan bir $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonuna *sürekli fonksiyon* denir .

Teorem 25.1. Eğer f ve g fonksiyonları c 'de sürekli iseler, o zaman $f+g$, $f-g$, kf ($k \in \mathbb{R}$), fg , $\frac{f}{g}$ ($g(c) \neq 0$ iken) ve f^n ($n \in \mathbb{N}$) fonksiyonlarının hepsi c 'de sürekli dir. Eğer $\sqrt[n]{f}$ fonksiyonu $(c-\delta, c+\delta)$ aralığında tanımlı ise, $\sqrt[n]{f}$ fonksiyonu da c 'de sürekli dir ($n \in \mathbb{N}$).

Örnek 25.5. Her

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

polinomu da sürekli dir.

Örnek 25.6. If

- P ve Q polinomlar ve
- $Q(c) \neq 0$ ise,

o vakit $\frac{P(x)}{Q(x)}$ rasyonel fonksiyonu c 'de sürekli dir.

Örnek 25.7. $\sin x$ ve $\cos x$ sürekli fonksiyonlardır.

Bileşkeler

$g \circ f(x)$ demek $g(f(x))$ anlamındadır.

Teorem 25.2. Eğer

- f fonksiyonu c 'de sürekli ve
- g fonksiyonu da $f(c)$ 'de sürekli ise,

bu durumda $g \circ f$ fonksiyonu da c 'de sürekli dir.

Örnek 25.8. $h(x) = \sqrt{x^2 - 2x - 5}$ fonksiyonunun tanım kümesinde sürekli olduğunu gösteriniz.

çözüm: Teorem 25.1 den $g(t) = \sqrt{t}$ fonksiyonu sürekli dir. $f(x) = x^2 - 2x - 5$ fonksiyonu da sürekli dir çünkü bütün polinomlar sürekli dir. Bundan ötürü $h(x) = g \circ f(x)$ sürekli olur.

Örnek 25.9. Gösteriniz ki $\frac{x^{\frac{2}{3}}}{1+x^4}$ sürekli dir.

çözüm: $x^{\frac{2}{3}}$ ve $1+x^4$ sürekli dir. Her x için, $1+x^4 \neq 0$ olduğundan, $\frac{x^{\frac{2}{3}}}{1+x^4}$ sürekli dir.




Figure 25.3: Composites of continuous functions are continuous.
Şekil 25.3: Sürekli fonksiyonların bileşkesi de sürekli dir.

Theorem 25.3. *If*

- $g(x)$ is continuous at $x = b$; and
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = b$,

then

$$\lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow c} f(x)\right).$$

Teorem 25.3. *Eğer*

- $g(x)$ fonksiyonu $x = b$ de sürekli ve
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = b$ ise,

o halde

$$\lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow c} f(x)\right).$$

Example 25.10. By Theorem 25.3,

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos \left[2x + \sin \left(\frac{3\pi}{2} + x \right) \right] \\ &= \cos \left[\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(2x + \sin \left(\frac{3\pi}{2} + x \right) \right) \right] \\ &= \cos \left[\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (2x) + \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\sin \left(\frac{3\pi}{2} + x \right) \right) \right] \\ &= \cos \left[\pi + \sin \left(\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{3\pi}{2} + x \right) \right) \right] \\ &= \cos [\pi + \sin 2\pi] = \cos [\pi + 0] = -1. \end{aligned}$$

Örnek 25.11. Teorem 25.3'den,

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan \left[\frac{5x}{2} - \pi \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \right] \\ &= \tan \left[\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{5x}{2} - \pi \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \right) \right] \\ &= \tan \left[\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{5x}{2} \right) - \pi \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \right) \right] \\ &= \tan \left[\frac{5\pi}{4} - \pi \cos \left(\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \right) \right] \\ &= \tan \left[\frac{5\pi}{4} - \pi \cos 0 \right] = \tan \left[\frac{5\pi}{4} - \pi \right] = \tan \frac{\pi}{4} = 1. \end{aligned}$$

Problems

Problem 25.1. For what value(s) of b is

$$f(x) = \begin{cases} x & x < -2 \\ bx^2 & x \geq -2. \end{cases}$$

continuous at every x ? Why?

Problem 25.2. Let

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-8}{x^2-4} & x \neq 2, x \neq -2 \\ 3 & x = 2 \\ 4 & x = -2. \end{cases}$$

- Show that f is continuous on $(-\infty, -2)$, on $(-2, 2)$ and on $(2, \infty)$.
- Show that f is continuous at $x = 2$.
- Show that f is discontinuous at $x = -2$.

Problem 25.3. Calculate $\lim_{t \rightarrow 0} \tan\left(\frac{\pi}{4} \cos\left(\sin t^{\frac{1}{3}}\right)\right)$.

Sorular

Soru 25.1. b 'nin hangi değeri(ler)i için,

$$f(x) = \begin{cases} x & x < -2 \\ bx^2 & x \geq -2. \end{cases}$$

her x noktasında süreklidir? Neden?

Soru 25.2. Farzedelim ki


$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-8}{x^2-4} & x \neq 2, x \neq -2 \\ 3 & x = 2 \\ 4 & x = -2. \end{cases}$$

- f 'nin $(-\infty, -2)$ de, $(-2, 2)$ de ve $(2, \infty)$ da sürekli olduğunu gösteriniz.
- f 'nin $x = 2$ 'de sürekli olduğunu gösteriniz.
- f 'nin $x = -2$ 'de süreksiz olduğunu gösteriniz.

Soru 25.3. $\lim_{t \rightarrow 0} \tan\left(\frac{\pi}{4} \cos\left(\sin t^{\frac{1}{3}}\right)\right)$ limitini bulunuz.

Limits Involving Infinity Sonsuz Limitler

Finite Limits as $x \rightarrow \pm\infty$



Question: If $x > 0$ and x gets bigger and bigger and bigger, what happens to $\frac{1}{x}$?

Answer: $\frac{1}{x}$ gets closer and closer and closer to 0. We write this as

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Similarly we have that

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Theorem 26.1. All of the limit laws (sum rule, difference rule, constant multiple rule, ...) are also true for $\lim_{x \rightarrow \infty}$ and $\lim_{x \rightarrow -\infty}$.

Example 26.1.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(5 + \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} 5 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \\ &\quad (\text{sum rule}) \\ &= 5 + 0 = 5. \end{aligned}$$

$x \rightarrow \pm\infty$ iken Sonlu Limitler

Soru: $x > 0$ ve x keyfi olarak büyüdüğünde, $\frac{1}{x}$ nasıl davranır?

Cevap: $\frac{1}{x}$ istenildiği kadar 0'a yakın olur. Bunu şöyle yazarız

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Benzer şekilde

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

olarak yazacağız.

Teorem 26.1. Limit kurallarının tümü (toplam kuralı, fark kuralı, sabitle çarpım kuralı, ...) $\lim_{x \rightarrow \infty}$ ve $\lim_{x \rightarrow -\infty}$ için de geçerlidir.

Örnek 26.1.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(5 + \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} 5 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \\ &\quad (\text{toplam kuralı}) \\ &= 5 + 0 = 5. \end{aligned}$$

Örnek 26.2.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\pi\sqrt{3}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\pi\sqrt{3} \frac{1}{x} \frac{1}{x} \right) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \right) \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \right) \\ &\quad (\text{çarpım kuralı}) \\ &= \pi\sqrt{3} \times 0 \times 0 = 0. \end{aligned}$$

Örnek 26.3 (Rasyonel Fonksiyonların Sonsuzdaki Limitleri).

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2}$ limitini bulunuz.

çözüm: Unutmayın ki cevap " $\frac{\infty}{\infty}$ " değildir. " $\frac{\infty}{\infty}$ ". yazarsanız sınavda sıfır puan almanız beklenebilir.

Bunun yerine şöyle bir çözüm verebiliriz

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{8}{x} - \frac{3}{x^2}}{3 + \frac{2}{x^2}} = \frac{5 + 0 - 0}{3 + 0} = \frac{5}{3}.$$

Bkz. şekil 26.2.

Example 26.2.

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\pi\sqrt{3}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\pi\sqrt{3} \frac{1}{x} \frac{1}{x} \right) \\
&= \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \right) \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \right) \\
&\quad (\text{product rule}) \\
&= \pi\sqrt{3} \times 0 \times 0 = 0.
\end{aligned}$$

Example 26.3 (Limits at Infinity of Rational Functions). Find

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2}.$$

solution: Please note that the answer is not “ $\frac{\infty}{\infty}$ ”. You can expect to receive zero points in the exam if you write “ $\frac{\infty}{\infty}$ ”.

Instead we calculate that

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{8}{x} - \frac{3}{x^2}}{3 + \frac{2}{x^2}} = \frac{5 + 0 - 0}{3 + 0} = \frac{5}{3}.$$

See figure 26.2.

Example 26.4.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{11x + 2}{2x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{11}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{2 - \frac{1}{x^3}} = \frac{0 + 0}{2 - 0} = 0.$$

Example 26.5. Find $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2}{|x|^3 + 1}$ and $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 2}{|x|^3 + 1}$.

solution: If $x > 0$, then

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2}{|x|^3 + 1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2}{x^3 + 1} \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{2}{x^3}}{1 + \frac{1}{x^3}} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1
\end{aligned}$$

and if $x < 0$ then

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 2}{|x|^3 + 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 2}{(-x)^3 + 1} \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - \frac{2}{x^3}}{-1 + \frac{1}{x^3}} \\
&= \frac{1 - 0}{-1 + 0} = -1.
\end{aligned}$$

See figure 26.1.




Figure 26.1: The graph of $y = \frac{x^3 - 2}{|x|^3 + 1}$.

Şekil 26.1: $y = \frac{x^3 - 2}{|x|^3 + 1}$ 'in grafiği.




Figure 26.2: The graph of $y = \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2}$.

Şekil 26.2: $y = \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2}$ 'nin grafiği.

Örnek 26.4.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{11x + 2}{2x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{11}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{2 - \frac{1}{x^3}} = \frac{0 + 0}{2 - 0} = 0.$$

Örnek 26.5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2}{|x|^3 + 1}$ ve $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 2}{|x|^3 + 1}$ limitlerini bulunuz.

çözüm: $x > 0$ ise, o halde




$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2}{|x|^3 + 1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2}{x^3 + 1} \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{2}{x^3}}{1 + \frac{1}{x^3}} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1
\end{aligned}$$

ve eğer $x < 0$ ise, o halde

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 2}{|x|^3 + 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 2}{(-x)^3 + 1} \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - \frac{2}{x^3}}{-1 + \frac{1}{x^3}} \\
&= \frac{1 - 0}{-1 + 0} = -1.
\end{aligned}$$

Bkz. şekil 26.1.

Infinite Limits



Example 26.6. Find $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{(x-2)^3}$ or explain why it doesn't exist.

solution:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{(x-2)^3} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x-2)}{(x-2)^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-1}{(x-2)^2} = -\infty. \end{aligned}$$

Example 26.7. Find $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{x^2-4}$ or explain why it doesn't exist.

solution:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \left[\left(\frac{x-3}{x+2} \right) \left(\frac{1}{x-2} \right) \right]$$

does not exist. To understand why, note that

- if $2 < x < 2.01$, then $(x-2) > 0$ and $\frac{1}{x-2} > 100$; but
- if $1.99 < x < 2$, then $(x-2) < 0$ and $\frac{1}{x-2} < -100$.

See figure 26.3.




Figure 26.3: The graph of $y = \frac{x-3}{x^2-4}$.

Şekil 26.3: $y = \frac{x-3}{x^2-4}$ 'ün grafiği.

Sonsuz Limitler

Örnek 26.6. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{(x-2)^3}$ limitini bulunuz veya mevcut değilse neden olmadığını açıklayınız.

çözüm:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{(x-2)^3} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x-2)}{(x-2)^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-1}{(x-2)^2} = -\infty. \end{aligned}$$

Örnek 26.7. Mevcutsa, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{x^2-4}$ limitini bulunuz veya mevcut değilse açıklayınız.

çözüm:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \left[\left(\frac{x-3}{x+2} \right) \left(\frac{1}{x-2} \right) \right]$$

mevcut değildir. Neden olmadığını görebilmek için, şunlara dikkat edelim

- $2 < x < 2.01$ ise, bu durumda $(x-2) > 0$ ve $\frac{1}{x-2} > 100$ olur; fakat
- $1.99 < x < 2$ iken, $(x-2) < 0$ and $\frac{1}{x-2} < -100$ olur.

See figure 26.3.

Problems

Problem 26.1. Find the following limits (if a limit does not exist, then you must explain why).

$$(a). \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+3}{5x+7}$$

$$(b). \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{x^2+3}$$

$$(c). \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{2y^2 - y^3}{3y^2 - y}$$

$$(d). \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^3 - 2x + 3}{3x^3 + 3x^2 - 5x}$$

$$(e). \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{2 + \sqrt{z}}{2 - \sqrt{z}}$$

$$(f). \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{t^2+1}}{t+1}$$

$$(g). \lim_{p \rightarrow 0} \frac{-1}{p^2(p+1)}$$

$$(h). \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{8x^2-3}{2x^2+x}}$$

Sorular

Soru 26.1. Aşağıdaki limitleri bulunuz (if a limit does not exist, then you must explain why).

$$(i). \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1-x^3}{x^2+7x} \right)^5$$

$$(j). \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{x} + x^{-1}}{3x-7}$$

$$(k). \lim_{x \rightarrow 7} \frac{4}{(x-7)^2}$$

$$(l). \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3x}$$







27

Differentiation

Türev



means




We can say that


$$\left(\begin{array}{c} \text{slope of } y = f(x) \\ \text{at } x = x_0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{slope of the tangent} \\ \text{line at } x = x_0 \end{array} \right)$$

Example 27.1.

Örnek 27.1.



The slope of $y = x^2$ at $x_0 = 0$ is 0.
 The slope of $y = x^2$ at $x_0 = 1$ is 2.
 The slope of $y = x^2$ at $x_0 = 2$ is 4.
 How do we know this?



If h is very very small, then

h çok ama çok küçükse, o zaman

$$\left(\begin{array}{c} \text{slope of the} \\ \text{tangent line} \end{array} \right) \approx \left(\begin{array}{c} \text{slope of the} \\ \text{orange line} \end{array} \right) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

$$\left(\begin{array}{c} \text{slope of the} \\ \text{tangent line} \end{array} \right) \approx \left(\begin{array}{c} \text{slope of the} \\ \text{orange line} \end{array} \right) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

The Derivative of f

Definition. The *derivative of a function f at a point x_0* is

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

if the limit exists.

(f' is pronounced “ f prime”)

Example 27.2. Consider the function $g(x) = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$.

If $x_0 \neq 0$, then

$$\begin{aligned} g'(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x_0 + h} - \frac{1}{x_0}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{x_0}{x_0(x_0 + h)} - \frac{x_0 + h}{x_0(x_0 + h)} \right)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x_0 - x_0 - h}{hx_0(x_0 + h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{x_0(x_0 + h)} \\ &= -\frac{1}{x_0^2}. \end{aligned}$$

See figure 27.1.




Figure 27.1: The graph of $g(x) = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$ and two tangents to this graph.

Şekil 27.1: $g(x) = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$ grafiği ve buna teğet iki doğru.

Definition. If $f'(x_0)$ exists, we say that f is *differentiable at x_0* .

Definition. Let $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ be a function. If f is differentiable at every $x_0 \in D$, we say that f is *differentiable*.

f Türevi

Tanım. Bir f fonksiyonunun x_0 noktasındaki türevi limitin mevcut olması koşuyla

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

olarak tanımlanır.

(f' sembolü “ f üssü” olarak okunur)

Örnek 27.3. $g(x) = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$ fonksiyonunu ele alalım.

$x_0 \neq 0$ ise,

$$\begin{aligned} g'(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x_0 + h} - \frac{1}{x_0}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{x_0}{x_0(x_0 + h)} - \frac{x_0 + h}{x_0(x_0 + h)} \right)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x_0 - x_0 - h}{hx_0(x_0 + h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{x_0(x_0 + h)} \\ &= -\frac{1}{x_0^2}. \end{aligned}$$

Bkz. şekil 27.1.

Tanım. $f'(x_0)$ mevcutsa, f fonksiyonu x_0 'da *türevlenebilir* deriz.

Tanım. $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ bir fonksiyon olsun. f her $x_0 \in D$ noktasında türevlenebilir ise, f bir *türevlenebilir* fonksiyondur deriz.

$f : D \rightarrow \mathbb{R}$ türevlenebilir ise, elimizde yeni bir $f' : D \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu olur.

Tanım. f' fonksiyonuna f 'nin *türevi* denir.

Örnek 27.4. $f(x) = \frac{x}{x-1}$ 'nin türevini bulunuz.

çözüm: İlk olarak $f(x+h) = \frac{x+h}{x+h-1}$. Buradan

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x+h}{x+h-1} - \frac{x}{x-1}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\frac{(x+h)(x-1) - x(x+h-1)}{(x-1)(x+h-1)} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\frac{-h}{(x-1)(x+h-1)} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{(x-1)(x+h-1)} \\ &= \frac{-1}{(x-1)(x+0-1)} \\ &= \frac{-1}{(x-1)^2} \end{aligned}$$

buluruz.

If $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ is differentiable, then we have a new function $f' : D \rightarrow \mathbb{R}$.

Definition. f' is called the **derivative** of f .

Example 27.3. Differentiate $f(x) = \frac{x}{x-1}$.

solution: First note that $f(x+h) = \frac{x+h}{x+h-1}$. Therefore

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x+h}{x+h-1} - \frac{x}{x-1}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\frac{(x+h)(x-1) - x(x+h-1)}{(x-1)(x+h-1)} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\frac{-h}{(x-1)(x+h-1)} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{(x-1)(x+h-1)} \\ &= \frac{-1}{(x-1)(x+0-1)} \\ &= \frac{-1}{(x-1)^2}. \end{aligned}$$




Figure 27.2: The graph of $y = \frac{x}{x-1}$.

Şekil 27.2: $y = \frac{x}{x-1}$ 'in grafiği

Notations

There are many ways to write the derivative of $y = f(x)$.

$$f'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}f(x) = \dot{y} = \dot{f}(x)$$

“the derivative of y with respect to x ”

Calculus was started by two men who hated each other: Sir Isaac Newton (UK, 1642-1726) used $\dot{f}$ and $\dot{y}$. Gottfried Leibniz (GER, 1646-1716) used $\frac{df}{dx}$ and $\frac{dy}{dx}$. The f' and y' notation came later from Joseph-Louis Lagrange (ITA, 1736-1813).

If we want the derivative of $y = f(x)$ at the point $x = x_0$, we can write

$$f'(x_0) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0} = \left. \frac{d}{dx}f(x) \right|_{x=x_0}$$

“the derivative of y with respect to x at $x = x_0$ ”

For example, if $u(x) = \frac{1}{x}$, then

$$u'(4) = \left. \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right) \right|_{x=4} = \left. \frac{-1}{x^2} \right|_{x=4} = \frac{-1}{4^2} = \frac{-1}{16}.$$

Notasyon

$y = f(x)$ 'nin türevini yazmanın birçok yolu vardır.

$$f'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}f(x) = \dot{y} = \dot{f}(x)$$

“ y nin x 'e göre türevi”

Calculus birbirinden nefret eden iki kişi tarafından başladı: Sir Isaac Newton (İngiltere, 1642-1726) $\dot{f}$ ve $\dot{y}$ kullandı. Gottfried Leibniz (Almanya, 1646-1716) $\frac{df}{dx}$ ve $\frac{dy}{dx}$ sembollerini kullandı. F' ve y' gösterimi daha sonra Joseph-Louis Lagrange'den (İtalya, 1736-1813) tarafından ilk kullanıldı.

$y = f(x)$ 'nin $x = x_0$ 'daki türevini bulmak için, şöyle yazarız

$$f'(x_0) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0} = \left. \frac{d}{dx}f(x) \right|_{x=x_0}$$

“ y 'nin x 'e göre $x = x_0$ 'daki türevi”

Örneğin, $u(x) = \frac{1}{x}$ ise, o zaman

$$u'(4) = \left. \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right) \right|_{x=4} = \left. \frac{-1}{x^2} \right|_{x=4} = \frac{-1}{4^2} = \frac{-1}{16}.$$




Figure 27.3: A web comic taken from <https://xkcd.com/626/>.

Şekil 27.3: <https://xkcd.com/626/> adresinden alınan bir web çizgi romanı.

Example 27.4. Show that $f(x) = |x|$ is differentiable on $(-\infty, 0)$ and on $(0, \infty)$, but is not differentiable at $x = 0$.

solution: If $x > 0$ then

$$\frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 = 1.$$

Similarly, if $x < 0$ then

$$\begin{aligned} \frac{df}{dx} &= \frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(-x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(-x-h) - (-x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} -1 = -1. \end{aligned}$$

Therefore f is differentiable on $(-\infty, 0)$ and on $(0, \infty)$.

Since $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (\pm 1)$ does not exist, f is not differentiable at 0.

See figure 27.4.




Figure 27.4: The graph of $y = |x|$.

Şekil 27.4: $y = |x|$ 'in grafiği.

Örnek 27.5. $f(x) = |x|$ 'nin $(-\infty, 0)$ ve $(0, \infty)$ aralıklarında türevlenebilir ama $x = 0$ 'da türevlenebilir olmadığını gösteriniz.

çözüm: $x > 0$ ise o vakit

$$\frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 = 1.$$

Benzer olarak, $x < 0$ ise o halde


$$\begin{aligned} \frac{df}{dx} &= \frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(-x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(-x-h) - (-x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} -1 = -1. \end{aligned}$$

Yani f fonksiyonu $(-\infty, 0)$ ve $(0, \infty)$ 'da türevlenebilirdir.

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (\pm 1)$ mevcut olmadığından, f 0'da türevlenemez.

Bkz. şekil 27.4.

When Does a Function Not Have a Derivative at a Point? Hangi Durumlarda Bir Fonksiyonun Türevi Yoktur?




a corner

$f'(x_0)$ does not exist

köşe durumu

$f'(x_0)$ mevcut değil




a cusp

$f'(x_0)$ does not exist

içten bükülme

$f'(x_0)$ mevcut değil




a vertical tangent

$f'(x_0)$ does not exist

dikey teğet

$f'(x_0)$ mevcut değil




a discontinuity

$f'(x_0)$ does not exist

süreksizlik

$f'(x_0)$ mevcut değil



a discontinuity

$f'(x_0)$ does not exist

süreksizlik

$f'(x_0)$ mevcut değil

Theorem 27.1.

$$\left(\begin{array}{c} f \text{ has a derivative} \\ \text{at } x = x_0 \end{array} \right) \implies \left(\begin{array}{c} f \text{ is continuous} \\ \text{at } x = x_0 \end{array} \right)$$

Teorem 27.1.

$$\left(\begin{array}{c} f \text{ 'nin at } x = x_0 \text{ da} \\ \text{türevi mevcut} \end{array} \right) \implies \left(\begin{array}{c} f, x = x_0 \text{ 'da} \\ \text{sürekli} \end{array} \right)$$

Differentiation Rules

Constant Function

If $k \in \mathbb{R}$, then

$$\frac{d}{dx}(k) = 0.$$

Power Function

If $n \in \mathbb{R}$, then

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}.$$

Example 28.1.

$$\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^{3-1} = 3x^2$$

Example 28.2.

$$\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{d}{dx}(x^{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Example 28.3.

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^4}\right) = \frac{d}{dx}(x^{-4}) = -4x^{-4-1} = -4x^{-5} = -\frac{4}{x^5}$$

The Constant Multiple Rule

If $u(x)$ is differentiable and $k \in \mathbb{R}$, then

$$\frac{d}{dx}(ku) = k \frac{du}{dx}.$$

Proof.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(ku) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ku(x+h) - ku(x)}{h} \\ &= k \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} = k \frac{du}{dx} \end{aligned}$$

Example 28.4.

$$\frac{d}{dx}(3x^2) = 3 \frac{d}{dx}(x^2) = 3 \times 2x = 6x$$

Example 28.5.

$$\frac{d}{dx}(-u) = \frac{d}{dx}(-1 \times u) = -1 \times \frac{du}{dx} = -\frac{du}{dx}$$

Türev Kuralları

Sabit Fonksiyon

$k \in \mathbb{R}$ ise, o halde

$$\frac{d}{dx}(k) = 0.$$

Kuvvet Fonksiyonu

$n \in \mathbb{R}$ ise, bu durumda

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}.$$

Örnek 28.1.

$$\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^{3-1} = 3x^2$$

Örnek 28.2.

$$\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{d}{dx}(x^{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Örnek 28.3.

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^4}\right) = \frac{d}{dx}(x^{-4}) = -4x^{-4-1} = -4x^{-5} = -\frac{4}{x^5}$$

Sabitle Çarpım Kuralı

$u(x)$ türevlenebilir ve $k \in \mathbb{R}$ ise,

$$\frac{d}{dx}(ku) = k \frac{du}{dx}.$$

Kanıt.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(ku) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ku(x+h) - ku(x)}{h} \\ &= k \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} = k \frac{du}{dx} \end{aligned}$$

□

□

Örnek 28.4.

$$\frac{d}{dx}(3x^2) = 3 \frac{d}{dx}(x^2) = 3 \times 2x = 6x$$

Örnek 28.5.

$$\frac{d}{dx}(-u) = \frac{d}{dx}(-1 \times u) = -1 \times \frac{du}{dx} = -\frac{du}{dx}$$

The Sum Rule

If $u(x)$ and $v(x)$ are differentiable at x_0 , then $u + v$ is also differentiable at x_0 and

$$\frac{d}{dx}(u + v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}.$$

Example 28.6. Differentiate $y = x^3 + \frac{4}{3}x^2 - 5x + 1$.

solution:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \left(x^3 + \frac{4}{3}x^2 - 5x + 1 \right) \\ &= \frac{d}{dx}(x^3) + \frac{d}{dx} \left(\frac{4}{3}x^2 \right) - \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(1) \\ &= 3x^2 + \frac{8}{3}x - 5 + 0 \end{aligned}$$

Example 28.7. Does the curve $y = x^4 - 2x^2 + 2$ have any points where $\frac{dy}{dx} = 0$? If so, where?

solution: Since

$$\frac{dy}{dx} = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1) = 4x(x - 1)(x + 1),$$

we can see that $\frac{dy}{dx} = 0$ if and only if $x = -1, 0$ or 1 . See figure 28.1.

Toplam Kuralı

$u(x)$ ve $v(x)$ fonksiyonları x_0 'da türevlenebilirlerse, $u + v$ 'de x_0 türevlenebilirdir ve

$$\frac{d}{dx}(u + v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}.$$

Örnek 28.6. $y = x^3 + \frac{4}{3}x^2 - 5x + 1$ fonksiyonunun türevini bulunuz.

çözüm:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \left(x^3 + \frac{4}{3}x^2 - 5x + 1 \right) \\ &= \frac{d}{dx}(x^3) + \frac{d}{dx} \left(\frac{4}{3}x^2 \right) - \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(1) \\ &= 3x^2 + \frac{8}{3}x - 5 + 0 \end{aligned}$$

Örnek 28.7. $y = x^4 - 2x^2 + 2$ eğrisi üzerinde $\frac{dy}{dx} = 0$ olan nokta(lar) var mıdır? Varsa, nelerdir?

çözüm:

$$\frac{dy}{dx} = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1) = 4x(x - 1)(x + 1),$$

olduğundan şunu gözlemleyebiliriz $\frac{dy}{dx} = 0$ ancak ve ancak $x = -1, 0$ veya 1 olur. Bkz. şekil 28.1.




Figure 28.1: The graph of $y = x^4 - 2x^2 + 2$.

Şekil 28.1: $y = x^4 - 2x^2 + 2$ 'nin grafiği.

The Product Rule

If $u(x)$ and $v(x)$ are differentiable at x_0 , then $u(x)v(x)$ is also differentiable at x_0 and

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}.$$

Using prime notation, the product rule is

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Example 28.8. Differentiate $y = (x^2 + 1)(x^3 + 3)$.

solution 1: We have $y = uv$ with $u = x^2 + 1$ and $v = x^3 + 3$. So

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= (x^2 + 1)'(x^3 + 3) + (x^2 + 1)(x^3 + 3)' \\ &= (2x + 0)(x^3 + 3) + (x^2 + 1)(3x^2 + 0) \\ &= 2x^4 + 6x + 3x^4 + 3x^2 \\ &= 5x^4 + 3x^2 + 6x. \end{aligned}$$

solution 2: Since

$$y = (x^2 + 1)(x^3 + 3) = x^5 + x^3 + 3x^2 + 3,$$

we have that

$$\frac{dy}{dx} = 5x^4 + 3x^2 + 6x + 0.$$

The Quotient Rule

If $u(x)$ and $v(x)$ are differentiable at x_0 and if $v(x_0) \neq 0$, then $\frac{u}{v}$ is also differentiable at x_0 and

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Example 28.9. Differentiate $y = \frac{t^2 - 1}{t^3 + 1}$.

solution: We have $y = \frac{u}{v}$ with $u = t^2 - 1$ and $v = t^3 + 1$. Therefore

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \\ &= \frac{(t^2 - 1)'(t^3 + 1) - (t^2 - 1)(t^3 + 1)'}{(t^3 + 1)^2} \\ &= \frac{(2t)(t^3 + 1) - (t^2 - 1)(3t^2)}{(t^3 + 1)^2} \\ &= \frac{2t^4 + 2t - 3t^4 + 3t^2}{(t^3 + 1)^2} \\ &= \frac{-t^4 + 3t^2 + 2t}{(t^3 + 1)^2}. \end{aligned}$$

Çarpım Kuralı

$u(x)$ ve $v(x)$ fonksiyonlarla x_0 'da türevlenebilirlerse, $u(x)v(x)$ fonksiyonu da x_0 türevlenebilirdir ve

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}.$$

Üs notasyonu kullanarak, çarpım kuralı da

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Örnek 28.8. $y = (x^2 + 1)(x^3 + 3)$ fonksiyonunun türevini bulunuz.

çözüm 1: Elimizde şunlar var: $y = uv$ ile $u = x^2 + 1$ ve $v = x^3 + 3$. Yani

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= (x^2 + 1)'(x^3 + 3) + (x^2 + 1)(x^3 + 3)' \\ &= (2x + 0)(x^3 + 3) + (x^2 + 1)(3x^2 + 0) \\ &= 2x^4 + 6x + 3x^4 + 3x^2 \\ &= 5x^4 + 3x^2 + 6x. \end{aligned}$$

çözüm 2:

$$y = (x^2 + 1)(x^3 + 3) = x^5 + x^3 + 3x^2 + 3$$

olduğundan,

$$\frac{dy}{dx} = 5x^4 + 3x^2 + 6x + 0$$

buluruz.

Bölüm Kuralı

Eğer $u(x)$ ve $v(x)$ fonksiyonları x_0 'da türevlenebilirlerse ve $v(x_0) \neq 0$ ise, o zaman $\frac{u}{v}$ fonksiyonu da x_0 'da türevlenebilirdir ve türevi de şöyledir:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Örnek 28.9. $y = \frac{t^2 - 1}{t^3 + 1}$ fonksiyonunun türevini alınız.

çözüm: $u = t^2 - 1$ ve $v = t^3 + 1$ olmak üzere $y = \frac{u}{v}$ olsun. Buradan

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \\ &= \frac{(t^2 - 1)'(t^3 + 1) - (t^2 - 1)(t^3 + 1)'}{(t^3 + 1)^2} \\ &= \frac{(2t)(t^3 + 1) - (t^2 - 1)(3t^2)}{(t^3 + 1)^2} \\ &= \frac{2t^4 + 2t - 3t^4 + 3t^2}{(t^3 + 1)^2} \\ &= \frac{-t^4 + 3t^2 + 2t}{(t^3 + 1)^2} \end{aligned}$$

buluruz.

Example 28.10. Differentiate $f(s) = \frac{\sqrt{s}-1}{\sqrt{s}+1}$.

solution: We have $f(s) = \frac{u}{v}$ with $u = \sqrt{s} - 1$ and $v = \sqrt{s} + 1$. Remember that $\frac{d}{ds}(\sqrt{s}) = \frac{1}{2\sqrt{s}}$. Therefore

$$\begin{aligned}\frac{df}{ds} &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \\ &= \frac{(\sqrt{s}-1)'(\sqrt{s}+1) - (\sqrt{s}-1)(\sqrt{s}+1)'}{(\sqrt{s}+1)^2} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{2\sqrt{s}}\right)(\sqrt{s}+1) - (\sqrt{s}-1)\left(\frac{1}{2\sqrt{s}}\right)}{(\sqrt{s}+1)^2} \\ &= \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{s}} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{s}}}{(\sqrt{s}+1)^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{s}(\sqrt{s}+1)^2}.\end{aligned}$$

Örnek 28.10. $f(s) = \frac{\sqrt{s}-1}{\sqrt{s}+1}$ fonksiyonunun türevini bulunuz.

çözüm: $f(s) = \frac{u}{v}$ olsun burada $u = \sqrt{s} - 1$ ve $v = \sqrt{s} + 1$. Unutmayınız ki $\frac{d}{ds}(\sqrt{s}) = \frac{1}{2\sqrt{s}}$. Dolayısıyla

$$\begin{aligned}\frac{df}{ds} &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \\ &= \frac{(\sqrt{s}-1)'(\sqrt{s}+1) - (\sqrt{s}-1)(\sqrt{s}+1)'}{(\sqrt{s}+1)^2} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{2\sqrt{s}}\right)(\sqrt{s}+1) - (\sqrt{s}-1)\left(\frac{1}{2\sqrt{s}}\right)}{(\sqrt{s}+1)^2} \\ &= \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{s}} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{s}}}{(\sqrt{s}+1)^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{s}(\sqrt{s}+1)^2}\end{aligned}$$

buluruz.

Second Order Derivatives

If $y = f(x)$ is a differentiable function, then $f'(x)$ is also a function. If $f'(x)$ is also differentiable, then we can differentiate to find a new function called f'' (“ f double prime”). f'' is called the **second derivative** of f . We can write

$$f''(x) = \frac{d}{dx}f'(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'}{dx} = y''$$

“ d squared y , dx squared”

Example 28.11. If $y = x^6$, then $y' = \frac{d}{dx}(x^6) = 6x^5$ and $y'' = \frac{d}{dx}(y') = \frac{d}{dx}(6x^5) = 30x^4$. Equivalently, we can write

$$\frac{d^2}{dx^2}(x^6) = \frac{d}{dx}\left(\frac{d}{dx}(x^6)\right) = \frac{d}{dx}(6x^5) = 30x^4.$$

İkinci Mertebeden Türevler

$y = f(x)$ türevlenebilir bir fonksiyon ise, o zaman $f'(x)$ de bir fonksiyondur. $f'(x)$ de türevlenebilir ise, bu durumda yine türev alır ve yeni bir f'' (“ f iki üssü”) fonksiyonu buluruz. f'' fonksiyonuna f ’nin **ikinci türevi** denir. Şöyle dösteririz

$$f''(x) = \frac{d}{dx}f'(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'}{dx} = y''$$

“ d kare y bölü dx kare”

Örnek 28.11. $y = x^6$ ise, $y' = \frac{d}{dx}(x^6) = 6x^5$ ve $y'' = \frac{d}{dx}(y') = \frac{d}{dx}(6x^5) = 30x^4$. Buna eşdeğer olarak,

$$\frac{d^2}{dx^2}(x^6) = \frac{d}{dx}\left(\frac{d}{dx}(x^6)\right) = \frac{d}{dx}(6x^5) = 30x^4$$

yazabiliriz.

Higher Order Derivatives

If f'' is differentiable, then its derivative $f''' = \frac{d^3 f}{dx^3}$ is the **third derivative** of f .

If f''' is differentiable, then its derivative $f^{(4)} = \frac{d^4 f}{dx^4}$ is the **fourth derivative** of f .

If $f^{(4)}$ is differentiable, then its derivative $f^{(5)} = \frac{d^5 f}{dx^5}$ is the **fifth derivative** of f .

⋮

If $f^{(n-1)}$ is differentiable, then its derivative $f^{(n)} = \frac{d^n f}{dx^n}$ is the **n th derivative** of f .

Example 28.12. Find the first four derivatives of $y = x^3 - 3x^2 + 2$.

solution:

First derivative: $y' = 3x^2 - 6x$

Second derivative: $y'' = 6x - 6$

Third derivative: $y''' = 6$

Fourth derivative: $y^{(4)} = 0$.

(Note that since $\frac{d}{dx}(0) = 0$, if $n \geq 4$ then $y^{(n)} = 0$ also.)

Problems

Problem 28.1.

- (a). Find $\frac{ds}{dt}$ if $s = -2t^{-1} + \frac{4}{t^2}$.
- (b). Find w'' if $w = (z+1)(z-1)(z^2+1)$.
- (c). Find $\frac{dy}{dx}$ if $y = (2x+3)(x^4 + \frac{1}{3}x^3 + 11)$.

Problem 28.2. Find $\frac{db}{dx}$ if $b = \frac{x^2-1}{x^2+x-2}$.

Problem 28.3. Find the derivatives of the functions below:

- (a). $y = \frac{x^4}{2} - \frac{3}{2}x^2 - x$
- (b). $y = (x-1)(x^2+3x-5)$
- (c). $r = \frac{1}{3s^2} - \frac{5}{2s}$
- (d). $y = \frac{2x+5}{3x-2}$
- (e). $g(x) = \frac{x^2-4}{x+0.5}$
- (f). $v = (1-t)(1+t^2)^{-1}$
- (g). $f(s) = \frac{\sqrt{s}-1}{\sqrt{s}+1}$
- (h). $v = \frac{1+x-4\sqrt{x}}{x}$

Yüksek Mertebeden Türevler

f'' türevlenebilir ise, türevi olan $f''' = \frac{d^3 f}{dx^3}$ fonksiyona f 'nin **üçüncü türevi** denir.

f''' türevlenebilir ise, türevi olan $f^{(4)} = \frac{d^4 f}{dx^4}$ fonksiyonuna f 'nin **dördüncü türevi** denir.

$f^{(4)}$ türevlenebilir ise, türevi olan $f^{(5)} = \frac{d^5 f}{dx^5}$ fonksiyonuna f 'nin **beşinci türevi**.

⋮

$f^{(n-1)}$ türevlenebilir ise, türevi olan $f^{(n)} = \frac{d^n f}{dx^n}$ fonksiyonuna f 'nin **n inci türevi** denir.

Örnek 28.12. $y = x^3 - 3x^2 + 2$ ise, ilk dört mertebeden türevlerini bulunuz.

çözüm:

Birinci mertebeden türev: $y' = 3x^2 - 6x$

İkinci mertebeden türev: $y'' = 6x - 6$

Üçüncü mertebeden türev: $y''' = 6$

Dördüncü mertebeden türev: $y^{(4)} = 0$.

($\frac{d}{dx}(0) = 0$ olduğundan, $n \geq 4$ ise $y^{(n)} = 0$ olduğunu unutmayınız.)

Sorular

Soru 28.1.

- (a). $s = -2t^{-1} + \frac{4}{t^2}$ ise $\frac{ds}{dt}$ yi bulunuz.
- (b). $w = (z+1)(z-1)(z^2+1)$ ise w'' 'yi bulunuz.
- (c). $y = (2x+3)(x^4 + \frac{1}{3}x^3 + 11)$ ise $\frac{dy}{dx}$ 'i bulunuz.

Soru 28.2. $b = \frac{x^2-1}{x^2+x-2}$ ise $\frac{db}{dx}$ 'i bulunuz.

Soru 28.3. Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini bulunuz:

- (i). $r = \frac{(\theta-1)(\theta^2+\theta+1)}{\theta^3}$
- (j). $w = \left(\frac{1+3z}{3z}\right)(3-z)$
- (k). $s = 5t^3 - 3t^5$
- (l). $w = 3z^{-2} - \frac{1}{z}$

Derivatives of Trigonometric Functions

Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri

Sine and Cosine

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

Example 29.1. Differentiate $y = x^2 - \sin x$.

solution:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(\sin x) = 2x - \cos x.$$

Example 29.2. Differentiate $y = x^2 \sin x$.

solution: We will use the product rule $((uv)' = u'v + uv')$ with $u = x^2$ and $v = \sin x$.

$$y' = (x^2)'(\sin x) + (x^2)(\sin x)' = 2x \sin x + x^2 \cos x.$$

Example 29.3. Differentiate $y = \frac{\sin x}{x}$.

solution: This time we use the quotient rule $((\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2})$ with $u = \sin x$ and $v = x$.

$$y' = \frac{(\sin x)'x - (\sin x)(x)'}{x^2} = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}.$$

Example 29.4. Differentiate $y = 5x + \cos x$.

solution:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(\cos x) = 5 - \sin x.$$

Example 29.5. Differentiate $y = \sin x \cos x$.

solution: By the product rule, we have that

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(\sin x) \cos x + \sin x \frac{d}{dx}(\cos x) = \cos^2 x - \sin^2 x.$$

Sinüs ve Kosinüs

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

Örnek 29.1. $y = x^2 - \sin x$ fonksiyonunun türevini alınız.

çözüm:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(\sin x) = 2x - \cos x.$$

Örnek 29.2. $y = x^2 \sin x$ fonksiyonunun türevini alınız.

çözüm: Çarpım kuralı kullanırsak $((uv)' = u'v + uv')$ burada $u = x^2$ ve $v = \sin x$ oluyor.

$$y' = (x^2)'(\sin x) + (x^2)(\sin x)' = 2x \sin x + x^2 \cos x.$$

Örnek 29.3. $y = \frac{\sin x}{x}$ fonksiyonunun türevini alınız.

çözüm: Bu sefer de bölüm kuralı kullanırsak $((\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2})$ burada $u = \sin x$ ve $v = x$ oluyor.

$$y' = \frac{(\sin x)'x - (\sin x)(x)'}{x^2} = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}.$$

Örnek 29.4. $y = 5x + \cos x$ fonksiyonunun türevini alınız.

çözüm:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(\cos x) = 5 - \sin x.$$

Örnek 29.5. $y = \sin x \cos x$ fonksiyonunun türevini alınız.

çözüm: Çarpım kuralı gereğince,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(\sin x) \cos x + \sin x \frac{d}{dx}(\cos x) = \cos^2 x - \sin^2 x.$$

Örnek 29.6. $y = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$ fonksiyonunun türevini alınız.

Example 29.6. Differentiate $y = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$.

solution: By the quotient rule, we have that

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{d}{dx}(\cos x)(1 - \sin x) - (\cos x)\frac{d}{dx}(1 - \sin x)}{(1 - \sin x)^2} \\ &= \frac{-\sin x(1 - \sin x) - \cos x(0 - \cos x)}{(1 - \sin x)^2} \\ &= \frac{-\sin x + \sin^2 x + \cos^2 x}{(1 - \sin x)^2} \\ &= \frac{-\sin x + 1}{(1 - \sin x)^2} = \frac{1 - \sin x}{(1 - \sin x)^2} \\ &= \frac{1}{1 - \sin x}.\end{aligned}$$

çözüm: Bölüm kuralından,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{d}{dx}(\cos x)(1 - \sin x) - (\cos x)\frac{d}{dx}(1 - \sin x)}{(1 - \sin x)^2} \\ &= \frac{-\sin x(1 - \sin x) - \cos x(0 - \cos x)}{(1 - \sin x)^2} \\ &= \frac{-\sin x + \sin^2 x + \cos^2 x}{(1 - \sin x)^2} \\ &= \frac{-\sin x + 1}{(1 - \sin x)^2} = \frac{1 - \sin x}{(1 - \sin x)^2} \\ &= \frac{1}{1 - \sin x}.\end{aligned}$$

The Tangent Function

Tanjant Fonksiyonu

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$$

Proof. Using the quotient rule, we can calculate that

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\tan x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) \\ &= \frac{\frac{d}{dx}(\sin x)(\cos x) - (\sin x)\frac{d}{dx}(\cos x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{(\cos x)(\cos x) - (\sin x)(-\sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x.\end{aligned}$$

□

Kanıt. Bölüm türevinden,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\tan x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) \\ &= \frac{\frac{d}{dx}(\sin x)(\cos x) - (\sin x)\frac{d}{dx}(\cos x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{(\cos x)(\cos x) - (\sin x)(-\sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} \\ &= \sec^2 x.\end{aligned}$$

□

The Other Three

Diğer Üç Fonksiyon

$$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx}(\cot x) = -\operatorname{cosec}^2 x$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{cosec} x) = -\operatorname{cosec} x \cot x$$

You can use the quotient rule to prove these three rules. We may ask you to prove one of them in an exam.

Example 29.7. Find y'' if $y = \sec x$.

solution: Since $y' = \sec x \tan x$, we have that

$$\begin{aligned}y'' &= \frac{d}{dx}(y') = \frac{d}{dx}(\sec x \tan x) \\ &= \frac{d}{dx}(\sec x) \tan x + \sec x \frac{d}{dx}(\tan x) \\ &= (\sec x \tan x)(\tan x) + (\sec x)(\sec^2 x) \\ &= \sec x \tan^2 x + \sec^3 x.\end{aligned}$$

Bu üç kuralın kanıtlanması için bölüm kuralını kullanabilirsiniz. Bunlardan birisini sınavda kanıtlamanızı isteyebiliriz.

Örnek 29.7. $y = \sec x$ ise y'' 'nü bulunuz.

çözüm: $y' = \sec x \tan x$ olduğundan,

$$\begin{aligned}y'' &= \frac{d}{dx}(y') = \frac{d}{dx}(\sec x \tan x) \\ &= \frac{d}{dx}(\sec x) \tan x + \sec x \frac{d}{dx}(\tan x) \\ &= (\sec x \tan x)(\tan x) + (\sec x)(\sec^2 x) \\ &= \sec x \tan^2 x + \sec^3 x\end{aligned}$$

buluruz.

Problems

Problem 29.1.

- (a). Find $\frac{ds}{dx}$ if $s = (\sin x + \cos x) \sec x$.
- (b). Find $\frac{dr}{d\theta}$ if $r = \theta \sin \theta + \cos \theta$.

Problem 29.2. Use the quotient rule to prove that the following are true:

- (a). $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$.
- (b). $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\operatorname{cosec}^2 x$.
- (c). $\frac{d}{dx}(\operatorname{cosec} x) = -\operatorname{cosec} x \cot x$.

Problem 29.3. Find the derivatives of the functions below:

- (a). $y = -10x + 3 \cos x$
- (b). $y = x^2 \cos x$
- (c). $y = \operatorname{cosec} x - 4\sqrt{x} + 7$
- (d). $f(x) = \sin x \tan x$
- (e). $g(x) = \cos x \tan x$
- (f). $w = \frac{\cot z}{1 + \cot z}$
- (g). $h(x) = x^3 \sin x \cos x$

Sorular

Soru 29.1.

- (a). $s = (\sin x + \cos x) \sec x$ ise $\frac{ds}{dx}$ 'i bulunuz.
- (b). $r = \theta \sin \theta + \cos \theta$ ise $\frac{dr}{d\theta}$ 'yi bulunuz.

Soru 29.2. Bölüm kuralı kullanarak, aşağıdakileri kanıtlayınız:

- (a). $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$.
- (b). $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\operatorname{cosec}^2 x$.
- (c). $\frac{d}{dx}(\operatorname{cosec} x) = -\operatorname{cosec} x \cot x$.

Soru 29.3. Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini bulunuz:

- (h). $p = 5 + \frac{1}{\cot t}$
- (i). $r = \frac{\sin t + \cos t}{\cos t}$
- (j). $y = (\sec x + \tan x)(\sec x - \tan x)$




Figure 29.1: A web comic taken from <https://www.gocomics.com/calvinandhobbes/1988/01/06>.

Şekil 29.1: <https://www.gocomics.com/calvinandhobbes/1988/01/06> adresinden alınan bir web çizgi romanı.

The Chain Rule

How do we differentiate $F(x) = \sin(x^2 - 4)$?

Theorem 30.1 (The Chain Rule). Suppose that

- $y = f(u)$ is differentiable at the point $u = g(x)$; and
- $g(x)$ is differentiable at x .

Then $f \circ g$ is differentiable at x and

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

The Chain Rule is easier to remember if we use Leibniz's notation:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

Example 30.1. Differentiate $y = \sin(x^2 - 4)$.

solution: We have $y = \sin u$ with $u = x^2 - 4$. Now $\frac{dy}{du} = \cos u$ and $\frac{du}{dx} = 2x$. Therefore

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = (\cos u)(2x) \\ &= 2x \cos u = 2x \cos(x^2 - 4) \end{aligned}$$

by the Chain Rule.

Example 30.2. Differentiate $\sin(x^2 + x)$.

solution: Let $u = x^2 + x$. Then

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (\sin(x^2 + x)) &= \frac{d}{du} (\sin u) \frac{du}{dx} \\ &= (\cos u)(2x + 1) \\ &= (2x + 1) \cos(x^2 + x) \end{aligned}$$

by the Chain Rule.

Example 30.3 (Using the Chain Rule Two Times). Differentiate $g(t) = \tan(5 - \sin 2t)$.

solution: Let $u = 5 - \sin 2t$. Then $g(t) = \tan u$. Hence

$$\frac{dg}{dt} = \frac{dg}{du} \frac{du}{dt} = (\sec^2 u) \frac{d}{dt} (5 - \sin 2t).$$

Zincir Kuralı

$F(x) = \sin(x^2 - 4)$ fonksiyonunun türevini nasıl alırsınız?

Teorem 30.1 (Zincir Kuralı). Varsayalım ki

- $y = f(u)$ fonksiyonu $u = g(x)$ notasında türevlenebilir ve
- $g(x)$ fonksiyonu da x 'de türevlenebilir olsun.

Bu durumda $f \circ g$ fonksiyonu da x noktasında türevlenebilirdir ve türevi de

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

Zincir Kuralı'nı Leibniz notasyonu kullanarak kolayca hatırlanabilir:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

Örnek 30.1. $y = \sin(x^2 - 4)$ fonksiyonunun türevini alınız.

çözüm: $u = x^2 - 4$ olsun ve $y = \sin u$ olur. Böylece $\frac{dy}{du} = \cos u$ ve $\frac{du}{dx} = 2x$ olur. Yani

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = (\cos u)(2x) \\ &= 2x \cos u = 2x \cos(x^2 - 4) \end{aligned}$$

Zincir Kuralı kullanarak buluruz.

Örnek 30.2. $\sin(x^2 + x)$ fonksiyonunun türevini alınız.

çözüm: $u = x^2 + x$ diyelim. Buradan Zincir Kuralı yardımıyla,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (\sin(x^2 + x)) &= \frac{d}{du} (\sin u) \frac{du}{dx} \\ &= (\cos u)(2x + 1) \\ &= (2x + 1) \cos(x^2 + x) \end{aligned}$$

bulunur.

Örnek 30.3 (İki kez Zincir Kuralı).

$g(t) = \tan(5 - \sin 2t)$ fonksiyonunun türevini alınız.

çözüm: Let $u = 5 - \sin 2t$. Then $g(t) = \tan u$. Hence

$$\frac{dg}{dt} = \frac{dg}{du} \frac{du}{dt} = (\sec^2 u) \frac{d}{dt} (5 - \sin 2t).$$

We need to use the Chain Rule a second time: Let $w = 2t$. Then

$$\begin{aligned}\frac{dg}{dt} &= (\sec^2 u) \frac{d}{dt}(5 - \sin 2t) \\ &= (\sec^2 u) \frac{d}{dw}(5 - \sin w) \frac{dw}{dt} \\ &= (\sec^2 u)(-\cos w)(2) \\ &= -2 \cos 2t \sec^2(5 - \sin 2t).\end{aligned}$$

(Note: Your final answer should not have u or w in it.)

Powers of a Function

If

- f is a differentiable function of u ;
- u is a differentiable function of x ; and
- $y = f(u)$,

then the Chain Rule $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$ is the same as

$$\frac{d}{dx} f(u) = f'(u) \frac{du}{dx}.$$

Now suppose that $n \in \mathbb{R}$ and $f(u) = u^n$. Then $f'(u) = nu^{n-1}$. So

$$\boxed{\frac{d}{dx} (u^n) = nu^{n-1} \frac{du}{dx}.$$

Example 30.4.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (5x^3 - x^4)^7 &= 7(5x^3 - x^4)^6 \frac{d}{dx} (5x^3 - x^4) \\ &= 7(5x^3 - x^4)^6 (15x^2 - 4x^3).\end{aligned}$$

Example 30.5.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{3x-2} \right) &= \frac{d}{dx} (3x-2)^{-1} = -1(3x-2)^{-2} \frac{d}{dx} (3x-2) \\ &= - \left(\frac{1}{(3x-2)^2} \right) (3) = \frac{-3}{(3x-2)^2}.\end{aligned}$$

Example 30.6.

$$\frac{d}{dx} (\sin^5 x) = 5 \sin^4 x \frac{d}{dx} (\sin x) = 5 \sin^4 x \cos x.$$

Example 30.7. Differentiate $|x|$.

solution: Since $|x| = \sqrt{x^2}$, we can calculate that if $x \neq 0$ then

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} |x| &= \frac{d}{dx} (\sqrt{x^2}) = \frac{d}{du} (\sqrt{u}) \frac{d}{dx} (x^2) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{u}} 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2}} = \frac{x}{|x|}.\end{aligned}$$

We need to use the Chain Rule a second time: Let $w = 2t$. Then

$$\begin{aligned}\frac{dg}{dt} &= (\sec^2 u) \frac{d}{dt}(5 - \sin 2t) \\ &= (\sec^2 u) \frac{d}{dw}(5 - \sin w) \frac{dw}{dt} \\ &= (\sec^2 u)(-\cos w)(2) \\ &= -2 \cos 2t \sec^2(5 - \sin 2t).\end{aligned}$$

(Not: Cevabımız u or w içermemelidir.)

Kuvvet Fonksiyonları

Eğer

- f , u 'ya bağlı türevlenebilir fonksiyon;
- u , x 'e bağlı türevlenebilir fonksiyon ve
- $y = f(u)$ ise,

Zincir Kuralı gereğince $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$ ile

$$\frac{d}{dx} f(u) = f'(u) \frac{du}{dx}$$

ifadesi aynıdır.

Şimdi $n \in \mathbb{R}$ ve $f(u) = u^n$ olsun. O halde $f'(u) = nu^{n-1}$ olur. Böylece

$$\boxed{\frac{d}{dx} (u^n) = nu^{n-1} \frac{du}{dx}.$$

Örnek 30.4.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (5x^3 - x^4)^7 &= 7(5x^3 - x^4)^6 \frac{d}{dx} (5x^3 - x^4) \\ &= 7(5x^3 - x^4)^6 (15x^2 - 4x^3).\end{aligned}$$

Örnek 30.5.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{3x-2} \right) &= \frac{d}{dx} (3x-2)^{-1} = -1(3x-2)^{-2} \frac{d}{dx} (3x-2) \\ &= - \left(\frac{1}{(3x-2)^2} \right) (3) = \frac{-3}{(3x-2)^2}.\end{aligned}$$

Örnek 30.6.

$$\frac{d}{dx} (\sin^5 x) = 5 \sin^4 x \frac{d}{dx} (\sin x) = 5 \sin^4 x \cos x.$$

Örnek 30.7. $|x|$ fonksiyonunun türevini alınız.

çözüm: $|x| = \sqrt{x^2}$ olduğundan, $x \neq 0$ ise

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} |x| &= \frac{d}{dx} (\sqrt{x^2}) = \frac{d}{du} (\sqrt{u}) \frac{d}{dx} (x^2) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{u}} 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2}} = \frac{x}{|x|}\end{aligned}$$

buluruz.

Example 30.8. Let $y = \frac{1}{(1-2x)^3}$ for $x \neq \frac{1}{2}$. Show that $\frac{dy}{dx} > 0$.

solution: First we calculate that

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(1-2x)^{-3} = -3(1-2x)^{-4} \frac{d}{dx}(1-2x) \\ &= -3(1-2x)^{-4}(-2) = \frac{6}{(1-2x)^4}\end{aligned}$$

if $x \neq \frac{1}{2}$. Since $(1-2x)^4 > 0$ if $x \neq \frac{1}{2}$ and $6 > 0$, we have that $\frac{dy}{dx} > 0$ if $x \neq \frac{1}{2}$.

Example 30.9 (Why Do We Use Radians in Calculus?). Remember that $\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$ is true *only if we use radians*. What happens if we use degrees?


Örnek 30.8. $y = \frac{1}{(1-2x)^3}$ for $x \neq \frac{1}{2}$ olsun. $\frac{dy}{dx} > 0$ olduğunu gösteriniz.

çözüm: Öncelikle, $x \neq \frac{1}{2}$ ise

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(1-2x)^{-3} = -3(1-2x)^{-4} \frac{d}{dx}(1-2x) \\ &= -3(1-2x)^{-4}(-2) = \frac{6}{(1-2x)^4}\end{aligned}$$

buluruz. Eğer $x \neq \frac{1}{2}$ ise $(1-2x)^4 > 0$ olur ve $6 > 0$ bulunur, buradan $\frac{dy}{dx} > 0$ if $x \neq \frac{1}{2}$ elde edilir.

Örnek 30.9 (Kalkülüste Neden Radyan Kullanırız?). Unutmayınız ki $\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$ doğrudur *tabii radyan kullanırsak*. Derece kullansaydık ne olurdu?



Remember that

$$\begin{aligned}180 \text{ degrees} &= \pi \text{ radians} \\ 180^\circ &= \pi \\ 1^\circ &= \frac{\pi}{180} \\ x^\circ &= \frac{\pi x}{180}.\end{aligned}$$

So

$$\frac{d}{dx} \sin x^\circ = \frac{d}{dx} \sin\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos x^\circ.$$

Therefore we have

$$\boxed{\frac{d}{dx} \sin x = \cos x}$$

a nice formula

and

$$\boxed{\frac{d}{dx} \sin x^\circ = \frac{\pi}{180} \cos x^\circ}.$$

not nice

Hatırlayacak olursak,

$$\begin{aligned}180 \text{ derece} &= \pi \text{ radyan} \\ 180^\circ &= \pi \\ 1^\circ &= \frac{\pi}{180} \\ x^\circ &= \frac{\pi x}{180}.\end{aligned}$$

Yani

$$\frac{d}{dx} \sin x^\circ = \frac{d}{dx} \sin\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos x^\circ.$$

Elimize geçen

$$\boxed{\frac{d}{dx} \sin x = \cos x}$$

güzel bir formül

ve

$$\boxed{\frac{d}{dx} \sin x^\circ = \frac{\pi}{180} \cos x^\circ}$$

hiç güzel olmayan formül

This is why we use radians in Calculus.

Bu yüzden Kalkülüste radyan kullanıyoruz.

Problems

Problem 30.1. Find $\frac{ds}{dt}$ if $s = \left(\frac{t}{2} - 1\right)^{-10}$.

Problem 30.2. Find $\frac{dy}{dt}$ if $y = \cos\left(5 \sin\left(\frac{t}{3}\right)\right)$.

Problem 30.3. Find $\frac{dy}{dx}$ if $y = \sqrt{3x^2 - 4x + 6}$.

Problem 30.4. Find $\frac{dy}{dx}$ if $y = \sin^3 x$.

Problem 30.5. Find $\frac{dy}{dx}$ if $y = \sec(\tan x)$.

Problem 30.6. Find $\frac{dy}{dx}$ if $y = \sin(x^2) \cos(2x)$.

Problem 30.7. Find $\frac{dy}{dt}$ if $y = \left(\frac{t^2}{t^3 - 4t}\right)^3$.

Problem 30.8. Find y'' if $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^3$.

Problem 30.9. Find $(f \circ g)'(1)$ if $f(u) = u^5 + 1$ and $g(x) = \sqrt{x}$.

Problem 30.10. Find $(f \circ g)'(0)$ if $f(u) = \frac{2u}{u^2+1}$ and $g(x) = 10x^2 + x + 1$.

Sorular

Soru 30.1. $s = \left(\frac{t}{2} - 1\right)^{-10}$ ise $\frac{ds}{dt}$ 'yi bulunuz.

Soru 30.2. $y = \cos\left(5 \sin\left(\frac{t}{3}\right)\right)$ ise $\frac{dy}{dt}$ 'yi bulunuz.

Soru 30.3. $y = \sqrt{3x^2 - 4x + 6}$ ise $\frac{dy}{dx}$ 'i bulunuz.

Soru 30.4. $y = \sin^3 x$ ise $\frac{dy}{dx}$ 'i bulunuz.

Soru 30.5. $y = \sec(\tan x)$ ise $\frac{dy}{dx}$ 'i bulunuz.

Soru 30.6. $y = \sin(x^2) \cos(2x)$ ise $\frac{dy}{dx}$ 'i bulunuz.

Soru 30.7. $y = \left(\frac{t^2}{t^3 - 4t}\right)^3$ ise $\frac{dy}{dt}$ 'yi bulunuz.

Soru 30.8. $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^3$ ise y'' 'yi bulunuz.

Soru 30.9. $f(u) = u^5 + 1$ ve $g(x) = \sqrt{x}$ ise $(f \circ g)'(1)$ 'i bulunuz.

Soru 30.10. $f(u) = \frac{2u}{u^2+1}$ ve $g(x) = 10x^2 + x + 1$ ise $(f \circ g)'(0)$ 'i bulunuz.

Antiderivatives

Definition. F is an *antiderivative* of f on an interval I if $F'(x) = f(x)$ for all $x \in I$.

Example 31.1.

$2x$ is the derivative of x^2 .

x^2 is an antiderivative of $2x$.

Example 31.2. If $g(x) = \cos x$, then an antiderivative of g is

$$G(x) = \sin x$$

because

$$G'(x) = \frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x = g(x).$$

Example 31.3. If $h(x) = 2x + \cos x$, then $H(x) = x^2 + \sin x$ is an antiderivative of $h(x)$.

Remark. $F(x) = x^2$ is not the only antiderivative of $f(x) = 2x$.

$x^2 + 1$ is an antiderivative of $2x$ because $\frac{d}{dx}(x^2 + 1) = 2x$.

$x^2 + 5$ is an antiderivative of $2x$ because $\frac{d}{dx}(x^2 + 5) = 2x$.

$x^2 - 1234$ is an antiderivative of $2x$ because $\frac{d}{dx}(x^2 - 1234) = 2x$.

Theorem 31.1. If F is an antiderivative of f on I , then the general antiderivative of f is

$$F(x) + C$$

where C is a constant.

Example 31.4. Find an antiderivative of $f(x) = 3x^2$ that satisfies $F(1) = -1$.

solution: x^3 is an antiderivative of f because $\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2$. So the general antiderivative of f is

$$F(x) = x^3 + C.$$

Then we calculate that

$$-1 = F(1) = 1^3 + C = 1 + C \implies C = -2.$$

Therefore $F(x) = x^3 - 2$.

Ters Türevler

Tanım. Bir I aralığındaki her $x \in I$ için $F'(x) = f(x)$ olacak şekildeki F fonksiyonuna f fonksiyonunun bir *ters türevi* denir.

Örnek 31.1.

x^2 nin türevi $2x$ tir.

x^2 de $2x$ in bir ters türevidir.

Örnek 31.2. $g(x) = \cos x$ ise, g nin bir ters türevi

$$G(x) = \sin x$$

olur, çünkü

$$G'(x) = \frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x = g(x).$$

Örnek 31.3. $h(x) = 2x + \cos x$ ise, $H(x) = x^2 + \sin x$ fonksiyonu $h(x)$ in bir ters türevidir.

Not. $F(x) = x^2$ fonksiyonu $f(x) = 2x$ in tek ters türevi değildir.

$x^2 + 1$ de $2x$ için bir ters türevdir çünkü $\frac{d}{dx}(x^2 + 1) = 2x$.

$x^2 + 5$ de $2x$ için bir ters türevdir çünkü $\frac{d}{dx}(x^2 + 5) = 2x$.

$x^2 - 1234$ de $2x$ için bir ters türevdir çünkü $\frac{d}{dx}(x^2 - 1234) = 2x$.

Teorem 31.1. Eğer F fonksiyonu f nin I üzerindeki ters türevi ise, f nin genel ters türevi

$$F(x) + C$$

burada C bir sabit oluyor.

Örnek 31.4. $F(1) = -1$ sağlayan $f(x) = 3x^2$ nin bir ters türevini bulunuz .

çözüm: x^3 fonksiyonu f nin bir ters türevidir çünkü $\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2$. Bu nedenle f nin genel ters türevi

$$F(x) = x^3 + C.$$

Şunları buluruz:

$$-1 = F(1) = 1^3 + C = 1 + C \implies C = -2.$$

Bu nedenle $F(x) = x^3 - 2$.

function, $f(x)$	derivative, $f'(x)$
fonksiyon, $f(x)$	türev, $f'(x)$
x^n	nx^{n-1}
$\sin kx$	$k \cos kx$
$\cos kx$	$-k \sin kx$
e^{kx}	ke^{kx}
$\ln x $	$\frac{1}{x}$

function, $f(x)$	general antiderivative, $F(x)$
fonksiyon, $f(x)$	genel ters türev, $F(x)$
x^n ($n \neq -1$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\sin kx$	$-\frac{1}{k} \cos kx + C$
$\cos kx$	$\frac{1}{k} \sin kx + C$
e^{kx}	$\frac{1}{k} e^{kx} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$

Table 31.1: Elementary derivatives and antiderivatives

Tablo 31.1:

The Sum Rule and the Constant Multiple Rule

Suppose that

- F is an antiderivative of f ;
- G is an antiderivative of g ;
- $k \in \mathbb{R}$.

The Sum Rule: The general antiderivative of $f + g$ is

$$F(x) + G(x) + C.$$

The Constant Multiple Rule: The general antiderivative of kf is

$$kF(x) + C.$$

Example 31.5. Find the general antiderivative of $f(x) = \frac{3}{\sqrt{x}} + \sin 2x$.

solution: We have $f = 3g + h$ where $g(x) = x^{-\frac{1}{2}}$ and $h(x) = \sin 2x$. An antiderivative of g is

$$G(x) = \frac{x^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{x}.$$

An antiderivative of h is

$$H(x) = -\frac{1}{2} \cos 2x.$$

Therefore the general antiderivative of f is

$$F(x) = 6\sqrt{x} - \frac{1}{2} \cos 2x + C.$$

Definition. The general antiderivative of f is also called the **indefinite integral** of f with respect to x , and is denoted by

$$\int f(x) \, dx.$$

Toplam ve Sabitle çarpım Kuralı

Varsayalım ki

- F fonksiyonu f nin bir ters türevi;
- G fonksiyonu da g nin bir ters türevi;
- $k \in \mathbb{R}$.

Toplam Kuralı: $f + g$ 'nin ilkeli (ters türevi)

$$F(x) + G(x) + C.$$

Sabitle Çarpım Kuralı: kf 'nin ilkeli

$$kF(x) + C.$$

Örnek 31.5. $f(x) = \frac{3}{\sqrt{x}} + \sin 2x$ nin ilkelini bulunuz.

çözüm: $g(x) = x^{-\frac{1}{2}}$ olmak üzere elimizde $f = 3g + h$ ve $h(x) = \sin 2x$ var. g 'nin bir ilkeli

$$G(x) = \frac{x^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{x}.$$

Ayrıca h 'nin bir ilkeli

$$H(x) = -\frac{1}{2} \cos 2x.$$

Dıloayısıyla f fonksiyonunun bir ilkeli

$$F(x) = 6\sqrt{x} - \frac{1}{2} \cos 2x + C.$$

Tanım. f nin genel ters türev veya ilkeline aynı zamanda f nin x 'e göre **belirsiz integrali** denir ve şöyle gösterilir:

$$\int f(x) \, dx.$$

the integral sign
integral işareti

$$\int \underbrace{f(x)}_{\substack{\text{the integrand} \\ \text{integralin integrandı}}} dx$$

x is the variable of integration
 x ise integral değişkeni olarak tanımlanır

Example 31.6.

$$\begin{aligned}\int 2x \, dx &= x^2 + C \\ \int \cos x \, dx &= \sin x + C \\ \int (2x + \cos x) \, dx &= x^2 + \sin x + C\end{aligned}$$

Example 31.7. Calculate $\int (x^2 - 2x + 5) \, dx$.

solution 1. Since $\frac{d}{dx} \left(\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x \right) = x^2 - 2x + 5$ we have that

$$\int (x^2 - 2x + 5) \, dx = \frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C.$$

solution 2.

$$\begin{aligned}\int (x^2 - 2x + 5) \, dx &= \int x^2 \, dx - \int 2x \, dx + \int 5 \, dx \\ &= \left(\frac{x^3}{3} + C_1 \right) - (x^2 + C_2) + (5x + C_3) \\ &= \left(\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x \right) + (C_1 - C_2 + C_3).\end{aligned}$$

Because we only need one constant, we can define $C := C_1 - C_2 + C_3$. Therefore

$$\int (x^2 - 2x + 5) \, dx = \frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C.$$

Örnek 31.6.

$$\begin{aligned}\int 2x \, dx &= x^2 + C \\ \int \cos x &= \sin x + C \\ \int (2x + \cos x) \, dx &= x^2 + \sin x + C\end{aligned}$$

Örnek 31.7. $\int (x^2 - 2x + 5) \, dx$ integralini bulunuz.

çözüm 1. $\frac{d}{dx} \left(\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x \right) = x^2 - 2x + 5$ olduğundan

$$\int (x^2 - 2x + 5) \, dx = \frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C$$

buluruz.

çözüm 2.

$$\begin{aligned}\int (x^2 - 2x + 5) \, dx &= \int x^2 \, dx - \int 2x \, dx + \int 5 \, dx \\ &= \left(\frac{x^3}{3} + C_1 \right) - (x^2 + C_2) + (5x + C_3) \\ &= \left(\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x \right) + (C_1 - C_2 + C_3).\end{aligned}$$

Yalnızca bir sabite ihtiyacımız olduğundan, $C := C_1 - C_2 + C_3$ olarak tanımlarız. Yani

$$\int (x^2 - 2x + 5) \, dx = \frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C.$$

Example 31.8. You drop a box off the top of a tall building. The acceleration due to gravity is 9.8 ms^{-2} . You can ignore air resistance. How far does the box fall in 5 seconds?

solution: The acceleration is

$$a(t) = 9.8 \text{ ms}^{-2}$$

downwards. Since

$$\text{acceleration} = \frac{d}{dt}(\text{velocity}),$$

the velocity is an antiderivative of the acceleration. Therefore the velocity is

$$v(t) = 9.8t + C \text{ ms}^{-1}.$$

You let go of the box at time $t = 0$. So $v(0) = 0$. Thus $C = 0$. Hence

$$v(t) = 9.8t \text{ ms}^{-1}.$$

Now velocity = $\frac{d}{dt}(\text{position})$. So the distance fallen is an antiderivative of velocity. Hence

$$s(t) = 4.9t^2 + \tilde{C} \text{ m}.$$

Because you let go of the box at time $t = 0$, we have $s(0) = 0$. Thus $\tilde{C} = 0$. Therefore

$$s(t) = 4.9t^2 \text{ m}.$$

After 5 seconds, the box has fallen

$$s(5) = 4.9 \times 25 = 122.5 \text{ metres}.$$

Örnek 31.8. Bir binanın üstünden bir kutu bırakılıyor. Yerçekimi ivmesi 9.8 ms^{-2} dir. Havadaki sürtünme ihmal edilebilir. Kutu 5 saniyede ne kadar yol alır?

çözüm: İvme

$$a(t) = 9.8 \text{ ms}^{-2}$$

aşağıya doğru olur. Şimdi

$$\text{ivme} = \frac{d}{dt}(\text{hız}),$$

hız ivmenin bir ilkelidir. Dolayısıyla hız

$$v(t) = 9.8t + C \text{ ms}^{-1}.$$

Kutuyu $t = 0$ anında bırakıyorsunuz. Böylece $v(0) = 0$ olur. Buradan $C = 0$ olur. Dolayısıyla

$$v(t) = 9.8t \text{ ms}^{-1}.$$

Şimdi hız = $\frac{d}{dt}(\text{konum})$. Dolayısıyla düşme mesafesi hızın bir ters türevi veya ilkelidir. Yani


$$s(t) = 4.9t^2 + \tilde{C} \text{ m}.$$

Kutuyu $t = 0$ anında düşmeye bıraktığınızda, $s(0) = 0$ olur. Böylece $\tilde{C} = 0$. Yani

$$s(t) = 4.9t^2 \text{ m}.$$

5 saniye sonra, kutunun düşme mesafesi

$$s(5) = 4.9 \times 25 = 122.5 \text{ metres}.$$



Problems

Problem 31.1. Find an antiderivative for each function, then check your answer by differentiating it.

(a). $f(x) = 200x$.

(b). $g(x) = x^3 - \frac{1}{x^3}$.

(c). $h(x) = \sin(\pi x) - 3 \sin(3x)$.

(d). $l(x) = x^7 - 6x + 8$.

(e). $m(x) = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$.

(f). $p(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$.

Problem 31.2 (Right or Wrong?). Consider

$$\int ((2x+1)^2 + \cos x) \, dx = \frac{(2x+1)^3}{3} + \sin x + C.$$

Is this correct or incorrect? Why?

Problem 31.3 (Right or Wrong?). Consider

$$\int (e^x \cos e^x) \, dx = \sin e^x + C.$$

Is this correct or incorrect? Why?

Problem 31.4 (Right or Wrong?). Consider

$$\int (3x^2 + 2x + 7) \, dx = x^3 + x^2 + 7x.$$

Is this correct or incorrect? Why?

Problem 31.5. Find the following indefinite integrals.

(a). $\int 2x \, dx$

(b). $\int (1 - x^2 - 3x^5) \, dx$

(c). $\int \frac{4 + \sqrt{t}}{t^3} \, dt$

(d). $\int (2 \cos 2\theta - 3 \sin 3\theta) \, d\theta$

(g). $r(x) = \frac{2}{3} \sec^2 \frac{x}{3}$.

(h). $s(x) = -\sec^2 \frac{3x}{2}$.

Sorular

Soru 31.1. Aşağıdaki fonksiyonların birer ters türevini veya ilkelini bulup, sonra cevabınızı türev alarak bulup kontrol edin.

Soru 31.2 (Doğru mu yoksa Yanlış mı?).

$$\int ((2x+1)^2 + \cos x) \, dx = \frac{(2x+1)^3}{3} + \sin x + C$$

yazalım. Bu doğru mu yoksa yanlış mı? Neden?

Soru 31.3 (Doğru mu yoksa Yanlış mı?).

$$\int (e^x \cos e^x) \, dx = \sin e^x + C$$

yazalım. Bu doğru mu yoksa yanlış mı? Neden?

Soru 31.4 (Doğru mu yoksa Yanlış mı?).

$$\int (3x^2 + 2x + 7) \, dx = x^3 + x^2 + 7x$$

yazalım. Bu doğru mu yoksa yanlış mı? Neden?

Soru 31.5. Aşağıdaki belirsiz integralleri bulunuz.

(e). $\int 2e^{3x} \, dx$

(f). $\int \frac{1}{x} \, dx$

32

Integration

İntegral

Question: What is the area of R ?

We can use two rectangles to approximate the area of R .

Then we have

$$\begin{aligned} \text{area of } R &\approx \text{area of 2 rectangles} \\ &= \left(\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}\right) + \left(0 \times \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{3}{8} = 0.375. \end{aligned}$$


Can we do better than this? Yes! We could use more rectangles.

We can say that

$$\begin{aligned} \text{area of } R &\approx \text{area of 4 rectangles} \\ &= \left(\frac{15}{16} \times \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}\right) \\ &\quad + \left(\frac{7}{16} \times \frac{1}{4}\right) + \left(0 \times \frac{1}{4}\right) \\ &= \frac{17}{32} = 0.53125. \end{aligned}$$

Every time we increase the number of rectangles, the total area of the rectangles gets closer and closer to the area of R .

$$\begin{aligned} \text{area of } R &\approx \text{area of 16 rectangles} \\ &= 0.63476. \end{aligned}$$



Soru: R bölgesinin alanı kaçtır?

R nin alanını yaklaşık olarak hesaplamada iki dikdörtgen kullanırsak, Bu durumda

$$\begin{aligned} R \text{'nin alanı} &\approx 2 \text{ dikdörtgenin toplam alanı} \\ &= \left(\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}\right) + \left(0 \times \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{3}{8} = 0.375. \end{aligned}$$




Bundan daha iyisini yapabilir miyiz? Evet! Daha fazla dikdörtgen kullanabiliriz.

We can say that


$$\begin{aligned} \text{area of } R &\approx \text{area of 4 rectangles} \\ &= \left(\frac{15}{16} \times \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}\right) \\ &\quad + \left(\frac{7}{16} \times \frac{1}{4}\right) + \left(0 \times \frac{1}{4}\right) \\ &= \frac{17}{32} = 0.53125. \end{aligned}$$

Dikdörtgenlerin sayısını her arttırdığımızda, dikdörtgenlerin toplam alanı, R alanına daha da yaklaşıyor.

$$\begin{aligned} R \text{'nin alanı} &\approx 16 \text{ dikdörtgenin toplam alanı} \\ &= 0.63476. \end{aligned}$$



Limits of Finite Sums



Here's the plan:


STEP 1. We will cut $[0, 1]$ into n pieces of width

$$\Delta x = \frac{1 - 0}{n} = \frac{1}{n}.$$

STEP 2. We will use n rectangles to approximate the area of R . See figure 32.1.

STEP 3. Then we will take the limit as $n \rightarrow \infty$.

Sonlu Toplamların Limitleri



İşte izleyeceğimiz yol:

ADIM 1. $[0, 1]$ 'i n parçaya bölersek

$$\Delta x = \frac{1 - 0}{n} = \frac{1}{n}.$$

ADIM 2. n tane dikdörtgenle R 'nin alanını yaklaşık olarak buluruz. Bkz. şekil 32.1.

ADIM 3. Daha sonra $n \rightarrow \infty$ iken limit alırız.




Figure 32.1: We can use n rectangles to approximate the area of R .

Şekil 32.1: n tane dikdörtgeni R 'nin alanını yaklaşık hesaplamakta kullanabiliriz.

Let $f(x) = 1 - x^2$. Then

- the **first rectangle** has area $\frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right)$;
- the **second rectangle** has area $\frac{1}{n} f\left(\frac{2}{n}\right)$;
- the **third rectangle** has area $\frac{1}{n} f\left(\frac{3}{n}\right)$;

and so on.

Let $f(x) = 1 - x^2$. Then

- **ilk dikdörtgen** alanı $\frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right)$;
- **ikinci dikdörtgen** alanı $\frac{1}{n} f\left(\frac{2}{n}\right)$;
- **üçüncü dikdörtgen** alanı $\frac{1}{n} f\left(\frac{3}{n}\right)$;

ve saire.

The area of all n rectangles is

$$\begin{aligned}
 \text{area} &= \sum_{k=1}^n (\text{area of the } k\text{th rectangle}) \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \left(1 - \left(\frac{k}{n}\right)^2\right) \\
 &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} - \frac{k^2}{n^3}\right) \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} - \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3} \\
 &= n \left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2 \\
 &= 1 - \frac{1}{n^3} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right) \\
 &= 1 - \frac{2n^2 + 3n + 1}{6n^2}.
 \end{aligned}$$

Taking the limit gives

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2n^2 + 3n + 1}{6n^2} \right) \\
 &= 1 - \frac{2}{6} = \frac{2}{3}.
 \end{aligned}$$

Therefore the area of R is $\frac{2}{3}$.

Riemann Sums




Figure 32.2: A function $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.
Şekil 32.2: Bir fonksiyon $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

Now let $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ be a function. We will cut $[a, b]$ into n subintervals (the pieces don't have to all be the same size). In each subinterval we will choose one point $c_k \in [x_{k-1}, x_k]$, as shown in figure 32.3. The width of each subinterval is $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$.

On each subinterval $[x_{k-1}, x_k]$, we draw a rectangle of width Δx_k and height $f(c_k)$. See figure 32.4.

n dikdörtgenin toplam alanı

$$\begin{aligned}
 \text{area} &= \sum_{k=1}^n (\text{area of the } k\text{th rectangle}) \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \left(1 - \left(\frac{k}{n}\right)^2\right) \\
 &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} - \frac{k^2}{n^3}\right) \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} - \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3} \\
 &= n \left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2 \\
 &= 1 - \frac{1}{n^3} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right) \\
 &= 1 - \frac{2n^2 + 3n + 1}{6n^2}.
 \end{aligned}$$

Limit alınırsa

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2n^2 + 3n + 1}{6n^2} \right) \\
 &= 1 - \frac{2}{6} = \frac{2}{3}.
 \end{aligned}$$

Buradan R 'nin alanı $\frac{2}{3}$ olur.

Riemann Toplamı

Şimdi $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bir fonksiyon olsun. $[a, b]$ 'yi n aralığa böleriz (parçaların hepsinin aynı genişlikte olması gerekmez). Her alt-aralıkta, Şekil 32.3'de gösterildiği gibi $[x_{k-1}, x_k]$ cinsinden bir nokta c_k seçeriz. Her alt aralığın genişliği $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ 'dir.




Figure 32.3: We split the interval $[a, b]$ into n subintervals. Note that $a = x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$.
Şekil 32.3: $[a, b]$ aralığını n alt-aralığa bölünür. Dikkat edilirse, $a = x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ dir.

Her bir $[x_{k-1}, x_k]$ alt-aralığında, genişliği Δx_k ve yüksekliği $f(c_k)$ olan dikdörtgenler çizilir. Bkz. şekil 32.4




Figure 32.4: n rectangles.
Şekil 32.4: n tane dikdörtgeni.

Note that if $f(c_k) < 0$, then the rectangle on $[x_{k-1}, x_k]$ will have ‘negative area’ – this is ok.

The total of the n rectangles is

$$\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k.$$

This is called a **Riemann Sum for f on $[a, b]$** . Then we want to take the limit as $n \rightarrow \infty$ (or more precisely, we want to take the limit as $\max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n\} \rightarrow 0$). Sometimes this limit exists, sometimes this limit does not exist.

$f(c_k) < 0$ olduğuna dikkat edersek, tabanı $[x_{k-1}, x_k]$ olan dikdörtgen ‘negatif aalanlı’ – olur.

n dikdörtgenin toplam alanı

$$\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k.$$

Bu toplama bir **f nin $[a, b]$ üzerindeki bir Riemann Toplamı** denir. Sonra $n \rightarrow \infty$ iken limit alınır (veya daha doğrusu, $\max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n\} \rightarrow 0$ iken limit alınır). Bu limit bazen mevcuttur, bazen mevcut değil.

The Definite Integral

Belirli İntegral

Definition. If the limit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$$

exists, then it is called the **definite integral of f over $[a, b]$** . We write

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$$

if the limit exists.



Tanım. Eğer

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$$

limiti mevcutsa, bu limite **f 'nin $[a, b]$ üzerindeki belirli integrali** adı verilir. Şöyle gösteririz

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$$

tabi eğer limit mevcutsa.



Definition. If $\int_a^b f(x) dx$ exists, then we say that f is *integrable on $[a, b]$* .

Example 33.1. $f(x) = 1 - x^2$ is integrable on $[0, 1]$ and $\int_0^1 (1 - x^2) dx = \frac{2}{3}$.

Remark.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(u) du = \int_a^b f(t) dt$$

It doesn't matter which letter we use for the *dummy variable*.

Theorem 33.1. If f is continuous on $[a, b]$, then f is integrable on $[a, b]$.

If f has finitely many jump discontinuities but is otherwise continuous on $[a, b]$, then f is integrable on $[a, b]$.

Example 33.2. Define a function $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ by

$$g(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

See figure 33.1. This function is not integrable on $[0, 1]$.

Tanım. Eğer $\int_a^b f(x) dx$ mevcutsa, f *fonksiyonu $[a, b]$ üzerinde integrallenebilir* denir.

Örnek 33.1. $f(x) = 1 - x^2$ fonksiyonu $[0, 1]$ üzerinde integrallenebilir ve $\int_0^1 (1 - x^2) dx = \frac{2}{3}$.

Not.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(u) du = \int_a^b f(t) dt$$

takma değişken için hangi sembol kullandığımızın bir önemi yok.

Teorem 33.1. Eğer f fonksiyonu $[a, b]$ 'de sürekli ise, $[a, b]$ 'de f integrallenebilirdir.

Eğer f sonlu sayıda sıçramalı süreksizliği varsa veya $[a, b]$ 'de sürekli ise, then $[a, b]$ üzerinde f integrallenebilirdir.

Örnek 33.2. Şu fonksiyonu tanımlarsak $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ öyle ki

$$g(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Bkz. şekil 33.1. Bu fonksiyon $[0, 1]$ 'de integrallenemez.




Figure 33.1: The graph of $g(x)$ defined in Example 33.2.

Şekil 33.1: Örnekteki $g(x)$ grafiği

Properties of Definite Integrals

Theorem 33.2. Suppose that f and g are integrable. Let k be a number. Then

$$(i). \int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx;$$

$$(ii). \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx;$$

$$(iii). \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

$$(iv). \int_a^a f(x) dx = 0;$$

$$(v). \int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx;$$

$$(vi). (b - a) \min f \leq \int_a^b f(x) dx \leq (b - a) \max f;$$

(vii). if $f(x) \leq g(x)$ on $[a, b]$, then

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx;$$

(viii). if $g(x) \geq 0$ on $[a, b]$, then

$$\int_a^b g(x) dx \geq 0;$$








(ix). if f is an even function, then

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx;$$

and

(x). if f is an odd function, then

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$



Belirli İntegralin Özellikleri

Teorem 33.2. f ve g integrallenebilir olsunlar. k bir sabit sayı olsun. Bu durumda

$$(i). \int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx;$$

$$(ii). \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx;$$

$$(iii). \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

$$(iv). \int_a^a f(x) dx = 0;$$

$$(v). \int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx;$$

$$(vi). (b - a) \min f \leq \int_a^b f(x) dx \leq (b - a) \max f;$$

(vii). $f(x) \leq g(x)$ on $[a, b]$ ise,

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx;$$

(viii). $[a, b]$ üzerinde $g(x) \geq 0$ ise,

$$\int_a^b g(x) dx \geq 0;$$

(ix). f çift fonksiyon ise,

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx;$$

ve

(x). if f tek fonksiyon ise,

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$

Example 33.3. Suppose that $\int_{-1}^1 f(x) dx = 5$, $\int_1^4 f(x) dx = -2$ and $\int_{-1}^1 h(x) dx = 7$. Then

$$\int_4^1 f(x) dx = -\int_1^4 f(x) dx = 2,$$

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 (2f(x) + 3h(x)) dx &= 2 \int_{-1}^1 f(x) dx + 3 \int_{-1}^1 h(x) dx \\ &= 2(5) + 3(7) = 31\end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned}\int_{-1}^4 f(x) dx &= \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx \\ &= 5 + (-2) = 3.\end{aligned}$$

Example 33.4. Show that $\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx \leq \sqrt{2}$.

solution: The maximum value of $\sqrt{1 + \cos x}$ on $[0, 1]$ is $\sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$. Therefore

$$\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx \leq (1 - 0) \max \sqrt{1 + \cos x} = 1 \times \sqrt{2}.$$

Example 33.5. Calculate $\int_{-2}^2 (x^3 + x) dx$.

solution: Because $(x^3 + x)$ is an odd function, we have that

$$\int_{-2}^2 (x^3 + x) dx = 0.$$

Example 33.6. Calculate $\int_{-1}^1 (1 - x^2) dx$.

solution: Because $(1 - x^2)$ is an even function, we have that

$$\int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = 2 \int_0^1 (1 - x^2) dx = 2 \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3}.$$

Örnek 33.3. Varsayalım ki $\int_{-1}^1 f(x) dx = 5$, $\int_1^4 f(x) dx = -2$ ve $\int_{-1}^1 h(x) dx = 7$. O zaman

$$\int_4^1 f(x) dx = -\int_1^4 f(x) dx = 2,$$

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 (2f(x) + 3h(x)) dx &= 2 \int_{-1}^1 f(x) dx + 3 \int_{-1}^1 h(x) dx \\ &= 2(5) + 3(7) = 31\end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned}\int_{-1}^4 f(x) dx &= \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx \\ &= 5 + (-2) = 3.\end{aligned}$$

Örnek 33.4. Gösteriniz ki $\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx \leq \sqrt{2}$.

çözüm: $[0, 1]$ üzerindeki $\sqrt{1 + \cos x}$ 'nin maksimum değeri $\sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$. Buradan

$$\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx \leq (1 - 0) \max \sqrt{1 + \cos x} = 1 \times \sqrt{2}.$$

Örnek 33.5. $\int_{-2}^2 (x^3 + x) dx$ hesaplayınız.

çözüm: $(x^3 + x)$ tek fonksiyon olduğundan, şunu elde ederiz:

$$\int_{-2}^2 (x^3 + x) dx = 0.$$

Örnek 33.6. $\int_{-1}^1 (1 - x^2) dx$ hesaplayınız.

çözüm: $(1 - x^2)$ çift fonksiyon olduğu için,

$$\int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = 2 \int_0^1 (1 - x^2) dx = 2 \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3}.$$

Example 33.7. Calculate $\int_0^b x \, dx$ for $b > 0$.

solution 1: We will use a Riemann Sum. First we cut $[0, b]$ in to n pieces using

$$0 < \frac{b}{n} < \frac{2b}{n} < \frac{3b}{n} < \dots < \frac{(n-1)b}{n} < b$$

and $c_k = \frac{kb}{n}$. Note that $\Delta x_k = \frac{b}{n}$ for all k . See figure 33.2. Then

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k &= \sum_{k=1}^n \frac{kb}{n} \frac{b}{n} = \frac{b^2}{n^2} \sum_{k=1}^n k \\ &= \frac{b^2}{n^2} \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) = \frac{b^2}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right). \end{aligned}$$

Then

$$\begin{aligned} \int_0^b x \, dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b^2}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \frac{b^2}{2}. \end{aligned}$$




Figure 33.2: Approximating $\int_0^b x \, dx$ by n rectangles.
Şekil 33.2: n dikdörtgenle $\int_0^b x \, dx$ ye yaklaşık bulmak.

solution 2: Alternately, we can look at figure 33.3 and say that

$$\int_0^b x \, dx = \text{area of a triangle} = \frac{1}{2} \times b \times b = \frac{b^2}{2}.$$

Example 33.8.

$$\begin{aligned} \int_a^b x \, dx &= \int_a^0 x \, dx + \int_0^b x \, dx \\ &= -\int_0^a x \, dx + \int_0^b x \, dx \\ &= -\frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2} \\ &= \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}. \end{aligned}$$

Örnek 33.7. $b > 0$ ise $\int_0^b x \, dx$ integralini bulunuz.

çözüm 1: Riemann Toplamı kullanacağız. Önce $[0, b]$ 'yi n parçaya

$$0 < \frac{b}{n} < \frac{2b}{n} < \frac{3b}{n} < \dots < \frac{(n-1)b}{n} < b$$

ve $c_k = \frac{kb}{n}$ kullanarak böleriz. Dikkat edilirse her k için $\Delta x_k = \frac{b}{n}$ olur. Bkz. şekil 33.2. Bu durumda

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k &= \sum_{k=1}^n \frac{kb}{n} \frac{b}{n} = \frac{b^2}{n^2} \sum_{k=1}^n k \\ &= \frac{b^2}{n^2} \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) = \frac{b^2}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right). \end{aligned}$$

O halde

$$\begin{aligned} \int_0^b x \, dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b^2}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \frac{b^2}{2}. \end{aligned}$$




Figure 33.3: The integral of x from 0 to b .
Şekil 33.3: 0 dan b ye x in integrali.

çözüm 2: Alternatif olarak, şekil 33.3 e bakarak

$$\int_0^b x \, dx = \text{area of a triangle} = \frac{1}{2} \times b \times b = \frac{b^2}{2}.$$

Örnek 33.8.

$$\begin{aligned} \int_a^b x \, dx &= \int_a^0 x \, dx + \int_0^b x \, dx \\ &= -\int_0^a x \, dx + \int_0^b x \, dx \\ &= -\frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2} \\ &= \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}. \end{aligned}$$

34

The Fundamental Theorem of Calculus

We don't want to have to use Riemann sums every time we need to calculate a definite integral – we want a better way. The following theorem is the most important theorem in Calculus. If you can only memorise one theorem for the exams, it should be this one.

Theorem 34.1 (The Fundamental Theorem of Calculus). Suppose that $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ is a continuous function.

(i). Then the function $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ defined by

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

is continuous on $[a, b]$; differentiable on (a, b) ; and its derivative is

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x).$$

(ii). If F is any antiderivative of f on $[a, b]$, then

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Remark. Part (i) of the theorem tells how to differentiate $\int_a^x f(t) dt$.

Example 34.1. Find $\frac{dy}{dx}$ if $y = \int_a^x (t^3 + 1) dt$.

solution:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \int_a^x (t^3 + 1) dt = x^3 + 1.$$

Example 34.2. Find $\frac{dy}{dx}$ if $y = \int_1^x \sin t dt$.

solution:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \int_1^x \sin t dt = \sin x.$$

Example 34.3. Find $\frac{dy}{dx}$ if $y = \int_0^x \sin \ln \tan e^{t^2} dt$.

Kalkülüsün Temel Teoremi

Bir belirli integrali hesaplamanız gerektiğinde her defasında Riemann toplamalarını kullanmamız gerekmiyor – daha iyi bir yol istiyoruz. Aşağıdaki teorem Kalkülüsün en önemli teoremidir. Sınavlar için bir teorem ezberleyeceğim diyorsanız, işte bu o teoremdir.

Theorem 34.1 (Kalkülüsün Temel Teoremi). $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 'nin sürekli bir fonksiyon olduğunu varsayalım.

(i). Bu durumda $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

de $[a, b]$ üzerinde süreklidir; (a, b) üzerinde türevlenebilir; ve türevi $f(x)$ 'tir

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x).$$

(ii). Eğer F de f 'nin $[a, b]$ üzerindeki herhangi bir ters türevi ise, bu durumda

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Not. Teoremin (i) kısmı $\int_a^x f(t) dt$ 'in türevini nasıl alacağımızı söyler.

Örnek 34.1. $y = \int_a^x (t^3 + 1) dt$ ise, $\frac{dy}{dx}$ 'i bulunuz.

çözüm:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \int_a^x (t^3 + 1) dt = x^3 + 1.$$

Örnek 34.2. $y = \int_1^x \sin t dt$ ise, $\frac{dy}{dx}$ 'i bulunuz.

çözüm:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \int_1^x \sin t dt = \sin x.$$

Örnek 34.3. $y = \int_0^x \sin \ln \tan e^{t^2} dt$ ise, $\frac{dy}{dx}$ 'i bulunuz.

solution:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \int_0^x \sin \ln \tan e^{t^2} dt = \sin \ln \tan e^{x^2}.$$

Example 34.4. Find $\frac{dy}{dx}$ if $y = \int_x^5 3t \sin t dt$.

solution:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \int_x^5 3t \sin t dt \\ &= \frac{d}{dx} \left(- \int_5^x 3t \sin t dt \right) \\ &= -3x \sin x. \end{aligned}$$

Example 34.5. Find $\frac{dy}{dx}$ if $y = \int_1^{x^2} \cos t dt$.

solution: This time we will need to use the Chain rule. Let $u = x^2$. Then

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \\ &= \left(\frac{d}{du} \int_1^u \cos t dt \right) \left(\frac{d}{dx} x^2 \right) \\ &= (\cos u) (2x) = 2x \cos x^2. \end{aligned}$$

Remark. Part (ii) of the theorem tells us how to calculate the definite integral of f over $[a, b]$:

STEP 1. Find an antiderivative F of f .

STEP 2. Calculate $F(b) - F(a)$.

Notation. We will write

$$\left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a).$$

Example 34.6.

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \cos x dx &= \left[\sin x \right]_0^\pi \\ &\quad \text{(because } \frac{d}{dx} \sin x = \cos x) \\ &= \sin \pi - \sin 0 \\ &= 0 - 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Example 34.7.

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \sec x \tan x dx &= \left[\sec x \right]_{-\frac{\pi}{4}}^0 \\ &\quad \text{(because } \frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x) \\ &= \sec 0 - \sec -\frac{\pi}{4} \\ &= 1 - \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Example 34.8.

$$\begin{aligned} \int_1^4 \left(\frac{3}{2} \sqrt{x} - \frac{4}{x^2} \right) dx &= \left[x^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{x} \right]_1^4 \\ &\quad \left(\text{because } \frac{d}{dx} \left(x^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{x} \right) = \frac{3}{2} \sqrt{x} - \frac{4}{x^2} \right) \\ &= \left(4^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{4} \right) - \left(1^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{1} \right) \\ &= (8 + 1) - (1 + 4) \\ &= 4. \end{aligned}$$

çözüm:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \int_0^x \sin \ln \tan e^{t^2} dt = \sin \ln \tan e^{x^2}.$$

Örnek 34.4. $y = \int_x^5 3t \sin t dt$ ise, $\frac{dy}{dx}$ 'i bulunuz.

çözüm:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \int_x^5 3t \sin t dt \\ &= \frac{d}{dx} \left(- \int_5^x 3t \sin t dt \right) \\ &= -3x \sin x. \end{aligned}$$

Örnek 34.5. $y = \int_1^{x^2} \cos t dt$ ise, $\frac{dy}{dx}$ 'i bulunuz.

çözüm: Bu sefer Zincir kuralı kullanmamız gerekecek. $u = x^2$ diyelim. O zaman

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \\ &= \left(\frac{d}{du} \int_1^u \cos t dt \right) \left(\frac{d}{dx} x^2 \right) \\ &= (\cos u) (2x) = 2x \cos x^2. \end{aligned}$$

Not. Teoremin (ii) kısmı f 'nin $[a, b]$ üzerindeki belirli integrali nasıl hesaplayacağımızı söyler :

ADIM 1. f 'nin bir ters türevi olan F 'yi bulunuz.

ADIM 2. $F(b) - F(a)$ sayısını hesaplayınız.

Notasyon. We will write

$$\left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a).$$

Örnek 34.6.

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \cos x dx &= \left[\sin x \right]_0^\pi \\ &\quad \text{(çünkü } \frac{d}{dx} \sin x = \cos x) \\ &= \sin \pi - \sin 0 \\ &= 0 - 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Örnek 34.7.

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \sec x \tan x dx &= \left[\sec x \right]_{-\frac{\pi}{4}}^0 \\ &\quad \text{(çünkü } \frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x) \\ &= \sec 0 - \sec -\frac{\pi}{4} \\ &= 1 - \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Örnek 34.8.

$$\begin{aligned} \int_1^4 \left(\frac{3}{2} \sqrt{x} - \frac{4}{x^2} \right) dx &= \left[x^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{x} \right]_1^4 \\ &\quad \left(\text{çünkü } \frac{d}{dx} \left(x^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{x} \right) = \frac{3}{2} \sqrt{x} - \frac{4}{x^2} \right) \\ &= \left(4^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{4} \right) - \left(1^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{1} \right) \\ &= (8 + 1) - (1 + 4) \\ &= 4. \end{aligned}$$

Total Area

Example 34.9. Let $f(x) = x^2 - 4$ and $g(x) = 4 - x^2$. See figure 34.1. We have that

$$\begin{aligned}\int_{-2}^2 f(x) dx &= \int_{-2}^2 (x^2 - 4) dx = \left[\frac{x^3}{3} - 4x \right]_{-2}^2 \\ &= \left(\frac{8}{3} - 8 \right) - \left(\frac{-8}{3} + 8 \right) = -\frac{32}{3}\end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned}\int_{-2}^2 g(x) dx &= \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 \\ &= \left(8 - \frac{8}{3} \right) - \left(8 + \frac{-8}{3} \right) = \frac{32}{3}.\end{aligned}$$

The total area between the graph of $y = f(x)$ and the x -axis, over $[-2, 2]$, is $|\frac{-32}{3}| = \frac{32}{3}$. The total area between the graph of $y = g(x)$ and the x -axis, over $[-2, 2]$, is $|\frac{32}{3}| = \frac{32}{3}$.




Figure 34.1: Graphs showing $\int_{-2}^2 (x^2 - 4) dx$ and $\int_{-2}^2 (4 - x^2) dx$.
Şekil 34.1: $\int_{-2}^2 (x^2 - 4) dx$ ve $\int_{-2}^2 (4 - x^2) dx$ integrallerini gösteren grafikler.

Example 34.10. Let $f(x) = \sin x$. Calculate

- the definite integral of f over $[0, 2\pi]$; and
- the total area between the graph of $y = f(x)$ and the x -axis over $[0, 2\pi]$.

solution:

(i).

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \sin x dx &= \left[-\cos x \right]_0^{2\pi} = -\cos 2\pi + \cos 0 \\ &= -1 + 1 = 0.\end{aligned}$$

(ii).

$$\begin{aligned}\text{total area} &= \int_0^{\pi} \sin x dx + \left| \int_{\pi}^{2\pi} \sin x dx \right| \\ &= \left[-\cos x \right]_0^{\pi} + \left| \left[-\cos x \right]_{\pi}^{2\pi} \right| \\ &= -\cos \pi + \cos 0 + |-\cos 2\pi + \cos \pi| \\ &= -(-1) + 1 + |-1 + (-1)| = 4.\end{aligned}$$

Toplam Alan

Örnek 34.9. $f(x) = x^2 - 4$ ve $g(x) = 4 - x^2$ olsun. Bkz. şekil 34.1. Burada

$$\begin{aligned}\int_{-2}^2 f(x) dx &= \int_{-2}^2 (x^2 - 4) dx = \left[\frac{x^3}{3} - 4x \right]_{-2}^2 \\ &= \left(\frac{8}{3} - 8 \right) - \left(\frac{-8}{3} + 8 \right) = -\frac{32}{3}\end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned}\int_{-2}^2 g(x) dx &= \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 \\ &= \left(8 - \frac{8}{3} \right) - \left(8 + \frac{-8}{3} \right) = \frac{32}{3}.\end{aligned}$$

$y = f(x)$ grafiği ve x -ekseni arasında kalan, $[-2, 2]$ üzerindeki toplam alan, $|\frac{-32}{3}| = \frac{32}{3}$. $y = g(x)$ ve x -ekseni arasında kalan, $[-2, 2]$ üzerindeki toplam alan, ise $|\frac{32}{3}| = \frac{32}{3}$ olur.




Figure 34.3: The total area between the graph $y = \sin x$ and the x -axis over $[0, 2\pi]$.

Şekil 34.3: $[0, 2\pi]$ üzerinde $y = \sin x$ grafiğiyle x -ekseni arasında kalan toplam alan.

Örnek 34.10. $f(x) = \sin x$ olsun.

- f 'nin $[0, 2\pi]$ üzerindeki belirli integralini; ve
- $y = f(x)$ grafiği ile x -ekseni arasında $[0, 2\pi]$ üzerinde kalan alanı bulunuz.

çözüm:

(a).

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \sin x dx &= \left[-\cos x \right]_0^{2\pi} = -\cos 2\pi + \cos 0 \\ &= -1 + 1 = 0.\end{aligned}$$

(b).

$$\begin{aligned}\text{toplam alan} &= \int_0^{\pi} \sin x dx + \left| \int_{\pi}^{2\pi} \sin x dx \right| \\ &= \left[-\cos x \right]_0^{\pi} + \left| \left[-\cos x \right]_{\pi}^{2\pi} \right| \\ &= -\cos \pi + \cos 0 + |-\cos 2\pi + \cos \pi| \\ &= -(-1) + 1 + |-1 + (-1)| = 4.\end{aligned}$$

Summary

To find the **total area** between the graph of $y = f(x)$ and the x -axis over $[a, b]$:

STEP 1. Divide $[a, b]$ at the zeroes of f .

STEP 2. Integrate f over each subinterval.

STEP 3. Add the absolute values of the integrals.

Example 34.11. Find the total area between the graph of $y = x^3 - x^2 - 2x$ and the x -axis for $-1 \leq x \leq 2$.

solution:

1. Let $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$. Since $0 = f(x) = x^3 - x^2 - 2x = x(x+1)(x-2)$ implies that $x = 0$ or $x = -1$ or $x = 2$, we divide $[-1, 2]$ into $[-1, 0]$ and $[0, 2]$.

2. We calculate that

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-1}^0 \\ &= (0 - 0 - 0) - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1 \right) \\ &= \frac{5}{12} \end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned} \int_0^2 (x^3 - x^2 - 2x) dx &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2 \\ &= \left(\frac{16}{4} - \frac{8}{3} - 4 \right) - (0 - 0 - 0) \\ &= -\frac{8}{3}. \end{aligned}$$

3. Therefore

$$\text{total area} = \left| \frac{5}{12} \right| + \left| -\frac{8}{3} \right| = \frac{37}{12}.$$




Figure 34.2: The total area between the graph $y = x^3 - x^2 - 2x$ and the x -axis over $[-1, 2]$.

Şekil 34.2: $[-1, 2]$ üzerinde olan, $y = x^3 - x^2 - 2x$ ve x -ekseni arasındaki toplam alan.

Summary

$[a, b]$ üzerindeki $y = f(x)$ grafiği ve x -ekseni arasında kalan **toplam alanı** bulmak için:

ADIM 1. f 'nin köklerinin olduğu yerlerde $[a, b]$ bölünür.

ADIM 2. Her bir alt-aralık üzerinde f integre edilir.

ADIM 3. Her bir integralin mutlak değerleri toplanır.

Örnek 34.11. $-1 \leq x \leq 2$ ise $y = x^3 - x^2 - 2x$ grafiği ve x -ekseni arasında kalan alanı bulunuz.

çözüm:

1. $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$ olsun. $0 = f(x) = x^3 - x^2 - 2x = x(x+1)(x-2)$ olduğundan $x = 0$ veya $x = -1$ veya $x = 2$ olduğundan, $[-1, 2]$ 'yi $[-1, 0]$ ve $[0, 2]$ 'ye ayırırız.

2. Kolayca hesaplanacağı üzere

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-1}^0 \\ &= (0 - 0 - 0) - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1 \right) \\ &= \frac{5}{12} \end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned} \int_0^2 (x^3 - x^2 - 2x) dx &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2 \\ &= \left(\frac{16}{4} - \frac{8}{3} - 4 \right) - (0 - 0 - 0) \\ &= -\frac{8}{3}. \end{aligned}$$

3. Dolayısıyla

$$\text{toplam alan} = \left| \frac{5}{12} \right| + \left| -\frac{8}{3} \right| = \frac{37}{12}.$$

olur.

The Average Value of a Continuous Function

The average of $\{1, 2, 2, 6, 9\}$ is $\frac{1+2+2+6+9}{5} = \frac{20}{5} = 4$. We can also calculate the average value of a continuous function.

Definition. If f is integrable on $[a, b]$, then the **average value of f on $[a, b]$** is

$$\text{av}(f) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Example 34.12. Find the average value of $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ on $[-2, 2]$.

solution: Since

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 f(x) dx &= \frac{1}{2} \times \text{the area of a circle of radius 2} \\ &= \frac{1}{2} \pi 2^2 = 2\pi, \end{aligned}$$

we have that

$$\text{av}(f) = \frac{1}{2 - (-2)} \int_{-2}^2 f(x) dx = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

Example 34.13. Find the average value of $g(x) = x^3 - x$ on $[0, 1]$.

solution:

$$\begin{aligned} \text{av}(g) &= \frac{1}{1-0} \int_0^1 g(x) dx = \int_0^1 (x^3 - x) dx \\ &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}. \end{aligned}$$




Figure 34.4: The average value of $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ on $[-2, 2]$ is $\text{av}(f) = \frac{\pi}{2}$.

Şekil 34.4: $[-2, 2]$ üzerinde $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ 'nin ortalama değeri $\text{ort}(f) = \frac{\pi}{2}$.

Sürekli Bir Fonksiyonun Ortalama Değeri

$\{1, 2, 2, 6, 9\}$ kümesinin ortalaması $\frac{1+2+2+6+9}{5} = \frac{20}{5} = 4$ tür. Sürekli bir fonksiyonun ortalama değerini de hesaplayabiliriz..

Tanım. $[a, b]$ üzerinde f integrallenebilir ise, **f 'nin $[a, b]$ üzerinde ortalama değeri**

$$\text{ort}(f) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Örnek 34.12. $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ 'nin $[-2, 2]$ üzerindeki ortalama değerini bulunuz.

çözüm:

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 f(x) dx &= \frac{1}{2} \times 2 \text{ yarıçaplı çemberin alanı} \\ &= \frac{1}{2} \pi 2^2 = 2\pi, \end{aligned}$$

olduğundan,

$$\text{ort}(f) = \frac{1}{2 - (-2)} \int_{-2}^2 f(x) dx = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

Örnek 34.13. $g(x) = x^3 - x$ 'in $[0, 1]$ üzerindeki ortalama değerini bulunuz.

çözüm:

$$\begin{aligned} \text{ort}(g) &= \frac{1}{1-0} \int_0^1 g(x) dx = \int_0^1 (x^3 - x) dx \\ &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}. \end{aligned}$$




Figure 34.5: The average value of $g(x) = x^3 - x$ on $[0, 1]$ is $\text{av}(g) = -\frac{1}{4}$.

Şekil 34.5: $[0, 1]$ üzerinde $g(x) = x^3 - x$ 'nin ortalama değeri $\text{ort}(g) = -\frac{1}{4}$.

Indefinite Integrals & Definite Integrals

Belirsiz Integral ve Belirli Integral

Remember that $\int f(x) dx$ is a function.	Remember that $\int_a^b f(x) dx$ is a number.	Bilinmesi gereken $\int f(x) dx$ bir fonksiyon.	Bilinmesi gereken $\int_a^b f(x) dx$ bir sayı.
For example $\int x dx = \frac{x^2}{2} + C$	For example $\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$	Örneğin $\int x dx = \frac{x^2}{2} + C$	Örneğin $\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$
and $\int \cos x dx = \sin x + C.$	and $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 1.$	ve $\int \cos x dx = \sin x + C.$	ve $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 1.$

Problems

Problem 34.1 (The Fundamental Theorem of Calculus).

- (a). Find $\frac{dy}{dx}$ if $y = \int_0^x \sqrt{1+t^2} dt$.
- (b). Find $\frac{db}{dt}$ if $b = \int_0^{t^4} \sqrt{u} du$.
- (c). Find $\frac{dp}{dx}$ if $p = \int_2^{x^2} \sin(t^3) dt$.
- (d). Find $\frac{dz}{dx}$ if $z = \int_{\sqrt{x}}^{10} \sin(t^2) dt$.

Problem 34.2 (Definite Integrals). Find the following definite integrals.

- (a). $\int_{-2}^0 (2x+5) dx$,
- (b). $\int_0^1 x^3 dx$,
- (c). $\int_{-2}^2 \sin \theta d\theta$,
- (d). $\int_{-3}^4 \left(5 - \frac{x}{2}\right) dx$,
- (e). $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt$,
- (f). $\int_1^{32} t^{-\frac{6}{5}} dt$,
- (g). $\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{1 + \cos 2x}{2} dx$,
- (h). $\int_1^{-1} (r+1)^2 dr$,

Soru 34.1 (Kalkülüsün Temel Teorem).

- (a). $y = \int_0^x \sqrt{1+t^2} dt$ ise $\frac{dy}{dx}$ 'i bulunuz.
- (b). $b = \int_0^{t^4} \sqrt{u} du$ ise $\frac{db}{dt}$ 'yi bulunuz.
- (c). $p = \int_2^{x^2} \sin(t^3) dt$ ise $\frac{dp}{dx}$ 'i bulunuz.
- (d). $z = \int_{\sqrt{x}}^{10} \sin(t^2) dt$ ise $\frac{dz}{dx}$ 'i bulunuz.

Soru 34.2 (Belirli İntegraller). Aşağıdaki belirli integralleri bulunuz.

- (i). $\int_1^{\sqrt{2}} \frac{s^2 + \sqrt{s}}{s^2} ds$,
- (j). $\int_{-4}^4 |x| dx$,
- (k). $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin 2x}{2 \sin x} dx$,
- (l). $\int_0^{\frac{\pi}{3}} 2 \sec^2 x dx$.

35

The Substitution Method

Yerine Koyma Yöntemi

The Substitution Method for Indefinite Integrals

By the Chain rule,

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u^{n+1}}{n+1} \right) = u^n \frac{du}{dx}.$$

So

$$\int u^n \frac{du}{dx} dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C.$$

But we know that

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$$

also. So it looks like

$$\boxed{du = \frac{du}{dx} dx.}$$

Example 35.1. Find $\int (x^3 + x)^5 (3x^2 + 1) dx$.

solution: Let $u = x^3 + x$. Then $du = \frac{du}{dx} dx = (3x^2 + 1) dx$. By substitution, we have that

$$\begin{aligned} \int (x^3 + x)^5 (3x^2 + 1) dx &= \int u^5 du \\ &= \frac{u^6}{6} + C = \frac{1}{6} (x^3 + x)^6 + C. \end{aligned}$$

Example 35.2. Find $\int \sqrt{2x+1} dx$.

solution: Let $u = 2x + 1$. Then $du = \frac{du}{dx} dx = 2dx$. So $dx = \frac{1}{2} du$. Therefore

$$\begin{aligned} \int \sqrt{2x+1} dx &= \int u^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} du \right) = \frac{1}{2} \int u^{\frac{1}{2}} du \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right) + C = \frac{1}{3} (2x+1)^{\frac{3}{2}} + C. \end{aligned}$$

Belirsiz İntegralde Yerine Koyma Yöntemi

Zincir Kuralı gereğince,

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u^{n+1}}{n+1} \right) = u^n \frac{du}{dx}.$$

Bu yüzden

$$\int u^n \frac{du}{dx} dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C.$$

Biliyoruz ki

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$$

doğrudur. Yani şuna benziyor.

$$\boxed{du = \frac{du}{dx} dx.}$$

Örnek 35.1. $\int (x^3 + x)^5 (3x^2 + 1) dx$ 'i bulunuz.

çözüm: $u = x^3 + x$. olsun. Öyleyse $du = \frac{du}{dx} dx = (3x^2 + 1) dx$. Değişken değiştirerek, şunu bulmak mümkün

$$\begin{aligned} \int (x^3 + x)^5 (3x^2 + 1) dx &= \int u^5 du \\ &= \frac{u^6}{6} + C = \frac{1}{6} (x^3 + x)^6 + C. \end{aligned}$$

Örnek 35.2. $\int \sqrt{2x+1} dx$ 'i bulunuz.

çözüm: Diyelim ki $u = 2x + 1$. O zaman $du = \frac{du}{dx} dx = 2dx$ olur. Yani $dx = \frac{1}{2} du$. Böyle olunca

$$\begin{aligned} \int \sqrt{2x+1} dx &= \int u^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} du \right) = \frac{1}{2} \int u^{\frac{1}{2}} du \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right) + C = \frac{1}{3} (2x+1)^{\frac{3}{2}} + C. \end{aligned}$$

Theorem 35.1 (The Substitution Method). *If*

- $u = g(x)$ is differentiable;
- $g : \mathbb{R} \rightarrow I$; and
- $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ is continuous,

then

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du.$$

Example 35.3. Find $\int 5 \sec^2(5t+1) dt$.

solution: Let $u = 5t + 1$. Then $du = \frac{du}{dt} dt = 5dt$. So

$$\begin{aligned} \int 5 \sec^2(5t+1) dt &= \int \sec^2 u du \\ &= \tan u + C \\ &\quad \text{(because } \frac{d}{du} \tan u = \sec^2 u) \\ &= \tan(5t+1) + C. \end{aligned}$$

Example 35.4. Find $\int \cos(7\theta+3) d\theta$.

solution: Let $u = 7\theta + 3$. Then $du = \frac{du}{d\theta} d\theta = 7d\theta$. So $d\theta = \frac{1}{7}du$ and

$$\begin{aligned} \int \cos(7\theta+3) d\theta &= \frac{1}{7} \int \cos u du \\ &= \frac{1}{7} \sin u + C = \frac{1}{7} \sin(7\theta+3) + C. \end{aligned}$$

Example 35.5. Find $\int x^2 \sin(x^3) dx$.

solution: Let $u = x^3$. Then $du = \frac{du}{dx} dx = 3x^2 dx$. So $\frac{1}{3}du = x^2 dx$ and

$$\begin{aligned} \int x^2 \sin(x^3) dx &= \int \frac{1}{3} \sin u du = -\frac{1}{3} \cos u + C \\ &= -\frac{1}{3} \cos(x^3) + C. \end{aligned}$$

Example 35.6. Find $\int x\sqrt{2x+1} dx$.

solution: Let $u = 2x + 1$. Then $du = \frac{du}{dx} dx = 2dx$. So $dx = \frac{1}{2}du$ and

$$\int x\sqrt{2x+1} dx = \int x\sqrt{u} \frac{1}{2} du.$$

But we still have an x here. We can't integrate until we change all the x terms to u terms. Note that

$$u = 2x + 1 \implies u - 1 = 2x \implies \frac{1}{2}(u - 1) = x.$$

Theorem 35.1 (Yerine Koyma Yöntemi).

- $u = g(x)$ türevlenebilir;
- $g : \mathbb{R} \rightarrow I$; ve
- $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ sürekli,

bunun üzerine

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du.$$

Örnek 35.3. $\int 5 \sec^2(5t+1) dt$ 'yi bulunuz.

çözüm: $u = 5t + 1$ diyelim. Buradan $du = \frac{du}{dt} dt = 5dt$ olur. Yani

$$\begin{aligned} \int 5 \sec^2(5t+1) dt &= \int \sec^2 u du \\ &= \tan u + C \\ &\quad \left(\frac{d}{du} \tan u = \sec^2 u \text{ olduğundan} \right) \\ &= \tan(5t+1) + C. \end{aligned}$$

Örnek 35.4. $\int \cos(7\theta+3) d\theta$ 'yi bulunuz.

çözüm: $u = 7\theta + 3$ olsun. Buradan $du = \frac{du}{d\theta} d\theta = 7d\theta$. Böylece $d\theta = \frac{1}{7}du$ ve

$$\begin{aligned} \int \cos(7\theta+3) d\theta &= \frac{1}{7} \int \cos u du \\ &= \frac{1}{7} \sin u + C = \frac{1}{7} \sin(7\theta+3) + C. \end{aligned}$$

bulunur.

Örnek 35.5. $\int x^2 \sin(x^3) dx$ 'i bulunuz.

çözüm: $u = x^3$ olsun. Yani $du = \frac{du}{dx} dx = 3x^2 dx$. Böylece $\frac{1}{3}du = x^2 dx$ ve

$$\begin{aligned} \int x^2 \sin(x^3) dx &= \int \frac{1}{3} \sin u du = -\frac{1}{3} \cos u + C \\ &= -\frac{1}{3} \cos(x^3) + C. \end{aligned}$$

bulunur.

Örnek 35.6. $\int x\sqrt{2x+1} dx$ 'i bulunuz.

çözüm: $u = 2x + 1$ diyelim. Bu durumda $du = \frac{du}{dx} dx = 2dx$ olur. Yani $dx = \frac{1}{2}du$ ve

$$\int x\sqrt{2x+1} dx = \int x\sqrt{u} \frac{1}{2} du$$

buluruz. Elimizde hala x var. Bütün x 'li terimleri u 'lu terimlere dönüştürmedikçe integre edemiyoruz. Şunu akılda tutarak,

$$u = 2x + 1 \implies u - 1 = 2x \implies \frac{1}{2}(u - 1) = x.$$

Therefore

$$\begin{aligned}
 \int x\sqrt{2x+1} \, dx &= \int \frac{1}{2}(u-1)\sqrt{u} \frac{1}{2} du \\
 &= \frac{1}{4} \int u^{\frac{3}{2}} - u^{\frac{1}{2}} \, du \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{2}{5} u^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} \right) + C \\
 &= \frac{1}{10} u^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{6} u^{\frac{3}{2}} + C \\
 &= \frac{1}{10} (2x+1)^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{6} (2x+1)^{\frac{3}{2}} + C.
 \end{aligned}$$

Example 35.7. Find $\int \frac{2z}{\sqrt[3]{z^2+1}} \, dz$.

solution: Let $u = z^2 + 1$. Then $du = \frac{du}{dx} \, dx = 2z \, dz$ and

$$\begin{aligned}
 \int \frac{2z}{\sqrt[3]{z^2+1}} \, dz &= \int \frac{du}{u^{\frac{1}{3}}} \\
 &= \int u^{-\frac{1}{3}} \, du \\
 &= \frac{u^{\frac{2}{3}}}{\frac{2}{3}} + C \\
 &= \frac{3}{2} u^{\frac{2}{3}} + C \\
 &= \frac{3}{2} (z^2+1)^{\frac{2}{3}} + C.
 \end{aligned}$$

Example 35.8. Find $\int \sin^2 x \, dx$.

solution: We use the identity

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

to calculate that

$$\begin{aligned}
 \int \sin^2 x \, dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x \right) + C \\
 &= \frac{1}{2} x - \frac{1}{4} \sin 2x + C.
 \end{aligned}$$

Example 35.9. Similarly

$$\int \cos^2 x \, dx = \int \frac{1 + \cos 2x}{2} \, dx = \frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \sin 2x + C.$$

Bu yüzden

$$\begin{aligned}
 \int x\sqrt{2x+1} \, dx &= \int \frac{1}{2}(u-1)\sqrt{u} \frac{1}{2} du \\
 &= \frac{1}{4} \int u^{\frac{3}{2}} - u^{\frac{1}{2}} \, du \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{2}{5} u^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} \right) + C \\
 &= \frac{1}{10} u^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{6} u^{\frac{3}{2}} + C \\
 &= \frac{1}{10} (2x+1)^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{6} (2x+1)^{\frac{3}{2}} + C.
 \end{aligned}$$

bulunmuş olur.

Örnek 35.7. $\int \frac{2z}{\sqrt[3]{z^2+1}} \, dz$ integralini bulunuz.

çözüm: $u = z^2 + 1$ diyelim. Buradan $du = \frac{du}{dx} \, dx = 2z \, dz$ ve oradan da

$$\begin{aligned}
 \int \frac{2z}{\sqrt[3]{z^2+1}} \, dz &= \int \frac{du}{u^{\frac{1}{3}}} \\
 &= \int u^{-\frac{1}{3}} \, du \\
 &= \frac{u^{\frac{2}{3}}}{\frac{2}{3}} + C \\
 &= \frac{3}{2} u^{\frac{2}{3}} + C \\
 &= \frac{3}{2} (z^2+1)^{\frac{2}{3}} + C.
 \end{aligned}$$

elde edilir

Örnek 35.8. $\int \sin^2 x \, dx$ integralini bulunuz.

çözüm: Burada kullanacağımız özdeşlik

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

ve buradan da

$$\begin{aligned}
 \int \sin^2 x \, dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x \right) + C \\
 &= \frac{1}{2} x - \frac{1}{4} \sin 2x + C
 \end{aligned}$$

bulunur.

Örnek 35.9. Benzer şekilde

$$\int \cos^2 x \, dx = \int \frac{1 + \cos 2x}{2} \, dx = \frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \sin 2x + C$$

bulunur.

The Substitution Method for Definite Integrals

Theorem 35.2 (The Substitution Method). *If*

- $u = g(x)$ is differentiable on $[a, b]$;
- g' is continuous on $[a, b]$; and
- f is continuous on the range of g ,

then

$$\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$$

Example 35.10. Calculate $\int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx$.

solution 1. We can use the previous theorem to solve this example. Let $u = x^3 + 1$. Then $du = 3x^2 dx$. Moreover $x = -1 \Rightarrow u = 0$ and $x = 1 \Rightarrow u = 2$. So

$$\begin{aligned} \int_{x=-1}^{x=1} 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \int_{u=0}^{u=2} \sqrt{u} du = \left[\frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 \\ &= \frac{2}{3} \left(2^{\frac{3}{2}} - 0^{\frac{3}{2}} \right) = \frac{2}{3} 2\sqrt{2} = \frac{4\sqrt{2}}{3}. \end{aligned}$$

solution 2. Alternately, we can first find the indefinite integral, then find the required definite integral.

Let $u = x^3 + 1$. Then $du = 3x^2 dx$. So

$$\int 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx = \int \sqrt{u} du = \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{\frac{3}{2}} + C.$$

Therefore

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \left[\frac{2}{3} (x^3 + 1)^{\frac{3}{2}} \right]_{-1}^1 \\ &= \left(\frac{2}{3} (1 + 1)^{\frac{3}{2}} \right) - \left(\frac{2}{3} (-1 + 1)^{\frac{3}{2}} \right) \\ &= \frac{2}{3} \times 2^{\frac{3}{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{3}. \end{aligned}$$

Example 35.11. Calculate $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot \theta \operatorname{cosec}^2 \theta d\theta$.

solution: Let $u = \cot \theta$. Then $du = \frac{du}{d\theta} d\theta = -\operatorname{cosec}^2 \theta d\theta$. So $-du = \operatorname{cosec}^2 \theta d\theta$. Moreover $\theta = \frac{\pi}{4} \Rightarrow u = \cot \frac{\pi}{4} = 1$ and $\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow u = \cot \frac{\pi}{2} = 0$. Hence

$$\begin{aligned} \int_{\theta=\frac{\pi}{4}}^{\theta=\frac{\pi}{2}} \cot \theta \operatorname{cosec}^2 \theta d\theta &= \int_{u=1}^{u=0} u (-du) = - \int_1^0 u du \\ &= - \left[\frac{u^2}{2} \right]_1^0 = - \left(\frac{0^2}{2} - \frac{1^2}{2} \right) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Belirli İntegralde Değişken Değiştirme

Teorem 35.2 (Değişken Değiştirme Yöntemi). *Eğer*

- $u = g(x)$ fonksiyonu $[a, b]$ 'de türevliyse;
- g' fonksiyonu $[a, b]$ 'de sürekliyse; ve
- f fonksiyonu da g 'nin görüntü kümesinde sürekliyse,

bu durumda

$$\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

olur.

Örnek 35.10. $\int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx$ integralini bulunuz.

çözüm 1. Bu soruyu yapmak için önceki teoremi kullanabiliriz. Diyelim ki, $u = x^3 + 1$ olsun. Bu durumda $du = 3x^2 dx$ olur. Ayrıca $x = -1 \Rightarrow u = 0$ ve $x = 1 \Rightarrow u = 2$ olur. Buradan

$$\begin{aligned} \int_{x=-1}^{x=1} 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \int_{u=0}^{u=2} \sqrt{u} du = \left[\frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 \\ &= \frac{2}{3} \left(2^{\frac{3}{2}} - 0^{\frac{3}{2}} \right) = \frac{2}{3} 2\sqrt{2} = \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

bulunmuş olur.

çözüm 2. Değişimli olarak, önce belirsiz integrali bulur, daha sonra da belirli integrali bulabiliriz.

Şimdi $u = x^3 + 1$ olsun. Buradan $du = 3x^2 dx$ olur. Bu sebeple

$$\int 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx = \int \sqrt{u} du = \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{\frac{3}{2}} + C.$$

Böylece

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \left[\frac{2}{3} (x^3 + 1)^{\frac{3}{2}} \right]_{-1}^1 \\ &= \left(\frac{2}{3} (1 + 1)^{\frac{3}{2}} \right) - \left(\frac{2}{3} (-1 + 1)^{\frac{3}{2}} \right) \\ &= \frac{2}{3} \times 2^{\frac{3}{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{3}. \end{aligned}$$

Örnek 35.11. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot \theta \operatorname{cosec}^2 \theta d\theta$ 'yi bulunuz.

çözüm: $u = \cot \theta$ olsun. Buradan $du = \frac{du}{d\theta} d\theta = -\operatorname{cosec}^2 \theta d\theta$ olur. Böylece $-du = \operatorname{cosec}^2 \theta d\theta$ bulunur. Ayrıca $\theta = \frac{\pi}{4} \Rightarrow u = \cot \frac{\pi}{4} = 1$ ve $\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow u = \cot \frac{\pi}{2} = 0$ bulunur. Bunun sonucu olarak da

$$\begin{aligned} \int_{\theta=\frac{\pi}{4}}^{\theta=\frac{\pi}{2}} \cot \theta \operatorname{cosec}^2 \theta d\theta &= \int_{u=1}^{u=0} u (-du) = - \int_1^0 u du \\ &= - \left[\frac{u^2}{2} \right]_1^0 = - \left(\frac{0^2}{2} - \frac{1^2}{2} \right) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

bulunur

Problems

Problem 35.1. Use a substitution to evaluate the following indefinite integrals. You must show your working.

$$(a). \int 2(2x+4)^5 dx.$$

$$(b). \int 2x(x^2+5)^{-4} dx.$$

$$(c). \int (3x+2)(3x^2+4x)^4 dx.$$

$$(d). \int \sec 2t \tan 2t dt.$$

$$(e). \int \frac{9r^2 dr}{\sqrt{1-r^3}}.$$

$$(f). \int \sqrt{x} \sin^2(x^{\frac{3}{2}} - 1) dx.$$

$$(g). \int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} dx$$

$$(h). \int r^4 \left(7 - \frac{r^5}{10}\right)^3 dr.$$

Problem 35.2. Use a substitution to evaluate the following definite integrals. You must show your working.

$$(a). \int_0^3 \sqrt{y+1} dy.$$

$$(b). \int_{-1}^0 \sqrt{y+1} dy.$$

$$(c). \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x \sec^2 x dx$$

$$(d). \int_{-1}^1 t^3(1+t^4)^3 dt.$$

$$(e). \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} dx.$$

$$(f). \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 - \cos 3t) \sin 3t dt.$$

Sorular

Soru 35.1. Yerine koyma (değişken değiştirme) yöntemi kullanarak, aşağıdaki belirsiz integralleri bulunuz. İşlemlerini açıklamalısınız.

$$(i). \int \frac{1}{\theta^2} \sin \frac{1}{\theta} \cos \frac{1}{\theta} d\theta.$$

$$(j). \int x(x-1)^{10} dx.$$

$$(k). \int x^3 \sqrt{x^2+1} dx.$$

$$(l). \int z^2 e^{(z^3)} dz.$$

Soru 35.2. Yerine koyma (değişken değiştirme) yöntemi kullanarak, aşağıdaki belirli integralleri bulunuz. İşlemlerini açıklamalısınız.

$$(g). \int_0^1 (4y-y^2+4y^3+1)^{-\frac{2}{3}}(12y^2-2y+4) dy$$

$$(h). \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\sin x}{(3+2\cos x)^2} dx.$$

$$(i). \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{(3+2\cos x)^2} dx.$$

Area Between Curves

Eğriler Arasındaki Alanlar




Figure 36.1: The region between the curves $y = f(x)$ and $y = g(x)$ for $a \leq x \leq b$.
Şekil 36.1: $a \leq x \leq b$ iken $y = f(x)$ ve $y = g(x)$ eğrileri arasındaki alan.

Definition. If

- f is continuous;
- g is continuous; and
- $f(x) \geq g(x)$ on $[a, b]$,

then the **area of the region between the curves $y = f(x)$ and $y = g(x)$ for $a \leq x \leq b$** is

$$\text{area} = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$

Example 36.1. Find the area between $y = 2 - x^2$ and $y = -x$.

Tanım. Eğer

- f sürekli;
- g sürekli; ve
- $[a, b]$ üzerinde $f(x) \geq g(x)$ 'se,

o zaman $a \leq x \leq b$ olduğunda $y = f(x)$ ve $y = g(x)$ eğrileri arasındaki alan

$$\text{alan} = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$




Figure 36.2: The region between the curves $y = 2 - x^2$ and $y = -x$.
Şekil 36.2: $y = 2 - x^2$ ve $y = -x$ arasındaki bölge

Örnek 36.1. $y = 2 - x^2$ ve $y = -x$ arasındaki alanı bulunuz.

çözüm: İlk olarak integrasyon sınırlarını buluruz:

$$2 - x^2 = -x$$

$$0 = x^2 - x - 2$$

$$0 = (x + 1)(x - 2) \implies x = -1 \text{ veya } 2.$$

solution: First we need to find the limits of integration:

$$\begin{aligned} 2 - x^2 &= -x \\ 0 &= x^2 - x - 2 \\ 0 &= (x + 1)(x - 2) \implies x = -1 \text{ or } 2. \end{aligned}$$

We need to integrate from $x = -1$ to $x = 2$. Therefore

$$\begin{aligned} \text{area} &= \int_{-1}^2 \left((2 - x^2) - (-x) \right) dx \\ &= \int_{-1}^2 (2 + x - x^2) dx \\ &= \left[2x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_{-1}^2 \\ &= \left(4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} \right) - \left(-2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

Example 36.2. Find the area bounded by $y = \sqrt{x}$, $y = x - 2$ and the x -axis, for $x \geq 0$ and $y \geq 0$.

solution: First we calculate that

$$\begin{aligned} \sqrt{x} &= x - 2 \\ x &= (x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4 \\ 0 &= x^2 - 5x + 4 = (x - 1)(x - 4) \implies x = 1 \text{ or } 4. \end{aligned}$$

Since $\sqrt{1} \neq 1 - 2$, we must have $x = 4$. See figure 36.3. Therefore

$$\begin{aligned} \text{area} &= \text{blue area} + \text{red area} \\ &= \int_0^2 \sqrt{x} dx + \int_2^4 \left(\sqrt{x} - (x - 2) \right) dx \\ &= \int_0^2 x^{\frac{1}{2}} dx + \int_2^4 \left(x^{\frac{1}{2}} - x + 2 \right) dx \\ &= \left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 + \left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}x^2 + 2x \right]_2^4 \\ &= \left(\frac{2}{3}(2)^{\frac{3}{2}} - 0 \right) + \left(\frac{2}{3}(4)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}(16) + 2(4) \right) \\ &\quad - \left(\frac{2}{3}(2)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}(4) + 2(2) \right) \\ &= \frac{4\sqrt{2}}{3} + \frac{16}{3} - 8 + 8 - \frac{4\sqrt{2}}{3} + 2 - 4 = \frac{10}{3}. \end{aligned}$$

$x = -1$ den $x = 2$ 'ye integre ederiz. Böylece

$$\begin{aligned} \text{area} &= \int_{-1}^2 \left((2 - x^2) - (-x) \right) dx \\ &= \int_{-1}^2 (2 + x - x^2) dx \\ &= \left[2x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_{-1}^2 \\ &= \left(4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} \right) - \left(-2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

Örnek 36.2. $x \geq 0$ ve $y \geq 0$ olmak üzere $y = \sqrt{x}$, $y = x - 2$ ve x -ekseni ile sınırlı alanı bulunuz.




Figure 36.3: The region between the curves $y = \sqrt{x}$, $y = x - 2$ and the x -axis for $x \geq 0$ and $y \geq 0$.

Şekil 36.3: $x \geq 0$ and $y \geq 0$ olduğunda $y = \sqrt{x}$, $y = x - 2$ ve x -ekseni ile sınırlı bölge.

çözüm: İlk olarak

$$\begin{aligned} \sqrt{x} &= x - 2 \\ x &= (x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4 \\ 0 &= x^2 - 5x + 4 = (x - 1)(x - 4) \implies x = 1 \text{ veya } 4. \end{aligned}$$

$\sqrt{1} \neq 1 - 2$ olduğundan, $x = 4$ buluruz. Bkz. şekil 36.3. Buradan

$$\begin{aligned} \text{area} &= \text{mavi alan} + \text{kırmızı alan} \\ &= \int_0^2 \sqrt{x} dx + \int_2^4 \left(\sqrt{x} - (x - 2) \right) dx \\ &= \int_0^2 x^{\frac{1}{2}} dx + \int_2^4 \left(x^{\frac{1}{2}} - x + 2 \right) dx \\ &= \left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 + \left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}x^2 + 2x \right]_2^4 \\ &= \left(\frac{2}{3}(2)^{\frac{3}{2}} - 0 \right) + \left(\frac{2}{3}(4)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}(16) + 2(4) \right) \\ &\quad - \left(\frac{2}{3}(2)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}(4) + 2(2) \right) \\ &= \frac{4\sqrt{2}}{3} + \frac{16}{3} - 8 + 8 - \frac{4\sqrt{2}}{3} + 2 - 4 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

elde edilir.

Problems

Problem 36.1 (Total Area). Calculate the total area between the curve $y = 2x^2$ and the curve $y = x^4 - 2x^2$ for $-2 \leq x \leq 2$.

Problem 36.2 (Total Area). Find the total areas of the regions shown in the following figures:

- (a). Figure 36.5. (b). Figure 36.6. (c). Figure 36.7.




Figure 36.4: The total area between the curve $y = 2x^2$ and the curve $y = x^4 - 2x^2$, for $-2 \leq x \leq 2$.

Şekil 36.4: $-2 \leq x \leq 2$ olduğunda $y = 2x^2$ ve $y = x^4 - 2x^2$ arasındaki alan.




Figure 36.5: The total area between the curve $y = \frac{\pi}{2}(\cos x) \sin(\pi + \pi \sin x)$ and x -axis, for $-\pi \leq x \leq 0$.

Şekil 36.5:

Sorular

Soru 36.1 (Toplam Alan). $y = 2x^2$ eğrisiyle $y = x^4 - 2x^2$ eğrisi arasındaki alanı $-2 \leq x \leq 2$ ise bulunuz.

Soru 36.2 (Toplam Alan). Find the total areas of the regions shown in the following figures:

- (a). Şekil 36.5. (b). Şekil 36.6. (c). Şekil 36.7.




Figure 36.6: The region bounded by $y = 1 + \sqrt{x}$, $y = 3 - x$ and $y = \frac{x^2}{4}$ in the first quadrant.

Şekil 36.6:




Figure 36.7: The total area between the curve $y = x^2 - 4$ and the curve $y = -x^2 - 2x$, for $-3 \leq x \leq 1$.

Şekil 36.7: $-3 \leq x \leq 1$ olduğunda $y = x^2 - 4$ ve $y = -x^2 - 2x$ arasındaki alan.

Solutions to Selected Problems

2.1.

(a).

P	Q	R	$P \vee Q$	$(P \vee Q) \vee R$	$Q \vee R$	$P \vee (Q \vee R)$
T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	T	T	T
T	F	T	T	T	T	T
T	F	F	T	T	F	T
F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	T	T	T
F	F	T	F	T	T	T
F	F	F	F	F	F	F

(c).

P	Q	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \wedge \neg Q$
T	T	T	F	F	F	F
T	F	T	F	F	T	F
F	T	T	F	T	F	F
F	F	F	T	T	T	T


(d).

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \vee \neg Q$
T	T	T	F	F	F	F
T	F	F	T	F	T	T
F	T	F	T	T	F	T
F	F	F	T	T	T	T

(g).

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$	true
T	F	T	T
F	T	T	T

5.1.



5.2. We calculate that

$$\|AB\| = \sqrt{(4-1)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10} \approx 3.16$$

$$\|BC\| = \sqrt{(3-4)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2} \approx 1.41$$


$$\|CA\| = \sqrt{(1-3)^2 + (1-3)^2} = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} \approx 2.83.$$

Hence $\|AB\|$ is the largest number.


6.1.

- (a). $f(x) = 3$ is even. (g). $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ is even.
- (b). $f(x) = x^{77}$ is odd. (h). $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ is even.
- (c). $f(x) = x^2 + 1$ is even. (i). $f(x) = \frac{1}{x-1}$ is neither even nor odd.
- (d). $f(x) = x^3 + x$ is odd. (j). $f(x) = \sin x$ is odd.
- (e). $f(x) = x^3 + x^2$ is neither even nor odd. (k). $f(x) = 2x + 1$ is neither even nor odd.
- (f). $f(x) = x^3 + 1$ is neither even nor odd. (l). $f(x) = \cos x$ is even.

6.2.



6.3.



6.4.

- (a). $-\frac{\pi}{2}$ (e). $\frac{\pi}{5}$ (i). 30°
- (b). $\frac{3\pi}{4}$ (f). $\frac{\pi}{9}$ (j). 150°
- (c). $\frac{2\pi}{3}$ (g). 270° (k). -36°
- (d). π (h). 18° (l). $540^\circ = 180^\circ$

6.5.

- (a). $\mathbb{R}$ (d). $(-\infty, 0] \cup [3, \infty)$
- (b). $[0, \infty)$ (e). $(-\infty, 3) \cup (3, \infty)$
- (c). $[-2, \infty)$ (f). $(-\infty, -4) \cup (-4, 4) \cup (4, \infty)$





8.1.

- (a). $(3, 0)$ (d). $(1, \sqrt{3})$ (g). $(-1, \sqrt{3})$
- (b). $(-3, 0)$ (e). $(1, \sqrt{3})$ (h). $(-1, 0)$
- (c). $(-1, \sqrt{3})$ (f). $(-3, 0)$ (i). $(2, 2)$.

8.2.

- (a). $(\sqrt{2}, 45^\circ)$ (d). $(5, \pi - \tan^{-1} \frac{4}{3}) \approx (5, 126.87^\circ)$
- (b). $(3, 180^\circ)$ (e). $(2\sqrt{2}, -135^\circ)$
- (c). $(2, -30^\circ)$ (f). $(2, 150^\circ)$.

8.3.



9.1.

- (a). viii (b). iii (c). i (d). ii (e). vi (f). iv

9.2.

- (a). (3, 0) (b). (0, -2) (c). (0, $\frac{1}{16}$)

9.3.

- (a). $(\pm 3, 0)$ (b). $(\pm 3, 0)$ (c). $(0, \pm 1)$ (d). $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$

9.4.

- (a). $(\pm\sqrt{2}, 0)$ (c). $(\pm\sqrt{10}, 0)$
 (b). $(0, \pm 4)$ (d). $64x^2 - 36y^2 = 2304$

10.1. (a). The distance is

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \\ &= \sqrt{(2 - (-1))^2 + (5 - 1)^2 + (0 - 5)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2} \\ &= \sqrt{9 + 16 + 25} = \sqrt{50} \end{aligned}$$

- (b). $\sqrt{2}$ (c). 50 (d). $\sqrt{101}$ (e). 6

10.2. First we rearrange the equation into standard form

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 8z &= 0 \\ x^2 + (y^2 - 6y + 9) - 9 + (z^2 + 8z + 16) - 16 &= 0 \\ x^2 + (y - 3)^2 - 9 + (z + 4)^2 - 16 &= 0 \\ x^2 + (y - 3)^2 + (z + 4)^2 &= 25 \\ (x - 0)^2 + (y - 3)^2 + (z + 4)^2 &= 5^2. \end{aligned}$$

Then it is easy to see that the centre of the sphere is (0, 3, -4) and the radius is 5.

10.3. Centre = $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, -\sqrt{2})$. Radius = $\sqrt{2}$.

11.1.

- (a). $3\sqrt{13}$ (e). $3\sqrt{13}$ (i). $\sqrt{10}$ (m). $(\frac{1}{5}, \frac{14}{5})$
 (b). $\sqrt{29}$ (f). $(-9, 6)$ (j). $\sqrt{13} + \sqrt{29}$ (n). $\frac{\sqrt{197}}{5}$
 (c). $3\sqrt{13}$ (g). $3\sqrt{13}$ (k). $(12, -19)$
 (d). $(9, -6)$ (h). $(1, 3)$ (l). $\sqrt{505}$

11.2.

(a). We have that

$$\begin{aligned} 5\mathbf{a} - 3\mathbf{b} &= 5(\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) - 3(2\mathbf{i} + 5\mathbf{k}) = 5\mathbf{i} + 10\mathbf{j} + 15\mathbf{k} - 6\mathbf{i} - 15\mathbf{k} \\ &= -\mathbf{i} + 10\mathbf{j}. \end{aligned}$$

(b). (0, 0, 0)

11.3.

(a). We require the vector

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{6\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}}{\sqrt{6^2 + 2^2 + (-3)^2}} = \frac{6\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}}{\sqrt{49}} = \frac{6}{7}\mathbf{i} + \frac{2}{7}\mathbf{j} - \frac{3}{7}\mathbf{k}.$$

(b). $\mathbf{u} = \frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}$

(c). $\mathbf{w} = \frac{84}{13}\mathbf{i} - \frac{35}{13}\mathbf{k}$

12.1.

(a). (i) -25 (ii) 5 and 5 (iii) -1 (iv) $-2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - \sqrt{5}\mathbf{k}$

(b). (i) 25 (ii) 5 and 15 (iii) $\frac{1}{3}$ (iv) $\frac{10}{9}\mathbf{i} + \frac{11}{9}\mathbf{j} - \frac{2}{9}\mathbf{k}$

(c). (i) 13 (ii) 3 and 15 (iii) $\frac{1}{15}$ (iv) $\frac{26}{225}\mathbf{i} + \frac{26}{45}\mathbf{j} - \frac{143}{225}\mathbf{k}$

12.2. $\angle BAC = \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 63.435^\circ$, $\angle ABC = \cos^{-1} \frac{3}{5} \approx 53.130^\circ$ and $\angle BCA = \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 63.435^\circ$.

12.3. Yes.

12.4.

(a). If $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\|$, then we have that $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|^2 + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v}$ as required.

(b). Since $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \cos \theta$ and $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \|\mathbf{v}\| \cos \phi = \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \|\mathbf{u}\| \cos \phi$, we can see from part (a) that $\cos \theta = \cos \phi$. Therefore $\theta = \phi$.

12.5. Suppose that the x -axis points to the east, that the y -axis points to the north and that the z -axis points upwards. The vector $\mathbf{u} = (0, -5, -1)$ is parallel to the northwards part of the pipe (pointing to the south). The vector $\mathbf{v} = (10, 0, 1)$ is parallel to the eastwards part of the pipe. Thus

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{-1}{\sqrt{26}\sqrt{101}} \right) = 91.12^\circ.$$

The question could be interpreted in different ways, so I would accept both 91.12° and $180^\circ - 91.12^\circ = 88.88^\circ$ as correct answers.

13.1.

- (a). $2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ (d). $6\mathbf{i} - 12\mathbf{k}$ (g). $\mathbf{0}$
 (b). $\mathbf{0}$ (e). $\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$ (h). $-\mathbf{j} - \mathbf{k}$
 (c). $-6\mathbf{k}$ (f). $-2\mathbf{k}$ (i). $4\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

13.2.

- (a). $\frac{3}{\sqrt{2}}$
 (b). $(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}})$

13.3.

- (a). no (b). yes (c). no (d). yes (e). no

13.4. $9\sqrt{3}$ and $\frac{21}{\sqrt{2}}$

13.5. -7

14.1. $x = 3 + t$, $y = -4 + t$, $z = -1 - t$.

14.2. $x = 1 - 2t$, $y = 2 - 2t$, $z = -1 + 2t$.

14.3. $x = 2 - 2t$, $y = 3 + 4t$, $z = -2t$.

14.4. $d = 7\sqrt{3}$

14.5. $d = 0$ (the point is on the line)

14.6. (a). Yes, at the point $P(9, 10, 7)$ ($t = 2 = s$). (b). $d = 0$.

14.7. Immediately we can see that we have $P_1(10, -3, 0)$, $\mathbf{v}_1 = 4\mathbf{i} + 4\mathbf{k}$, $P_2(10, 0, 2)$ and $\mathbf{v}_2 = -4\mathbf{i} - 4\mathbf{k}$. Since $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$, the lines are parallel. We calculate that

$$\begin{aligned}\overrightarrow{P_1P_2} &= P_2 - P_1 = (10, 0, 2) - (10, -3, 0) = (0, 3, 2) \\ \overrightarrow{P_1P_2} \times \mathbf{v}_1 &= (0, 3, 2) \times (4, 0, 4) = (12, 8, -12) \\ d &= \frac{\|\overrightarrow{P_1P_2} \times \mathbf{v}_1\|}{\|\mathbf{v}_1\|} = \frac{\|(12, 8, -12)\|}{\|(4, 0, 4)\|} = \frac{4\sqrt{22}}{4\sqrt{2}} = \sqrt{11}\end{aligned}$$

14.8. First we have $P_1(10, 0, 0)$, $\mathbf{v}_1 = 4\mathbf{i} - \mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, $P_2(10, 1, 2)$ and $\mathbf{v}_2 = -4\mathbf{i} - 4\mathbf{k}$. Note that the lines are skew because $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = 4\mathbf{i} - 4\mathbf{k} \neq \mathbf{0}$. Thus

$$\begin{aligned}\overrightarrow{P_1P_2} &= P_2 - P_1 = (10, 1, 2) - (10, 0, 0) = (0, 1, 2) \\ \overrightarrow{P_1P_2} \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2) &= (0, 1, 2) \cdot (4, 0, -4) = -8 \\ d &= \frac{|\overrightarrow{P_1P_2} \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)|}{\|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\|} = \frac{|-8|}{4\sqrt{2}} = \frac{8}{4\sqrt{2}} = \sqrt{2}.\end{aligned}$$

15.1. $x + 3y - z = 9$

15.2. $x - 2y + z = 6$

15.3. (a). $P(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$

(b). $P(2, -\frac{20}{7}, \frac{27}{7})$

15.4. (a). $x = 1 - t$, $y = 1 + t$, $z = -1$

(b). $x = 1 + 14t$, $y = 2t$, $z = 15t$

15.5. (a). 3

(b). $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

15.6. Let $\mathbf{n}_1 = \mathbf{i} + \mathbf{j}$ and $\mathbf{n}_2 = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$. Then we have

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{\|\mathbf{n}_1\| \|\mathbf{n}_2\|} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{2+1}{\sqrt{2}\sqrt{9}} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 45^\circ$$

16.1. (a). $-2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$ (b). $\frac{39}{25}\mathbf{i} + \frac{52}{25}\mathbf{j} + \frac{13}{5}\mathbf{k}$ (c). $\frac{2}{3}\mathbf{i} - \frac{2}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}$

16.2. (a). $-2\mathbf{i} + 7\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ (b). $-\frac{8}{7}\mathbf{i} + \frac{4}{7}\mathbf{j} + \frac{10}{7}\mathbf{k}$ (c). $\mathbf{i}$

16.3. (a). $(8, 1, 1)$ (b). $(\frac{213}{20}, \frac{401}{40}, \frac{57}{8})$ (c). $(2, 0, 3)$

16.4. (a). $x = 1 - t$, $y = -1 + t$, $z = 1 + 4t$

(b). $x = 8 - 6t$, $y = 3 - 2t$, $z = -2 + \frac{14}{5}t$.

(c). $B(7, 7, \frac{5}{4})$

17.1. 12

17.2.

(a). $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ (b). $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$ (c). $5 \cdot 4 \cdot 4 = 80$

17.3. There are $81 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 81000$ different postcodes.

If we insist that no digits are repeated, then the first two digits can not be 11 (Bilecik), 22 (Edirne), 33 (Mersin), 44 (Malatya), 55 (Samsun), 66 (Yozgat) or 77 (Yalova). That leaves $81 - 7 = 74$ choices for the first two digits. There are then 8 choices for the 3rd digit, 7 choices for the 4th digit and 6 choices for the final digit. Hence there are $74 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 24864$ possible postcodes.

18.1. ${}_5C_3 = 10$

18.3.

(a). ${}_{24}C_3 = 2024$ (b). ${}_{19}C_3 = 969$

18.4.

(a). $\left(\frac{{}_8P_8}{{}_2P_2 \cdot {}_2P_2 \cdot {}_2P_2} \right) \left(\frac{{}_5P_5}{{}_2P_2} \right) = 302400$

(b). $\left(\frac{{}_6P_6}{{}_2P_2} \right) ({}_3P_3) = 2160$

18.5. Note that a number is divisible by 5 if the its last digit is 0 or 5. Since we don't have a 0, we must find the number of 3 digit numbers which end in a 5 and such that none of the digits are repeated. The answer is ${}_5P_2 = 20$.

18.6. ${}_8P_2 \cdot {}_{10}P_3 = 40320$.

19.1. The sample space is $S = \{HHH, HTH, THH, TTH\}$ since the third coin is always H .

(a). $\frac{1}{4}$ (b). $\frac{1}{2}$ (c). $\frac{1}{4}$ (d). 0 (e). $\frac{3}{4}$ (f). $\frac{1}{4}$

19.2.

(a). $\frac{{}_{26}C_5}{{}_{52}C_5} \approx 0.0253$ (d). $\frac{{}_{39}C_{13}}{{}_{52}C_{13}} \approx 0.0128$

(c). $\frac{{}_{48}C_4}{{}_{52}C_4} \approx 0.7187$ (f). $\frac{{}_{16}C_{13}}{{}_{52}C_{13}} \approx 8.8187 \times 10^{-10}$

20.1.

(a). $\frac{13}{20}$ (c). $\frac{7}{10}$ (d). $\frac{1}{4}$ (f). $\frac{3}{5}$.

20.2.

(a). $\frac{7}{17}$ (b). $\frac{1}{3}$ (c). $\frac{63}{65}$ (d). $\frac{5}{6}$ (e). $\frac{91}{95}$

21.1.

(a). $\frac{4}{51}$ (b). $\frac{1}{17}$ (c). 40%

21.2.

(a). $\frac{1}{3}$ (c). 0, 49 (d). $\frac{3}{4}$



22.1.


(a). $\frac{54}{125}$ (b). $\frac{71}{125}$ (c). $\frac{14}{25}$ (d). $\frac{17}{25}$ (e). $\frac{21}{25}$

22.2.

(a). $\frac{1}{6}$. (b). $\frac{1}{4}$. (c). $\frac{1}{4}$.



23.1. One way to draw each graph is shown below, but of course there are ∞ different ways to draw them.





(c).

23.3. Both G and H are planar graphs as shown below.



23.4.

(a). yes (b). no (c). no (d). yes

23.5. One such example is



This graph has 2 vertices, 0 edges and 1 face. So $n(V) - n(E) + n(F) = 3$. This example does not disprove theorem 23.3 because it is not connected.

24.1.

(a). false (c). false (e). true (g). false
(b). false (d). true (f). true (h). true

24.2.

(a). -9 (c). $-\frac{5}{2}$ (d). $\frac{2}{3}$ (e). $\frac{1}{10}$ (f). -1 (h). $\frac{1}{5}$
(b). $\frac{5}{8}$ (g). $\frac{3}{2}$

(i). $\lim_{v \rightarrow 2} \frac{v^3 - 8}{v^4 - 16} = \lim_{v \rightarrow 2} \frac{(v-2)(v^2 + 2v + 4)}{(v-2)(v+2)(v^2 + 4)} = \lim_{v \rightarrow 2} \frac{v^2 + 2v + 4}{(v+2)(v^2 + 4)} = \frac{12}{32} = \frac{3}{8}$

24.3. Clearly $\lim_{x \rightarrow 0} 2 - x^2 = 2 - 0^2 = 2$ and $\lim_{x \rightarrow 0} 2 \cos x = 2 \cos 0 = 2$. It follows by the Sandwich Theorem that $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 2$ also.

24.4.

(a). $\lim_{x \rightarrow 4} (g(x)^2) = 9$ (c). $\lim_{x \rightarrow 4} xf(x) = 0$
(b). $\lim_{x \rightarrow 4} (g(x) + 3) = 0$ (d). $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{g(x)}{f(x) - 1} = 3$

25.1. First note that f is clearly continuous for all $x \neq -2$. Since $f(-2) = 4b$, we require that $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 4b$ also. But $\lim_{x \rightarrow -2} x = -2$. So we must have $b = -\frac{1}{2}$.

25.2.

(a). Since $x^2 - 4 \neq 0$ if $x \neq \pm 2$, it follows that the rational function $\frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$ is continuous on $(-\infty, -2)$, on $(-2, 2)$ and on $(2, \infty)$. Hence $f(x)$ is also continuous on these open intervals.

(b). Since

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}{(x-2)(x+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x + 4}{x+2} = \frac{12}{4} = 3 = f(2), \end{aligned}$$

it follows that f is continuous at $x = 2$.

(c). Since $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$ does not exist, it follows that f is discontinuous at $x = -2$.

25.3. Since $\tan$, $\cos$ and $\sin$ are continuous functions, we use theorem 25.3 to calculate that

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \tan \left(\frac{\pi}{4} \cos \left(\sin t^{\frac{1}{3}} \right) \right) &= \tan \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\pi}{4} \cos \left(\sin t^{\frac{1}{3}} \right) \right) \\ &= \tan \left(\frac{\pi}{4} \lim_{t \rightarrow 0} \cos \left(\sin t^{\frac{1}{3}} \right) \right) \\ &= \tan \left(\frac{\pi}{4} \cos \left(\lim_{t \rightarrow 0} \sin t^{\frac{1}{3}} \right) \right) \\ &= \tan \left(\frac{\pi}{4} \cos \left(\sin \lim_{t \rightarrow 0} t^{\frac{1}{3}} \right) \right) \\ &= \tan \left(\frac{\pi}{4} \cos \left(\sin 0 \right) \right) \\ &= \tan \left(\frac{\pi}{4} \cos 0 \right) = \tan \frac{\pi}{4} = 1. \end{aligned}$$

26.1.

(a). $\frac{2}{5}$ (e). -1 (i). ∞
(b). 0 (f). 1 (j). 0
(c). $-\infty$ (g). ∞ (k). ∞
(d). $-\frac{2}{3}$ (h). 2 (l). this limit does not exist

28.1.

(a). $\frac{ds}{dt} = 2t^{-2} - 8t^{-3} = \frac{2}{t^2} - \frac{8}{t^3}$.

(b). We calculate that

$$\begin{aligned} w' &= \frac{d}{dz} (z+1)(z-1)(z^2+1) = \frac{d}{dz} (z^2-1)(z^2+1) \\ &= \frac{d}{dz} (z^4-1) = 4z^3 \end{aligned}$$

and

$$w'' = \frac{d}{dz} 4z^3 = 12z^2.$$

(c). We calculate that

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= (2x+3)'(x^4 + \frac{1}{3}x^3 + 11) + (2x+3)(x^4 + \frac{1}{3}x^3 + 11)' \\ &= 2(x^4 + \frac{1}{3}x^3 + 11) + (2x+3)(4x^3 + x^2) \\ &= 2x^4 + \frac{2}{3}x^3 + 22 + 8x^4 + 2x^3 + 12x^3 + 3x^2 \\ &= 10x^4 + \frac{44}{3}x^3 + 3x^2 + 22 \end{aligned}$$

by the product rule.

28.2. First note that

$$b = \frac{x^2 - 1}{x^2 + x - 2} = \frac{(x-1)(x+1)}{(x+2)(x-1)} = \frac{x+1}{x+2}.$$

Using the quotient rule, we calculate that

$$\begin{aligned} \frac{db}{dx} &= \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{(x+1)'(x+2) - (x+1)(x+2)'}{(x+2)^2} \\ &= \frac{(x+2) - (x+1)}{(x+2)^2} = \frac{1}{(x+2)^2}. \end{aligned}$$

28.3.

- (a). $y' = 2x^3 - 3x - 1$ (g). $f'(s) = \frac{1}{\sqrt{s}(\sqrt{s}+1)^2}$
 (b). $y' = 3x^2 + 4x - 8$ (h). $v' = -\frac{1}{x^2} + 2x^{-\frac{3}{2}}$
 (c). $r' = -\frac{2}{3s^3} + \frac{5}{2s^2}$ (i). $r' = 3\theta^{-4}$
 (d). $y = \frac{-19}{(3x-2)^2}$ (j). $w' = -z^{-2} - 1$
 (e). $g'(x) = \frac{x^2+x+4}{(x+0.5)^2}$ (k). $s' = 15t^2 - 15t^4$
 (f). $v' = \frac{t^2-2t-1}{(1+t^2)^2}$ (l). $w' = -\frac{6}{z^3} + \frac{1}{z^2}$

29.1.

- (a). $\frac{ds}{dx} = \sec^2 x$. (b). $\frac{dr}{d\theta} = \theta \cos \theta$.

29.2.

(b). By the quotient rule, we have that

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\cot x) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right) \\ &= \frac{(\cos x)' \sin x - (\cos x)(\sin x)'}{\sin^2 x} \\ &= \frac{-\sin x \sin x - \cos x \cos x}{\sin^2 x} \\ &= \frac{-1}{\sin^2 x} = -\operatorname{cosec}^2 x \end{aligned}$$

as required.

29.3.

- (a). $y' = -10 - 3 \sin x$ (f). $w' = \frac{-\operatorname{cosec}^2 z}{(1+\cot z)^2}$
 (b). $y' = 2x \cos x - x^2 \sin x$ (g). $h'(x) = \frac{3x^2 \sin x \cos x}{x^3 \cos^2 x - x^3 \sin^2 x} +$
 (c). $y' = -\operatorname{cosec} x \cot x - \frac{2}{\sqrt{x}}$ (h). $p' = \sec^2 t$
 (d). $f'(x) = \sin x \sec^2 x + \sin x$ (i). $r' = \sec^2 t$
 (e). $g'(x) = \cos x$ (j). 0

30.1. $\frac{ds}{dt} = -5 \left(\frac{t}{2} - 1 \right)^{-11}.$

30.2. $\frac{dy}{dt} = -\frac{5}{3} \sin \left(5 \sin \left(\frac{t}{3} \right) \right) \cos \left(\frac{t}{3} \right).$

30.3. $\frac{dy}{dx} = \frac{3x-2}{\sqrt{3x^2-4x+6}}.$

30.4. $\frac{dy}{dx} = 3 \sin^2 x \cos x.$

30.5. $\frac{dy}{dx} = \tan(\tan x) \sec^2 x \sec(\tan x).$

30.6. $\frac{dy}{dx} = 2x \cos(2x) \cos(x^2) - 2 \sin(2x) \sin(x^2).$

30.7. Let $u = \frac{t}{t^2-4}$. Then

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{t^2}{t^3-4t} \right)^3 = \frac{d}{dx} \left(\frac{t}{t^2-4} \right)^3 \\ &= \frac{d}{dx} u^3 = \left(\frac{d}{du} u^3 \right) \frac{du}{dx} = 3u^2 \frac{d}{dx} \left(\frac{t}{t^2-4} \right) \\ &= \left(\frac{3t^2}{(t^2-4)^2} \right) \left(\frac{(t)'(t^2-4) - (t)(t^2-4)'}{(t^2-4)^2} \right) \\ &= \left(\frac{3t^2}{(t^2-4)^2} \right) \left(\frac{(t^2-4) - (t)(2t)}{(t^2-4)^2} \right) \\ &= -\frac{3t^2(t^2+4)}{(t^2-4)^4}. \end{aligned}$$

30.8. $y'' = \frac{6}{x^3} \left(1 + \frac{1}{x} \right) \left(1 + \frac{2}{x} \right).$

30.9. $\frac{5}{2}.$

30.10. 0.

31.1. (a) $F(x) = 100x^2.$

(b) $G(x) = \frac{x^4}{4} + \frac{1}{2x^2}.$

(c) $H(x) = -\frac{1}{\pi} \cos(\pi x) + \cos(3x).$

(d) $L(x) = \frac{x^8}{8} - 3x^2 + 8x.$

(e) $M(x) = x^{\frac{2}{3}}$ is an antiderivative of $m(x) = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$ because

$$M'(x) = \frac{d}{dx} x^{\frac{2}{3}} = \frac{2}{3} x^{\frac{2}{3}-1} = \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} = m(x).$$

(f) $P(x) = x^{\frac{1}{3}}.$

(g) $R(x) = 2 \tan \frac{\pi}{3}.$

(h) $S(x) = -\frac{2}{3} \tan \frac{3\pi}{2}.$

31.2. It is incorrect because $\frac{d}{dx} \left(\frac{(2x+1)^3}{3} + \sin x \right) \neq (2x+1)^2 + \cos x.$

31.3. It is correct. By the Chain Rule (with $u = e^x$),

$$\frac{d}{dx} \sin e^x = \left(\frac{d}{du} \sin u \right) \left(\frac{d}{dx} e^x \right) = (\cos u)(e^x) = e^x \cos e^x.$$

Thus $\sin e^x$ is an antiderivative of $e^x \cos e^x$.

31.4. It is incorrect because the “+C” is missing.

31.5.

(a). $\int 2x \, dx = x^2 + C$

(b). $\int (1 - x^2 - 3x^5) \, dx = x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^6}{2} + C$

(c). $\int \frac{4+\sqrt{t}}{t^3} \, dt = \int 4t^{-3} + t^{-\frac{5}{2}} \, dt = -2t^{-2} - \frac{2}{3}t^{-\frac{3}{2}} + C$

(d). $\int (2 \cos 2\theta - 3 \sin 3\theta) \, d\theta = \sin 2\theta + \cos 3\theta + C$

(e). $\int 2e^{3x} \, dx = \frac{2}{3}e^{3x} + C$

(f). $\int \frac{1}{x} \, dx = \ln |x| + C$

34.1. (a). $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^2}.$

(b). $\frac{db}{dt} = 4t^5.$

(c). We calculate that

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dx} &= \frac{d}{dx} \int_2^{x^2} \sin(t^3) \, dt = \left(\frac{d}{du} \int_2^u \sin(t^3) \, dt \right) \left(\frac{d}{dx} x^2 \right) \\ &= \sin(u^3) 2x = 2x \sin(x^6). \end{aligned}$$

(d). $\frac{dz}{dx} = -\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} \sin x = -\frac{\sin x}{2\sqrt{x}}.$

Index

açık aralık, 12
aksiyom, 5
akustik çanak, 44
alan
 eğriler arasındaki, 196
 paralelkenarın, 61
 üçgenin, 61
ancak ve ancak, $\implies$, 6
and, $\wedge$, 5, 6
angle
 between planes, 76
 between vectors, 56
anticlockwise, 33
antiderivative, 170
aralık, 12
area
 between curves, 196
 of a parallelogram, 61
 of a triangle, 61
artan fonksiyon, 21
azalan fonksiyon, 21

basit olay, 102
bağlantılı, 130
belirli integrali, 179
belirsiz integrali, 171
beşinci türevi, 161
bipartite graph, 126
birim fonksiyon, 140
birleşimi, 12
birleşik olay, 102
bölüm kuralı
 limitler için, 142
 türev için, 159

cartesian coordinates, 14
chain rule, 166
circle, 37
clockwise, 33
closed interval, 12
combination, 96
complete graph, 125
component form, 52
compound event, 102
connected, 130
constant multiple rule
 for antiderivatives, 171
 for derivatives, 157
 for limits, 142
continuous function, 146, 148
contrapositive, 6, 7
converse, 6, 7
coordinates
 cartesian, 14
 polar, 33
cos, 25
cosec, 25
cosecant, 25
 derivative, 163
cosine, 25
 derivative, 162
cosinüs, 25
cot, 25
cotangent, 25
 derivative, 163
cross product, 60
csc, 25
cycle graph, 126
çember, 37
çarpım kuralı
 limitler için, 142
 türev için, 159

çift fonksiyonel, 21

değer kümesi, 17
decreasing function, 21
definite integral, 179
değil, $\neg$, 6
derivative, 153, 154
devrik, 6, 7
difference rule
 for limits, 142
differentiable, 153
digraph, 124
directed graph, 124
directed multigraph, 125
directrix, 38
discontinuous function, 146
distance
 between two lines, 70
 from a point to a line, 69
 from a point to a plane, 75
 in $\mathbb{R}^2$, 15
 in $\mathbb{R}^3$, 49
doğal sayılar, 9
doğru parçasıdır, 68
doğru, 67
domain, 17
dot product, 56
dördüncü türevi, 161
dummy variable, 180
düşey doğru testi, 20

edge, 122
eğim, 151
elips, 37
elipse, 37, 40
Euler yolu, 130
Euler's formula, 132
Eulerian trail, 130
even function, 21
event, 102
exponential function, 24

factorial, 92
faktöriyel, 92
fark kuralı
 limitler için, 142
fifth derivative, 161
foci, 40
focus, 38
fonksiyon, 17
 artan, 21
 azalan, 21
 birim, 140
 çift, 21
 kuvvet, 23
 lineer, 22
 logaritmik, 24
 ortalama değeri, 189
 parçalı tanımlı, 20
 rasyonel, 23
 sabit, 140
 sürekli, 146, 148
 tek, 21
 trigonometrik, 25
 üstel, 24
for all, $\forall$, 7, 8
fourth derivative, 161
 f' , 153
 f'' , 160
 f''' , 161
 $f^{(n)}$, 161
function, 17

average value, 189
continuous, 146, 148
decreasing, 21
discontinuous, 146
even, 21
exponential, 24
identity, 140
increasing, 21
linear, 22
logarithmic, 24
odd, 21
piecewise-defined, 20
power, 23
rational, 23
trigonometric, 25
fundamental theorem of calculus, 184

görüntü kümesi, 17
graf, 19
graph, 19, 122

hacmi
 paralelyüzlünün, 65
half-open interval, 12
her, $\forall$, 7, 8
hiperbol, 37
hyperbola, 37, 42

identity function, 140
if and only if, iff, $\iff$, 6
ikinci türevi, 160
implies, $\implies$, 6
increasing function, 21
indefinite integral, 171
initial point, 51
integer, 9
integrable, 180
integrallenebilir, 180
intersection
 points of, 70
interval, 12
ise, $\implies$, 6
isolated vertex, 123

kalkülüsün temel teoremi, 184
kapalı aralık, 12
kartezyan koordinatlar, 14
kesişim
 noktaları, 70
kesişim noktaları, 70
kombinasyon, 96
koordinatlar
 kartesyen, 14
 kutupsal, 33
kosekant, 25
 türev, 163
kosinüs
 türev, 162
kotanjant, 25
 türev, 163
kutupsal koordinatlar, 33
kuvvet fonksiyon, 23
kuvvet kuralı
 limitler için, 142
kök kuralı
 limitler için, 142
Königsberg bridge problem, 121

limit, 139
limit kuralları, 142
limit laws, 142
line, 67

line segment, 68
 linear function, 22
 lineer fonksiyon, 22
 lines of intersection, 74
 logarithmic function, 24
 logaritmik fonksiyon, 24

 Monty Hall Problem, 113
 multidigraph, 125
 multigraph, 123

 $\mathbb{N}$, 9
 n inci türevi, 161
 natural number, 9
 neighbour, 123
 node, 122
 norm, 52
 $\|\cdot\|$, 15
 normal vector, 73
 not, $\neg$, 6
 not, $\sim$, 6
 nth derivative, 161
 number
 even, 21
 integer, 9
 natural, 9
 odd, 21
 rational, 10
 real, 10

 odd function, 21
 olay, 102
 open interval, 12
 or, $\vee$, 5
 origin, 14, 48
 orijin, 14, 48
 orthogonal, 57
 outdegree, 125

 parabol, 37
 parabola, 37, 38
 parametric equations, 68
 parametrik denklemleri, 67
 parçalı tanımlı fonksiyon, 20
 pendant, 123
 permutation, 95
 piecewise-defined function, 20
 planar graph, 125
 plane, 73
 point of discontinuity, 146
 points of intersection, 70
 polar coordinates, 33
 polinom, 23
 polynomial, 23
 power function, 23
 power rule
 for limits, 142
 probability tree, 117
 product rule
 for derivatives, 159
 for limits, 142
 projection
 of a vector onto a line, 78
 of a line onto a plane, 81
 of a point onto a plane, 80

 of a vector onto a plane, 79
 of a vector onto a vector, 58
 proposition, 5
 pseudograph, 123

 $\mathbb{Q}$, 10
 quotient rule
 for derivatives, 159
 for limits, 142

 $\mathbb{R}$, 10
 $\mathbb{R}^2$, 14
 radian, 25, 168
 radyan, 25, 168
 range, 17
 rasyonel fonksiyon, 23
 rasyonel sayılar, 10
 rational function, 23
 rational number, 10
 real number, 10
 reel sayılar, 10
 riemann sum, 177, 178
 riemann toplamı, 178
 root rule
 for limits, 142

 sabit fonksiyon, 140
 sabitle çarpım kuralı
 limitler için, 142
 ters türevi için, 171
 türev için, 157
 sample space, 102
 sandwich theorem, 144
 sandöviç teoremi, 144
 sayılar
 doğal, 9
 rasyonel, 10
 reel, 10
 tam, 9
 sec, 25
 secant, 25
 derivative, 163
 second derivative, 160
 sekant, 25
 türev, 163
 simple event, 102
 simple graph, 123
 sin, 25
 sine, 25
 derivative, 162
 sinüs, 25
 türev, 162
 slope, 151
 sphere, 50
 substitution method
 for definite integrals, 194
 for indefinite integrals, 191
 sum rule
 for antiderivatives, 171
 for derivatives, 158
 for limits, 142
 sürekli fonksiyon, 146, 148
 süreksizdir, 146
 süreksizlik noktası, 146

takma değişken, 180
 tam sayılar, 9
 tan, 25
 tangent, 25
 derivative, 163
 tangent line, 151
 tanjant, 25
 türev, 163
 tanım kümesi, 17
 target, 17
 tek fonksiyon, 21
 teorem, 5
 terminal point, 51
 ters türevi, 170
 there exists, $\exists$, 8
 third derivative, 161
 three-dimensional graph, 125
 toplam alan, 186
 toplam kuralı
 limitler için, 142
 ters türevi için, 171
 türev için, 158
 total area, 186
 trigonometric function, 25
 trigonometrik fonksiyon, 25
 triple scalar product, 65
 trivial graph, 133
 türevi, 153
 türevlenebilir, 153

 $\cup$, 12
 union, 12
 unit vector, 54
 uzaklık
 $\mathbb{R}^2$ 'de, 15
 üçüncü türevi, 161
 üstel fonksiyon, 24

 vardır, $\exists$, 8
 ve, $\wedge$, 5, 6
 vector
 normal, 73
 vector projection, 58
 vertex, 122
 vertical line test, 20
 veya, $\vee$, 5
 volume
 of a parallelepiped, 65

 walk, 130
 wheel graph, 126
 whispering dish, 44
 whispering gallery, 45

 yarı-acık aralık, 12
 yerine koyma yöntemi
 belirli integralde, 194
 belirsiz integralde, 191
 yol, 130

 $\mathbb{Z}$, 9
 zincir kuralı, 166
 zıt, 6, 7

 örnek uzay, 102