

Your Name / İsim Soyisim

Your Signature / İmza

Student ID # / Öğrenci Numarası

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Professor's Name / Öğretim Üyesi

- Kopya çeken veya kopya çekme girişiminde bulunan bir öğrenci sınavdan **0 (sıfır)** not almış sayılır.
- Hesap makinesi ve cep telefonunuzu kürsiye bırakınız.
- Bir sorudan tam puan alabilmek için, **işlemlerinizi açıklamak** zorundasınız. Bir cevapta "gidiş yolu" belirtilmemişse, sonucunuz doğru bile olsa, ya çok az puan verilecek ya da hiç puan verilmeyecek.
- Kapak sayfasını **MAVİ tükenmez kalem** ile doldurunuz.
- Sınav süresi **70 dakika**.

Soru	Puan	Puanınız
1	25	
2	25	
3	25	
4	25	
Toplam	100	

Yandaki tabloya hiçbir şey yazmayınız.

Elementer Laplace Dönüşümleri: $a, b \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{L}\{f(t)\}$ mevcut ve $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ olarak alalım.

- $\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}, s > 0$
- $\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}, s > a$
- $\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, s > 0$
- $\mathcal{L}\{t^n e^{at}\} = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$
- $\mathcal{L}\{e^{at} \sin bt\} = \frac{b}{(s-a)^2 + b^2}$
- $\mathcal{L}\{\cos at\} = \frac{s}{s^2 + a^2}, s > 0$
- $\mathcal{L}\{\sin at\} = \frac{a}{s^2 + a^2}, s > 0$
- $\mathcal{L}\{\cosh at\} = \frac{s}{s^2 - a^2}, s > |a|$
- $\mathcal{L}\{\sinh at\} = \frac{a}{s^2 - a^2}, s > |a|$
- $\mathcal{L}\{f(ct)\} = \frac{1}{c}F\left(\frac{s}{c}\right), c > 0$
- $\mathcal{L}\{u_c(t)f(t-c)\} = e^{-cs}\mathcal{L}\{f(t)\}$
- $\mathcal{L}\{u_c(t)\} = \frac{e^{-cs}}{s}, s > 0$
- $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$
- $\mathcal{L}\{e^{at} \cos bt\} = \frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}$

1. (a) **5 puan** $f(t) = 2 - t^3 + 4 \sin 5t - 2e^{4t}$ fonksiyonunun Laplace Dönüşümünü bulunuz.

Solution: $\mathcal{L}\{f(t)\} = \mathcal{L}\{2 - t^3 + 4 \sin 5t - 2e^{4t}\} = \frac{2}{s} - \frac{3!}{s^4} + 4 \frac{5}{s^2 + 25} - 2 \frac{1}{s-4}, s > 4$


(b) **20 puan** $f(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < 3, \\ -1, & 3 \leq t < 5 \\ 2, & 5 \leq t < 7 \\ 1, & 7 \leq t \end{cases}$ fonksiyonunu ele

alalım.

(5 puan) $f(t)$ fonksiyonun grafiğini çiziniz.

(5 puan) $f(t)$ fonksiyonunu, $u_c(t)$, birim basamak fonksiyonları cinsinden yazınız.

(10 puan) $f(t)$ fonksiyonunun Laplace Dönüşümünü bulunuz.



Solution:

$f(t)$ fonksiyonunu, $u_c(t)$ birim basamak fonksiyonu cinsinden ifade edelim.

$$f(t) = -u_3(t) + 3u_5(t) - u_7(t)$$

Buna göre $f(t)$ fonksiyonunun Laplace Dönüşümü

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \mathcal{L}\{-u_3(t) + 3u_5(t) - u_7(t)\} = -\frac{e^{-3s}}{s} + \frac{2e^{-5s}}{s} - \frac{e^{-7s}}{s}$$

olarak bulunur.

2. (a) 10 puan $F(s) = \frac{2s+3}{s^2-2s+2}$ fonksiyonunun ters Laplace Dönüşümünü bulunuz.

Solution:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2s+3}{s^2-2s+2} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ 2 \frac{s-1}{(s-1)^2+1} + 5 \frac{1}{(s-1)^2+1} \right\} = 2e^{-t} \cos t + 5e^{-t} \sin t$$

- (b) 15 puan $F(s) = \frac{s^2+1}{(s+1)(s+2)(s-3)}$ fonksiyonunun ters Laplace Dönüşümünü bulunuz.

Solution:

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s^2+1}{(s+1)(s+2)(s-3)} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s-3} \right\} \\ \Rightarrow s^2+1 &= A(s+2)(s-3) + B(s+1)(s-3) + C(s+1)(s+2) \Rightarrow A = -\frac{1}{2}, B = 1, C = \frac{1}{2} \\ \Rightarrow f(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ -\frac{1}{2} \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+2} + \frac{1}{2} \frac{1}{s-3} \right\} \\ f(t) &= -\frac{1}{2}e^{-t} + e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{3t} \end{aligned}$$

3. 25 puan $y'' + 2y' + y = 4e^{-t}$, $y(0) = 2$, $y'(0) = -1$ başlangıç değer problemini Laplace Dönüşümü kullanarak çözünüz.

Solution: Verilen diferansiyel denklemin Laplace Dönüşümünü hesaplayalım.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{y'' + 2y' + y\} &= \mathcal{L}\{4e^{-t}\} \\ [s^2\mathcal{L}\{y\} - sy(0) - y'(0)] + 2[s\mathcal{L}\{y\} - y(0)] + \mathcal{L}\{y\} &= \frac{4}{s+1} \\ (s^2 + 2s + 1)\mathcal{L}\{y\} - 2s + 1 - 4 &= \frac{4}{s+1} \\ (s+1)^2\mathcal{L}\{y\} &= \frac{4}{s+1} + 2s + 3 \\ \mathcal{L}\{y\} &= \frac{2s^2 + 5s + 7}{(s+1)^3} \\ y(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s^2 + 5s + 7}{(s+1)^3}\right\}\end{aligned}$$

Let us write

$$\begin{aligned}\frac{2s^2 + 5s + 7}{(s+1)^3} &= \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{C}{(s+1)^3} \\ \Rightarrow 2s^2 + 5s + 7 &= A(s+1)^2 + B(s+1) + Cs = -1 \Rightarrow 4 = C \\ \Rightarrow 2s^2 + 5s + 3 &= A(s+1)^2 + B(s+1) \Rightarrow (s+1)(s+3) = (s+1)[A(s+1) + B] \Rightarrow s = -1 \Rightarrow B = 2 \text{ and } A = 1 \\ \frac{2s^2 + 5s + 7}{(s+1)^3} &= \frac{1}{s+1} + \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{4}{(s+1)^3} \\ y(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s^2 + 5s + 7}{(s+1)^3}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1} + \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{4}{(s+1)^3}\right\} \\ y(t) &= e^{-t} + 2te^{-t} + 2t^2e^{-t}\end{aligned}$$

4. 25 puan $f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 3\pi \\ 0, & 3\pi \leq t \end{cases}$ olmak üzere $y'' + 9y = f(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ başlangıç değer probleminin çözümünü Laplace Dönüşümü kullanarak bulunuz.

Solution: $f(t) = 1 - u_{3\pi}(t)$ fonksiyonun Laplace Dönüşümü $F(s) = \frac{1}{s} - \frac{e^{-3\pi s}}{s}$ olarak hesaplanır. Dolayısıyla

$$\mathcal{L}\{y'' + 9y\} = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

$$(s^2 + 9)\mathcal{L}\{y\} - 1 = \frac{1 - e^{-3\pi s}}{s}$$

$$\mathcal{L}\{y\} = \frac{s + 1 - e^{-3\pi s}}{s(s^2 + 9)}$$

$$\mathcal{L}\{y\} = \frac{s + 1}{s(s^2 + 9)} - \frac{e^{-3\pi s}}{s(s^2 + 9)}$$

$$\frac{s + 1}{s(s^2 + 9)} = \frac{A_1}{s} + \frac{B_1s + C_1}{s^2 + 9}$$

$$s + 1 = A_1(s^2 + 9) + (B_1s + C_1)s \Rightarrow s + 1 = (A_1 + B_1)s^2 + C_1s + 9A_1 \Rightarrow A_1 = \frac{1}{9}, B_1 = -\frac{1}{9}, C_1 = 1$$

$$\frac{1}{s(s^2 + 9)} = \frac{A_2}{s} + \frac{B_2s + C_2}{s^2 + 9}$$

$$1 = A_2(s^2 + 9) + (B_2s + C_2)s \Rightarrow 1 = (A_2 + B_2)s^2 + C_2s + 9A_2 \Rightarrow A_2 = \frac{1}{9}, B_2 = -\frac{1}{9}, C_2 = 0$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{9}\frac{1}{s} - \frac{1}{9}\frac{s}{s^2 + 9} + \frac{1}{3}\frac{3}{s^2 + 9}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{9}\frac{e^{-3\pi s}}{s} - \frac{1}{9}\frac{se^{-3\pi s}}{s^2 + 9}\right\}$$

$$y(t) = \frac{1}{9} - \frac{1}{9}\cos 3t + \frac{1}{3}\sin 3t - \frac{1}{9}u_{3\pi}(t) + \frac{1}{9}u_{3\pi}(t)\cos(3(t - 3\pi))$$

$$y(t) = \frac{1}{9} - \frac{1}{9}\cos 3t + \frac{1}{3}\sin 3t - \frac{1}{9}u_{3\pi}(t) - \frac{1}{9}u_{3\pi}(t)\cos(3t)$$